Tomate Consumo



Plantinera	Trasplante	Hasta Floración cada 10 d		Desde Post-Cuaja cada 15 días hasta últimos frutos	
	cobrestable*	cobrestable [*]	cobrestable'	cobrestable'	cobrestable'
	2,0 lt/ha	3,0 lt/ha	3,0 lt/ha	3,0 lt/ha	3,0 lt/ha
	2 aplicaciones espaciadas 15 días a partir de los 10/15 días de emergencia del cultivo. Fortalecimiento Radicular	Acompañando a cada aplicación de pesticidas. Manejo del Estrés Abiótico en general y químico en particular	Inicio de la Horación Mejorar la calidad de la cuaja	Desde cuaja espaciadas cada 15 di dependiendo Crecimiento del fruto en número de células	

OBSERVACIONES

- Comenzar con las aplicaciones a los 15 días de trasplantado o emergido el cultivo.
- Debe asegurarse el máximo crecimiento de las hojas y lo más rápido posible para captar la mayor intensidad lumínica posible.
- Para asegurar esto, se recomiendan aplicaciones cada 15 a 20 días.
- Después de la cuaja, es clave mantener activa la fotosíntesis de la planta, por lo que deben realizarse aplicaciones cada 15 a 20 días hasta la cosecha.
- El total de aplicaciones dependerá del ciclo de cultivo. Se estiman entre **5 a 7 aplicaciones** desde trasplante hasta cosecha.



cobrestable®