Pimiento



Plantinera	Trasplante Hasta Floración		ación cada 10 d	Desde Post-Cuaje cada	e cada 15 días hasta últimos frutos	
	cobrestable°	cobrestable°	cobrestable°	cobrestable°	cobrestable°	
	2,0 lts/ha	2,0 lt/ha	3,0 lt/ha	3,0 lt/ha	2,0 lt/ha	
	2 aplicaciones espaciadas 15 días a partir de los 10/15 días de emergencia del cultivo.	Aco <mark>mpa</mark> ñando a cada aplicación de pesticidas.	Inicio de la floración	Desde cuaja espaciadas cada 15 días al menos 3 a 5 aplicaciones dependiendo el ciclo.		
	Fortalecimiento Radicular	Manejo del Estrés Abiótico en general y químico en particular	Mejorar la calidad de la cuaja	Crecimiento del fruto en número de células	Maduración del fruto.	
+						
	1 To	THE THE PROPERTY OF THE PROPER				
	OBSERVACIONE	S			1	
	Comparar con los aplicaciones a los 15 días do					

- Comenzar con las aplicaciones a los 15 días de trasplantado o emergido el cultivo.
- Debe asegurarse el máximo crecimiento de las hojas y lo más rápido posible para captar la mayor intensidad lumínica posible.
- Para asegurar esto, se recomiendan aplicaciones cada 15 a 20 días.
- Después del cuaje, es clave mantener activa la fotosíntesis de la planta, por lo que deben realizarse aplicaciones cada 15 a 20 días hasta la cosecha.
- El total de aplicaciones dependerá del ciclo de cultivo. Se estiman entre **5 a 7 aplicaciones** desde trasplante hasta cosecha.



cobrestable®