

Cebolla Consumo



Germinación

Crecimiento Inicial

Bulbificación/Llenado de Bulbos

cobrestable®

2,0 l/ha

Aplicaciones espaciadas 15 días
a partir de los 10/15 días de

Fortalecimiento Radicular



cobrestable®

3,0 l/ha

Acompañando a cada
aplicación de pesticidas.

**Manejo del Estrés Abiótico
en general y químico en
particular**



cobrestable®

3,0 l/ha

Hacer aplicaciones desde inicio de
bulbificación cada 15 días.

**Crecimiento del Bulbo y
Manejo del estrés abiótico en
general.**



OBSERVACIONES

- Comenzar con las aplicaciones a los 15 días de trasplantado o emergido el cultivo.
- Debe asegurarse el máximo crecimiento de las hojas y lo más rápido posible para que puedan comenzar a llenarse anticipadamente los bulbos.
- Para asegurar esto, se recomiendan aplicaciones cada 15 a 20 días.
- Durante el período de llenado es clave mantener activa la fotosíntesis de la planta, por lo que deben realizarse aplicaciones cada 15 a 20 días hasta que el cultivo comience a entregarse.
- El total de aplicaciones dependerá del ciclo de cultivo. Se estiman entre 3 a 5 aplicaciones.