



cobrestable[®]

Cobre Complejo de Elevada Biodisponibilidad

Fungicida - Bactericida - Bioestimulante Foliar

INFORMACIÓN GENERAL

COMPOSICIÓN:

Sulfato de Cobre Pentahidratado Formulado (c/Cobre Complejo)	29,00%
Nitrógeno soluble total (N)	10,50%
Fósforo Total (P ₂ O ₅)	3,50%
Potasio soluble total (K ₂ O)	3,60%
Azufre (S)	3,20%
Cobre (Cu)	7,40%
Zinc (Zn)	1,20%
Sistema estabilizador-adherente	3,00%
Vehículo c.s.p	100,00%

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

cobrestable® es un fungicida-bactericida de acción preventiva contra las enfermedades causadas por hongos y bacterias que afectan cultivos hortícolas y frutícolas según se indica en el cuadro de recomendaciones.

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Por ser **cobrestable®** ducto totalmente soluble en agua, la preparación no ofrece ningún tipo de dificultad. Con el tanque lleno y los agitadores en movimiento, verter en el la cantidad necesaria de acuerdo a la dosis recomendada.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

cobrestable® puede ser utilizado en equipos de aplicación terrestres o aéreos. Por ser un producto de acción por contacto debe tratarse de pulverizar las plantas lo más uniformemente posible hasta el punto de goteo.

RESTRICCIONES DE USO:

El intervalo mínimo que debe esperarse entre la última aplicación y la cosecha de las partes comestibles es de 1 (un) día para todos los cultivos involucrados en las recomendaciones de uso.

COMPATIBILIDAD:

cobrestable® no presenta problemas de compatibilidad alguna, con otros productos si se respeta esta sola norma: agregar el Cobrestable, al agua antes que los otros productos.

PRECAUCIONES GENERALES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

Evitar la ingestión, contacto con la piel y ojos y la contaminación de los alimentos. Usar guantes y botas de goma, protector facial y ropa protectora adecuada durante el manipuleo y/o aplicación del producto. Finalizada la misma, lavarse con abundante agua y jabón. No comer, beber y/o fumar durante el trabajo.

DERRAMES:

Enjuagarlos con agua o cubrirlos con tierra o algún material absorbente.

TOXICIDAD PARA ABEJAS

No tóxico.

PERIODO DE CARENIA: 1 día

RIESGOS AMBIENTALES

Muy baja toxicidad para mamíferos, aves y peces.

ALMACENAMIENTO

Conservar en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y seco.

No almacenar en lugares con temperaturas superiores a 40° C o inferiores a 0°C.

PRIMEROS AUXILIOS:

Por salpicaduras en la piel u ojos, enjuagar con abundante agua limpia.

En caso de ingestión accidental, provocar vómitos con agua tibia o solución de mostaza.

Llamar al médico.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO:

- CLASE "D": LEVEMENTE TOXICO
- APLICAR TRATAMIENTOS SINTOMATICO
- ANTIDOTO: FERROCIANURO DE POTASIO AL 0.5% EN AGUA

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	EPOCA DE APLICACION
VID	Peronospora (Plasmopara vitícola)	2 a 3 l/ha	Realizar la primera aplicación cuando los brotes tengan 10 a 20cm. De largo. La segunda aplicación en Enero. Una tercera en Marzo de ser necesario. IMPORTANTE: Tener siempre presente las condiciones climáticas de calor y humedad para reforzar los tratamientos. ESTAR ATENTO AL SISTEMA DE ALARMAS DE LA ZONA
OLIVO	Tuberculosis del olivo (Pseudomonas savastanoi) Cercóspora del Olivo (Cercospora cladosporioide) Mancha en ojo o Viruela (Cycloconium oleaginum) Fumaginas	1 a 3 l/ha	Realizar la cura lo antes posible luego de realizada la cosecha de la aceituna y antes de efectuar la poda. Pulverizar luego de cada granizada. 1 l/ha para TUBERCULOSIS. Además extirpar el o los tumores y desinfectar el corte. Usarlo también para desinfectar las herramientas.
TOMATE	Tizón Temprano (Alternaria solana) Viruela del tomate (Sptoria lycopersici)	2 a 3 l/ha	Realizar la primera aplicación en el almácigo, la segunda al transplantar, la tercera unos días antes de inicio de la floración y repetir cada 20 días hasta cosecha.
PIMIENTO	Viruela del Pimiento (Septoria capsici)	2 a 3 l/ha	Se recomienda lo mismo para el tomate
PAPA	Tizones Temprano y Tardío (Alternaria y Phytophthora)	2 a 3 l/ha	La primera aplicación cuando las plantas tienen 10 a 12 cm. De altura. Repetir cada 20 días.
POROTO, ARVEJA, LENTEJA	Antracnosis (Colletotrichum lindemutianum) Ascochyta pisi, Bacteriosis Varias	1,5 a 3 l/ha	La primera aplicación 15 días después de nacidas las plantas: La segunda antes de la floración; la tercera después de la floración y la cuarta 15 a 20 días después.
AJO CEBOLLA	Peronóspora (Peronospora sp)	2 a 3 lt/ha	La primera aplicación 15 días después de nacidas las plantas y repetir cada 20 días hasta encabezado. Realizar una durante la bulbificación si fuera necesario
SANDÍA, MELÓN, ZAPALLO	Antracnosis, Mildiu, Oidiopsis	2 a 3 lt/ha	La primera aplicación 15 días después de nacidas las plantas y repetir cada 20 días hasta encabezado. Realizar una durante la bulbificación si fuera necesario
NOGAL	Bacteriosis del Nogal	3 a 4 l/ha	1° aplicación a yema hichada, 2° con la aparición del moco. Repetir cada 15 a 20 días hasta inicio del crecimiento del fruto.

MANI	Viruela Temprana y tardía (Cercospora cercosporidium)	2 a 3 l/ha	Realizar dos a tres aplicaciones cada 30 días a partir de Enero.
CITRUS	Antracnosis (Colletotrichum gloesporioides) Sarna o Verrugosis (Sphaceloma fawcetti) Melanosia (Phomopsis citri)	3 a 4 l/ha	Efectuar las siguientes pulverizaciones: 1)- Antes de la aparición de los brotes florales. 2)- Cuando ha caído la casi totalidad de los pétalos. 3)- Cuando la fruta tiene de 1 a 2 cm de diámetro.
	Cancrosis (Xanthomonas citri) Mancha Negra (Guignardia bidwilli)	3 - 5 l/ha	Efectuar las siguientes pulverizaciones: 1)- Antes de la aparición de los brotes florales. 2)- Cuando ha caído la casi totalidad de los pétalos. 3)- Cuando la fruta tiene de 1 a 2 cm de diámetro. 4)- Después de 40 a 50 días de la 3ª pulverización. 5)- Si fuera necesaria otra aplicación, se efectuará 40 - 50 días después de la 4ª.
PALTO	Sarna o Roña (Sphaceloma perseae) Cancro del tronco o bolsa de agua (Pseudomonas psringae)	2 a 3 l/ha	1)- Prefloración (julio). 2)- Floración (agosto / setiembre). 3)- Inicio cuaje (octubre). 4)- Crecimiento del fruto.
BANANO	Sigatoka o mancha de la hoja (Mycosphaerella musicola)	2 l/ha	Realizar aplicaciones semanales

ADDENDA

PERAL TIZON DE LAS FLORES

Pseudomonas syringae Van Hall (con especial referencia a var. Packham's Triumph)

- Aplicaciones preventivas a yema hinchada y, en caso de lluvias, durante la floración (muñecas separadas a inicio de la caída de pétalos)
COBRESTABLE 2 a 3 l/ha
- Aplicaciones complementarias otoñales a inicio de caída de hojas.
COBRESTABLE 4 a 5 l/ha