

Преднизолон

Синтетический глюкокортикостероид · основной противовоспалительный эффект через 4-6 часов

ФОРМА ВЫПУСКА

3 % · 1 мл = **30 мг**
30 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Геномный путь (основной, начало действия через часы): транскрепрессия NF-κB подавляет синтез провоспалительных цитокинов; индукция аннексина A1 блокирует фосфолипазу A₂ и снижает продукцию простагландинов и лейкотриенов. Негеномный путь (минуты): стабилизация клеточных мембран и пермиссивное действие в отношении катехоламинов. Эквивалентность: 5 мг преднизолона ≈ 0,75 мг дексаметазона ≈ 20 мг гидрокортизона.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Анафилактический шок (при САД < 80 после адреналина)	90-120 мг (3-4 мл)	в/в
Аллергический отёк верхних дыхательных путей	90-120 мг (3-4 мл)	в/в
Ожоговый шок, утопление	120-150 мг (4-5 мл)	в/в
Бронхиальная астма, ХОБЛ (после ингаляционных β ₂ -агонистов)	90 мг (3 мл)	в/в
Крапивница генерализованная, ангиоотёк	60-90 мг (2-3 мл)	в/в, в/м
Перелом позвоночника с неврологическим дефицитом	150 мг (5 мл)	в/в
Отравления (антагонисты Ca ²⁺ , сердечные гликозиды)	60-90 мг (2-3 мл)	в/в
Дети: анафилактический шок	10 мг/кг (0,33 мл/кг)	в/в
Дети: аллергический отёк ВДП, круп	3-5 мг/кг (0,1-0,16 мл/кг)	в/в
Дети: бронхиальная астма	1-2 мг/кг (макс. 60 мг)	в/в
ЧМТ любой степени тяжести	противопоказан (CRASH, 2004)	

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ Основной противовоспалительный эффект развивается через **4-6 часов**. На догоспитальном этапе глюкокортикостероид не является препаратом первого ряда; при анафилаксии первым всегда вводится адреналин.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Черепно-мозговая травма — повышение летальности (исследование CRASH, 2004)
- Спинальная травма — международные рекомендации отказались от рутинного назначения (NASCIS, осложнения превышают пользу), однако строка приказа ДЗМ сохранена
- Контроль гликемии у пациентов с сахарным диабетом обязателен
- Анафилаксия: по рекомендациям ERC (2021) глюкокортикостероиды не назначаются рутинно; адреналин всегда первым

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Не смешивать в одном шприце с гепарином — образование осадка
- Гипокалиемия на фоне дигоксина — потенцирование гликозидной токсичности
- Пероральный приём по эффективности эквивалентен внутривенному (при сохранённой способности глотать)
- Альтернатива: дексаметазон 8-20 мг внутривенно (указан в Алгоритмах наравне с преднизолоном)