

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Боль в груди после инвазивного вмешательства на сердце

Катетерная абляция, ЧКВ, имплантация устройств: маршруты
доступа, осложнения по срокам, распознавание на
догоспитальном этапе



Анатомия вмешательства как основа дифференциального диагноза.

Сроки появления симптома, осложнения по группам вмешательств, объём обследования,
доступный выездной бригаде.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 15 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов в 00:35. Мужчина 52 лет, рост 175 см, масса 106 кг. Двое суток назад выполнена радиочастотная абляция по поводу фибрилляции предсердий; выписан в день после процедуры. Доступ, по выписке, через бедренные вены. Интубации не было, процедура выполнялась под седацией.

Боль появилась в первые часы после вмешательства: правая половина грудной клетки и правая половина шеи, в надплечье. Характер постоянный, ноющий, с прострелами при перемене положения. Усиливается в положении лёжа на спине и при движениях руками; уменьшается, если сесть. На вторые сутки интенсивность возросла, что и стало поводом для вызова.

Объективно: сознание ясное, положение вынужденное — сидит, наклонившись вперёд. Кожа обычной окраски, теплая, сухая. Температура 36,9 °С. ЧД 17 в минуту, дыхание проводится с обеих сторон, симметрично, хрипов нет. SpO₂ 99 % на воздухе. ЧСС 74 в минуту, ритм правильный, АД 128/78 мм рт. ст., одинаково на обеих руках. Шейные вены не набухшие. Тоны сердца ясные. Живот мягкий, безболезненный. Места пункции в обеих бедренных областях без гематом и пульсирующих образований, дистальный пульс сохранён. Пальпация правой половины грудной клетки и области грудино-ключичного сочленения воспроизводит боль. ЭКГ в 12 отведениях: синусовый ритм, без динамики по сравнению с плёнкой, выданной при выписке.

Вопросы, на которые отвечает настоящий материал:

- какие осложнения возможны на вторые сутки после абляции, а какие в эти сроки крайне маловероятны;
- какие из них исключаются самим типом доступа, а какие — нет;
- что из опасного может протекать при стабильной гемодинамике и нормальной ЭКГ;
- какой объём осмотра доступен бригаде и какие находки меняют маршрут;
- что должно быть передано принимающему стационару, чтобы диагностический поиск не начинался заново.

Разбор случая приведён в конце материала.

Почему повод требует отдельного разбора

Число катетерных вмешательств растёт, а длительность госпитализации сокращается: после изоляции лёгочных вен пациент нередко выписывается в первые сутки, после планового чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) — на следующий день, после имплантации устройства — в течение первых суток. Следствие организационное: осложнение с отсроченным дебютом развивается вне стационара, и первым его видит не оператор, выполнявший процедуру, а выездная бригада.

Спектр возможных осложнений определяется не диагнозом в выписке, а **маршрутом инструмента и типом использованной энергии**. Одна и та же формулировка «абляция по поводу аритмии» описывает вмешательства с принципиально разной анатомией: изоляция лёгочных вен требует пункции межпредсердной перегородки и работы в левом предсердии, абляция каво-трикуспидального перешейка проходит целиком в правых отделах, абляция желудочковой тахикардии нередко выполняется ретроградно через аорту.


Второй определяющий фактор — **интервал между вмешательством и появлением симптома**. Осложнения имеют характерные сроки дебюта, и для большинства из них этот интервал информативнее, чем характер боли: перикардит манифестирует в первые сутки, повреждение электродом устройства — преимущественно в первый

месяц, атриоэзофагеальная фистула — на третьей неделе. Сбор анамнеза, в котором зафиксированы дата вмешательства, его вид, тип доступа и тип энергии, определяет дифференциальный ряд точнее, чем любой физикальный признак.

Что выполняется в рентгеноперационной

Изоляция лёгочных вен при фибрилляции предсердий

Цель вмешательства — электрическая изоляция устьев лёгочных вен от миокарда левого предсердия. Маршрут инструмента:



Обозначения устьев: ЛВЛВ — левая верхняя, ЛНЛВ — левая нижняя, ПВЛВ — правая верхняя, ПНЛВ — правая нижняя лёгочная вена.

Применяются три типа энергии, и они различаются профилем осложнений:

Энергия	Принцип	Особенности профиля осложнений
Радиочастотная (РЧ)	точечное термическое повреждение, аппликации формируют линию	наибольшая доля термических повреждений соседних структур: пищевод, диафрагмальный нерв, вагусное сплетение
Криобаллон	охлаждение до $-40...-50\text{ }^{\circ}\text{C}$, изоляция вены баллоном	лидирует по повреждению правого диафрагмального нерва; пищеводные фистулы существенно реже, чем при РЧ
Импульсное электрическое поле (PFA)	необратимая электропорация, преимущественно тканеспецифичная	термические повреждения соседних структур минимальны; частота перикардита сопоставима с РЧ

Анатомические соседи левого предсердия

Раздел объясняет большинство специфических осложнений: все они возникают в структурах, лежащих в миллиметрах от зоны аппликации.

ВПЕРЕДИ
аорта, ствол лёгочной артерии

правый диафрагмальный
нерв: вдоль ВПВ и
правой верхней ЛВ

левый диафраг-
мальный нерв:
у ушка ЛП и
левой верхней ЛВ

ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ

ПИЩЕВОД — по задней стенке предсердия
околопищеводное вагусное сплетение — рядом
СЗАДИ

митральный перешеек: рядом огибающая артерия
и коронарный синус


Практические следствия анатомии:

- задняя стенка левого предсердия и пищевод разделены слоем ткани, толщина которого у части пациентов не превышает нескольких миллиметров, — отсюда термическое повреждение стенки пищевода вплоть до фистулы;
- правый диафрагмальный нерв проходит непосредственно вблизи правой верхней лёгочной вены, поэтому подавляющее большинство его повреждений происходит при обработке именно этой вены;
- околопищеводные ветви блуждающего нерва иннервируют желудок, и их термическое повреждение проявляется гастропарезом;
- аблация в области митрального перешейка технически ближе всего к огибающей артерии и коронарному синусу, и это независимый предиктор тампонады.

Диафрагмальный нерв: ход и клиническое значение

Нерв формируется из передних ветвей С3–С5, спускается по передней поверхности передней лестничной мышцы, входит в грудную клетку между подключичной артерией и веной и далее идёт в переднем средостении, между перикардом и медиастинальной плеврой, до диафрагмы. Правый нерв прилежит к латеральной стенке верхней полой вены, затем к правому предсердию, и на этом участке проходит в непосредственной близости к устью правой верхней лёгочной вены — анатомическая основа того, что 84 % его повреждений при криобаллонной изоляции происходит при обработке именно этой вены. Левый нерв огибает дугу аорты, идёт по перикарду над левым желудочком, вблизи ушка левого предсердия и левой верхней лёгочной вены.


Нерв смешанный. Двигательные волокна — единственная моторная иннервация диафрагмы, поэтому повреждение даёт паралич купола: одышка в положении лёжа, высокое стояние купола на рентгенограмме. Чувствительные волокна идут от перикарда, медиастинальной и диафрагмальной плевры и от центральной части диафрагмы; их раздражение проецируется в дерматомы С3–С5 — шея, надплечье, область трапециевидного гребня. Этим объясняется характерная иррадиация при перикардите и при раздражении диафрагмальной плевры, разобранная ниже.



Диафрагмальный нерв и его отношения с блуждающим нервом, вид спереди. Видны формирование из передних ветвей С3–С5, вход в грудную клетку, ход в средостении по перикарду, перикардальная ветвь, разветвление на диафрагме и диафрагмально-брюшные ветви; рядом — блуждающий нерв с возвратным гортанным и сердечными ветвями. Источник: Gray's Anatomy, план 806, издание 1918 года, public domain.

Диафрагмальные нервы: ход и точки риска при вмешательствах на сердце

Вид спереди. Правая сторона пациента — слева на схеме. Схема принципиальная, пропорции не соблюдены.



Где катетер встречается нерв

- ❶ Криобаллонная изоляция правой верхней лёгочной вены - самое частое место пареза правого нерва.
- ❷ Изоляция верхней полой вены и абляция в правом предсердии: нерв идёт по её латеральной стенке.
- ❸ Электрод ЛЖ при CRT в заднебоковой ветви - стимуляция диафрагмы вместо пареза.
- ❹ Абляция ушка ЛП и эпикардальная абляция по боковой стенке - риск для левого нерва.

Своя схема, лицензия CC BY-NC-SA 4.0. Анатомическая основа сверена с планом 806 из Gray's Anatomy (public domain).

Те же нервы, но с точки зрения оператора: места, где инструмент подходит к нерву вплотную. Правый нерв уязвим при криобаллонной изоляции правой верхней лёгочной вены и при работе в верхней полой вене и правом предсердии; левый — при абляции в области ушка левого предсердия, при эпикардальной абляции по боковой стенке и при позиционировании левожелудочкового электрода в заднебоковой ветви коронарного синуса, где вместо пареза возникает стимуляция диафрагмы. Схема составлена для этого материала.


Вмешательства в правых отделах

Абляция каво-трикуспидального перешейка при типичном трепетании предсердий выполняется в правом предсердии, в области между нижней полой веной и кольцом трикуспидального клапана. Трансептальная пункция не требуется, левое предсердие не инструментируется — следовательно, пищеводные и диафрагмальные осложнения для этого вмешательства неактуальны. Вблизи зоны аппликации проходят правая коронарная артерия и, при абляции медиальнее, компактный атриовентрикулярный узел: последнее определяет риск атриовентрикулярной блокады.

Абляция желудочковых тахикардий


При левожелудочковой локализации субстрата доступ нередко **артериальный, ретроградный через бедренную артерию и аорту**. Это меняет дифференциальный ряд: добавляются осложнения артериального доступа, ретроградного проведения инструмента через аортальный клапан и системная эмболия.

Чрескожное коронарное вмешательство



Ключевые технические точки, определяющие осложнения доступа: пункция бедренной артерии **выше** паупертовой связки открывает путь кровотоку в забрюшинное пространство, где компрессия неэффективна; пункция ниже бифуркации способствует формированию ложной аневризмы и артериовенозной фистулы.

Имплантация электрокардиостимулятора и кардиовертера-дефибриллятора



Подключичная пункция выполняется в непосредственной близости к куполу плевры — отсюда пневмоторакс как осложнение самого доступа. Продвижение электрода к верхушке правого желудочка, стенка которого тоньше левожелудочковой, определяет риск перфорации с развитием гемоперикарда либо со стимуляцией диафрагмы.

Осложнения по срокам появления симптома

Таблица построена по признаку, доступному бригаде: сколько времени прошло от вмешательства. Частоты приведены по регистрам и консенсусным документам (ссылки — в разделе «Источники»).

Срок	Осложнение	Частота	Что заставляет думать
Часы, первые сутки	Тампонада сердца (абляция)	0,4-1,3 %	Гипотензия, набухшие шейные вены, глухие тоны, парадоксальный пульс
Часы, первые сутки	Пневмоторакс (имплантация устройства)	0,4-2,8 %	Боль, одышка, асимметрия дыхания на стороне имплантации
Часы, первые сутки	Кровотечение и гематома доступа	венозный доступ при абляции 1-4 %; бедренный артериальный 2-12 %	Локальная припухлость, пульсирующее образование, шум над областью пункции
Часы — 30 суток	Тромбоз стента (ЧКВ)	редко; острый до 24 ч, подострый до 1 месяца	Картина ОКС, чаще с подъёмом ST; летальность высокая
1-5 суток	Постаблационный перикардит	3,4-10,2 %	Плевритическая боль, усиление лёжа, облегчение сидя; медиана дебюта — 1 сутки после РЧА, 4 суток после PFA
1-5 суток	Дислокация электрода устройства	1,2-3,3 %	Возврат симптомов аритмии, нарушение стимуляции; чаще 1-2-е сутки
1-30 суток	Перфорация электродом, подострая	0,1-1,5 %	Боль, стимуляция диафрагмы, шум трения, нарушение захвата
До 30 суток и позже	Отсроченная тампонада	около 0,2 %	Нарастающая слабость, гипотензия при внешне спокойном течении
1-4 недели	Атриоэзофагеальная фистула	0,02-0,25 %	Лихорадка , боль в груди, одинофагия, неврологическая симптоматика; медиана дебюта 18 суток
1-4 недели	Синдром постповреждения сердца	входит в 3,7-10 %	Плевритическая боль, лихорадка, плевральный выпот, инфильтраты в лёгких

Срок	Осложнение	Частота	Что заставляет думать
Недели	Инфекция ложа устройства	0,6–3,4 %	Локальная болезненность, гиперемия, флюктуация, лихорадка
Недели — месяцы	Гастропарез (вагусное сплетение)	редко	Тошнота, рвота, раннее насыщение, боль в эпигастрии
Месяцы	Стеноз лёгочных вен	< 1–2 %	Одышка при нагрузке, кашель, кровохарканье, рецидивирующие «пневмонии»
Месяцы — годы	Поздний и очень поздний тромбоз стента	около 0,6 % в год	Картина ОКС у пациента с прекращённой антиагрегантной терапией

Разбор ключевых осложнений

Тампонада сердца и отсроченная тампонада

Механизм: перфорация тонкостенных структур — ушка предсердия, области транссептальной пункции, зоны аппликации; при работе в правом желудочке — перфорация электродом. Кровь поступает в полость перикарда; критично не абсолютное количество, а темп накопления, поскольку нерастянутый перикард при быстром поступлении становится неподатливым уже при небольшом объёме.

Частота тампонады при аблации фибрилляции предсердий — 0,4–1,3 % по консенсусному документу 2024 года; в современных когортах 0,64–0,68 %. Около пятой части случаев приходится на отсроченные формы, а среди фатальных исходов, связанных с процедурой, тампонада составляет примерно четверть, причём каждый восьмой такой случай регистрируется позднее 30 суток после вмешательства. Дренирование выполняется в подавляющем большинстве случаев перикардиоцентезом, к хирургическому вмешательству прибегают редко.

Физикальные признаки: гипотензия, набухшие шейные вены, глухие тоны, парадоксальный пульс (снижение систолического давления более чем на 10 мм рт. ст. на вдохе), тахикардия. Существенная оговорка: **тахикардия может отсутствовать**. Пациент после аблации по поводу аритмии, как правило, получает бета-адреноблокатор или антиаритмический препарат, что ограничивает хронотропный ответ; кроме того, растяжение стенок и раздражение механорецепторов при гемоперикарде запускают вагусные рефлекторные реакции с брадикардией. Отсутствие ускорения ритма при гипотензии у такого пациента не снижает вероятность тампонады, а повышает настороженность.

Тактика бригады: венозный доступ, кислород по показаниям, положение с приподнятым головным концом, экстренная эвакуация с предупреждением стационара; инфузионная поддержка носит характер временной меры, поскольку решает вопрос только дренирование.

Постаблационный перикардит и синдром постповреждения сердца

Механизм: воспалительная реакция перикарда на термическое или электропорационное повреждение прилежащего миокарда. Частота по данным крупных центров — от 3,4 до 10,2 %; при аблации импульсным полем 4,3 %, что сопоставимо с радиочастотной. Медиана дебюта симптомов — первые сутки после радиочастотной аблации и около четырёх суток после импульсной.

Клиническая картина: плевритическая боль, наиболее ранний и самый частый симптом; усиление в положении лёжа и на вдохе, облегчение в положении сидя с наклоном вперёд. Иррадиация в шею и область трапециевидного гребня объясняется иннервацией перикарда диафрагмальным нервом (корешки C3–C5) и относится к наиболее специфичным признакам перикардита. Шум трения перикарда выслушивается непостоянно, лучше — в положении сидя с наклоном вперёд, на выдохе.

Два свойства этого состояния определяют диагностические ошибки:

- **выпот в перикарде для диагноза не требуется и в большинстве случаев отсутствует.** Среди пациентов с клинически диагностированным постаблационным перикардитом новый выпот выявляется примерно в 9 %, изменения ЭКГ — в 20–60 % случаев. Заключение эхокардиографии «жидкость в полости перикарда не визуализируется» исключает тампонаду, но не исключает перикардит: диагноз клинический;
- при синдроме постповреждения сердца в клинической картине присутствуют лихорадка (около трёх четвертей описанных случаев), плевральный выпот и **инфильтраты в лёгких почти у трети**, что регулярно трактуется как пневмония; антибактериальная терапия в таких случаях эффекта не даёт, состояние отвечает на противовоспалительное лечение.

Диффузный подъём сегмента ST с депрессией сегмента PR и умеренное повышение тропонина при перикардите имитируют острый коронарный синдром. На догоспитальном этапе разграничение по одной плёнке невозможно, и тактика определяется в пользу более опасного диагноза.

Атриоэзофагеальная фистула

Наиболее летальное осложнение аблации и главная причина, по которой пациента, обратившегося в течение месяца после вмешательства, нельзя оценивать вне связи с процедурой.

Механизм: термическое повреждение стенки пищевода, прилежащей к задней стенке левого предсердия, с формированием язвы и последующим сообщением между пищеводом и предсердием. Через дефект в системный кровоток поступают воздух и содержимое пищевода — отсюда воздушная эмболия, инсульт и сепсис.

Данные международного регистра POTTER-AF (553 729 процедур): частота 0,025 % в целом, при радиочастотной аблации 0,038 %, при криобаллонной 0,0015 %. Медиана времени до первых симптомов — 18 суток (интерквартильный интервал 8–25; диапазон от 0 до 60 суток), до постановки диагноза — 21 сутки. Первым симптомом чаще всего оказывается **лихорадка** — 59 % случаев; боль и одиофагия — 54 %; неврологическая симптоматика — 44 %, а по данным систематического обзора клинических наблюдений — до 75 %. Диагноз устанавливается компьютерной томографией груди в 80 % случаев, при этом первичное исследование оказывается неизменённым примерно у четверти пациентов. Общая летальность 65,8 %, при консервативном лечении — до 89,5 %.

Практические положения для догоспитального этапа:

- лихорадка, боль при глотании или неврологический эпизод в течение двух месяцев после аблации левого предсердия требуют рассмотрения фистулы в первую очередь, а не диагноза острой респираторной инфекции;
- сочетание лихорадки с очаговой неврологической симптоматикой у такого пациента укладывается в воздушную эмболию;
- на этапе подозрения избегают манипуляций, повышающих давление в пищеводе: установки назогастрального зонда, а в стационаре — эндоскопии с инсуффляцией воздуха;
- эвакуация экстренная, предпочтительно в центр, где выполнялось вмешательство, с прямым информированием о характере подозрения: диагностический путь здесь начинается с компьютерной томографии, а не с приёмного отделения общего профиля.

Повреждение диафрагмального нерва

Механизм: термическое, чаще холодное, повреждение правого диафрагмального нерва при обработке правой верхней лёгочной вены. По данным регистра YETI (17 356 пациентов, криобаллонная изоляция) частота периоперационного повреждения составляет 4,2 %, причём в 84 % случаев оно возникает при обработке именно правой верхней вены. Более половины повреждений разрешаются до конца процедуры, 97 % — в течение 12 месяцев; стойкое повреждение отмечается у 0,1 %, стойкое и симптомное — у 0,06 % пациентов.

Клиническая картина: одышка при нагрузке и в положении лёжа, икота, боль в правом надплечье; при рентгенографии — высокое стояние купола диафрагмы. Для догоспитального этапа значение раздела в основном дифференциальное: наличие правостороннего плечевого и шейного болевого синдрома после аблации правых лёгочных вен имеет объяснение, не требующее экстренного вмешательства, но требующее документирования и консультации оператора.

Повреждение околопищеводного вагусного сплетения

Механизм: термическое повреждение ветвей блуждающего нерва, идущих вдоль пищевода к желудку. Проявляется гастропарезом: тошнота, рвота, раннее насыщение, боль и вздутие в эпигастрии в течение недель после вмешательства. Состояние доброкачественное и обратимое, однако его клиническая картина полностью перекрывается с началом атриоэзофагеальной фистулы, поэтому появление на этом фоне лихорадки меняет трактовку.

Стеноз лёгочных вен

Механизм: рубцовое сужение устья вены после аппликаций внутри неё. Современная техника аблации выполняется в антральной зоне, что сделало осложнение редким. Дебют отсроченный, месяцы: одышка при нагрузке, кашель, кровохарканье, повторные эпизоды, трактуемые как пневмония. Значение для бригады: пациент с одышкой и кровохарканьем в анамнезе с аблацией лёгочных вен требует упоминания этого факта при передаче — иначе диагностический поиск идёт по стандартному пути между пневмонией и тромбоэмболией.

Инсульт и воздушная эмболия

Механизмы: тромбоэмболия из зоны аппликации или из левого предсердия при недостаточной антикоагуляции; воздушная эмболия через транссептальный

интродьюсер; при атриозофагеальной фистуле — поступление воздуха из пищевода. Частота острых церебральных событий при аблации фибрилляции предсердий — порядка 0,1 % и ниже.

Особенность распознавания: у пациента после вмешательства неврологический дефицит часто трактуется как последствие седации или общей слабости. Для клинической оценки применяется тот же порядок, что при любом подозрении на инсульт, включая обязательное определение глюкозы крови как единственного немедленно устранимого имитатора.

Осложнения доступа

Осложнение	Доступ	Клиническая картина
Гематома	любой	Припухлость, болезненность; при бедренном артериальном доступе частота 2–12 %
Ложная аневризма	артериальный	Пульсирующее образование, систолический шум; бедренная 0,05–8 %, радиальная 0,02–0,09 %
Артериовенозная фистула	артериальный	Непрерывный шум над областью пункции
Забрюшинная гематома	бедренный артериальный	Боль в спине, боку, животе; гипотензия и анемизация без видимой наружной гематомы ; частота 0,025–0,9 %, летальность существенно выше остальных осложнений доступа
Окклюзия радиальной артерии	радиальный	Отсутствие пульса, обычно без ишемии кисти за счёт коллатералей; частота 1–10 %
Тромбоз подключичной вены	имплантация устройства	Отёк и цианоз руки на стороне устройства, расширение подкожных вен

Забрюшинная гематома заслуживает отдельного внимания: это единственное осложнение доступа, которое проявляется гиповолемией при полностью спокойном виде места пункции, и его следует предполагать у любого пациента с гипотензией в первые сутки после бедренного артериального доступа.

Осложнения, специфичные для ЧКВ

Тромбоз стента классифицируется по срокам: острый — в первые 24 часа, подострый — от суток до месяца, поздний — от месяца до года, очень поздний — позднее года. Клинически проявляется картиной острого коронарного синдрома, чаще с подъёмом сегмента ST, летальность высока. Ключевой элемент анамнеза — приём двойной антиагрегантной терапии: самостоятельное прекращение приёма или пропуск связаны с резким возрастанием риска, и этот вопрос задаётся прямо.

Перфорация коронарной артерии с гемоперикардом и тампонадой развивается интраоперационно либо в ближайшие часы. **Контраст-ассоциированное острое повреждение почек** манифестирует на 2–3-и сутки и к болевому синдрому отношения

не имеет, но объясняет слабость и уменьшение диуреза у пациента, обратившегося в эти сроки.

Осложнения, специфичные для имплантированных устройств

Пневмоторакс — следствие пункции подключичной вены; частота 0,4–2,8 %, дренирование требуется примерно в 0,7 % случаев. Проявляется в первые часы, однако описаны и отсроченные случаи, в том числе у пациентов, использующих аппараты неинвазивной вентиляции.

Перфорация электродом делится на острую (до 24 часов), подострую (от суток до месяца, чаще 5–29-е сутки) и хроническую (позднее месяца). Признаки, помимо боли: **стимуляция диафрагмы** — ритмичные сокращения, синхронные с работой устройства, шум трения перикарда, нарушение навязывания ритма. Нормальные параметры стимуляции и импеданса перфорацию не исключают.

Дислокация электрода возникает преимущественно в первые двое суток, но описана до 120-х суток; проявляется возвратом исходной симптоматики и нарушением стимуляции на ЭКГ.

Инфекция ложа развивается в сроки от недель до месяцев: локальная болезненность, гиперемия, флюктуация, лихорадка; при вовлечении электродов — картина инфекционного эндокардита. **Синдром Твиддлера** — смещение электродов вследствие вращения корпуса устройства пациентом в ложе.

Причины, не связанные с процедурой

Боль в груди у пациента после вмешательства нередко имеет внепроцедурное происхождение, и эти причины остаются в дифференциальном ряду:

- **скелетно-мышечная боль** после многочасового вынужденного положения на столе с фиксированными руками; воспроизводится пальпацией, усиливается при движениях, наиболее часто в области грудино-ключичных сочленений и межрёберных мышц;
- **гастроэзофагеальный рефлюкс**, в том числе на фоне термического раздражения пищевода;
- **острый коронарный синдром** обычного, непроцедурного генеза — пациент с аритмией и ожирением, как правило, имеет и коронарный атеросклероз;
- **тромбоэмболия лёгочной артерии** — гиподинамия в дни после вмешательства, пункция вен, сопутствующие факторы;
- **тревожное расстройство**, распространённое после кардиологических вмешательств; принимается во внимание только после исключения перечисленного выше.

Осмотр, доступный выездной бригаде

Ни одно из перечисленных осложнений не диагностируется на догоспитальном этапе окончательно. Задача осмотра — разделить состояния, требующие экстренной эвакуации в специализированный центр, и состояния, допускающие плановый маршрут, а также передать принимающей стороне набор находок, сокращающий диагностический путь.

Приём	Находка	Интерпретация
Осмотр шейных вен	Набухание в положении полусидя	Повышенное давление в правых отделах: тампонада, тромбоз, правожелудочковая недостаточность
Измерение АД на вдохе и выдохе	Снижение систолического > 10 мм рт. ст. на вдохе	Парадоксальный пульс: тампонада
Аускультация сидя с наклоном вперёд	Шум трения перикарда	Перикардит; непостоянен, отсутствие шума диагноз не снимает
АД на обеих руках	Разница более 15–20 мм рт. ст.	Аргумент в пользу поражения аорты; при радиальном доступе учитывают возможную окклюзию артерии
Сравнительная аускультация и перкуссия	Асимметрия дыхания на стороне имплантации	Пневмоторакс, гемоторакс
Осмотр и пальпация места пункции	Гематома, пульсирующее образование, шум	Осложнение доступа
Пальпация живота и боковых областей	Болезненность, притупление, гипотензия без наружной гематомы	Забрюшинная гематома
Термометрия	Лихорадка в течение двух месяцев после абляции ЛП	Атриозофагеальная фистула, синдром постповреждения сердца, инфекция устройства
Неврологический осмотр, глюкометрия	Очаговый дефицит, спутанность	Эмболия, в том числе воздушная; гипогликемия как устранимый имитатор
Наблюдение за грудной стенкой	Ритмичные сокращения диафрагмы, синхронные со стимуляцией	Перфорация или дислокация электрода
ЭКГ в 12 отведениях	Диффузный подъём ST с депрессией PR	Перикардит; при локальных изменениях — коронарное событие
Пальпация грудной стенки	Полное воспроизведение боли	Скелетно-мышечный компонент; сопутствующий перикардит не исключает

Особенности интерпретации у этой группы пациентов

- Бета-адреноблокатор или антиаритмический препарат ограничивает хронотропный ответ: нормальная частота сердечных сокращений при гипотензии или кровопотере не является успокаивающим признаком. Информативна разница с привычной для пациента частотой, а не расстояние до формальной границы тахикардии.
- Отсутствие выпота в перикарде исключает тампонаду, но не перикардит: при клинически диагностированном постабляционном перикардите выпот выявляется примерно у одного пациента из одиннадцати.

- Нормальная эхокардиограмма не исключает расслоения аорты: чувствительность трансторакального исследования для проксимального расслоения составляет порядка трёх четвертей, метод верификации — компьютерная томография с контрастированием.
- Нормальные параметры стимуляции не исключают перфорации электродом.
- Лихорадка в течение месяца после аблации левого предсердия рассматривается как симптом осложнения вмешательства до момента его исключения; первичная компьютерная томография у четверти пациентов с фистулой оказывается неизменённой, что не отменяет диагноза при сохраняющемся клиническом подозрении.
- Инфильтраты в лёгких и лихорадка после аблации могут отражать синдром постповреждения сердца, а не пневмонию, и в этом случае не отвечают на антибактериальную терапию.
- Серийные эхокардиограммы сравнивают по факту наличия или отсутствия выпота, а не по значению фракции выброса: межоператорская вариабельность метода составляет несколько процентов, и разница в 2–3 % между двумя исследованиями динамики не отражает.

Маршрут и передача

Пациента с болью в груди после инвазивного вмешательства целесообразно эвакуировать в стационар, где вмешательство выполнялось: там доступны исходные данные процедуры, ангиограммы и протоколы, а оператор способен оценить вероятность специфического осложнения за минуты. При признаках тампонады, подозрении на фистулу или на тромбоз стента маршрут определяется как экстренный в центр с рентгеноперационной и кардиореанимацией.

Содержание передачи, сокращающее диагностический путь:

- вид вмешательства, дата и тип доступа, тип энергии, если известен;
- интервал между вмешательством и появлением симптома;
- характер боли и её зависимость от положения тела, воспроизводимость пальпацией;
- наличие или отсутствие лихорадки, одинофагии, неврологической симптоматики;
- состояние шейных вен, парадоксальный пульс, АД на обеих руках;
- состояние места пункции и данные осмотра живота;
- принимаемые препараты, отдельно — двойная антиагрегантная терапия и антикоагулянты, факт пропуска приёма;
- сравнение с ЭКГ, выданной при выписке.

Симптоматическое лечение на этапе эвакуации проводится в соответствии с действующими Алгоритмами оказания скорой и неотложной медицинской помощи города Москвы.

Возвращение к клиническому случаю

Интервал — вторые сутки после радиочастотной аблации в левом предсердии. Это исключает по срокам атриозеофагеальную фистулу как первоочередную версию (медиана дебюта 18 суток, при этом самые ранние случаи описаны с первых суток, поэтому появление лихорадки изменит трактовку) и делает маловероятным стеноз лёгочных вен, дебютирующий месяцами позже.

Гемодинамика стабильна, шейные вены не набухшие, тоны ясные, парадоксального пульса нет, давление одинаково на обеих руках — данных за тампонаду нет. Доступ

венозный бедренный: инструментирование аорты не выполнялось, места пункции спокойны, дистальный пульс сохранён, живот безболезненный — осложнения артериального доступа и забрюшинное кровотечение маловероятны. Дыхание симметрично, SpO₂ 99 % — против пневмоторакса, который к тому же не характерен для этого типа доступа.

Характер боли складывается в перикардальный: усиление в положении лёжа, облегчение в положении сидя с наклоном вперёд, иррадиация в шею и надплечье, соответствующая иннервации перикарда диафрагмальным нервом. Срок дебюта — первые часы — совпадает с медианой дебюта постаблационного перикардита после радиочастотной аблации. Воспроизводимость боли при пальпации перикардит не исключает: после многочасового вынужденного положения на столе скелетно-мышечный компонент присутствует у значительной части пациентов и наслаивается на перикардальную боль. Правосторонняя локализация с иррадиацией в шею дополнительно допускает раздражение правого диафрагмального нерва, проходящего вблизи правой верхней лёгочной вены.

Отсутствие выпота при эхокардиографии, если исследование выполнено, диагноз перикардита не снимает, а серийные исследования в этой ситуации выполняются для исключения отсроченного накопления жидкости.

Итоговая формулировка для передачи: вторые сутки после радиочастотной аблации левого предсердия, болевой синдром перикардального характера при стабильной гемодинамике, признаков тампонады нет, лихорадки нет, очаговой неврологической симптоматики нет, ЭКГ без динамики к плёнке при выписке; целесообразна эвакуация в стационар, выполнявший вмешательство, для эхокардиографии, оценки маркёров воспаления и решения о противовоспалительной терапии.

Резюме

- Дифференциальный ряд после кардиологического вмешательства определяется маршрутом инструмента и типом энергии, а не формулировкой диагноза в выписке: венозный доступ и работа в левом предсердии, артериальный ретроградный доступ и имплантация устройства дают три разных набора осложнений.
- Интервал от вмешательства до симптома — основной диагностический инструмент догоспитального этапа: перикардит дебютирует в первые сутки, перфорация электродом преимущественно в первый месяц, атриоэзофагеальная фистула — на третьей неделе, стеноз лёгочных вен — месяцами позже.
- Тампонада возможна при нормальной частоте сердечных сокращений: бета-адреноблокатор и вагусные рефлексy ограничивают тахикардический ответ.
- Отсутствие выпота в перикарде исключает тампонаду, но не перикардит; диагноз перикардита клинический.
- Лихорадка в течение месяца после аблации левого предсердия — симптом осложнения вмешательства до момента исключения фистулы; при подозрении избегают повышения давления в пищеводе и информируют центр, выполнявший процедуру.
- Гипотензия в первые сутки после бедренного артериального доступа при спокойном месте пункции требует исключения забрюшинного кровотечения.
- Стимуляция диафрагмы у пациента с имплантированным устройством — признак смещения или перфорации электродом, в том числе при нормальных параметрах стимуляции.

- Скелетно-мышечная боль и воспроизводимость боли при пальпации распространены после многочасового вмешательства и не исключают перикардальную природу болевого синдрома.

Источники

- 2024 EHRA/HRS/APHRS/LAHRS Expert Consensus Statement on Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation — частоты осложнений: сосудистые 1–4 %, тампонада 0,4–1,3 %, перфорация пищевода 0,02–0,1 %.
- Tilz R. R. et al. POTTER-AF: a worldwide survey on incidence, management, and prognosis of oesophageal fistula formation following atrial fibrillation catheter ablation. *European Heart Journal*, 2023 — 553 729 процедур, частота 0,025 %, сроки дебюта, структура симптомов, летальность 65,8 %.
- Della Rocca D. G. et al. Clinical presentation, diagnosis, and treatment of atrioesophageal fistula resulting from atrial fibrillation ablation. *Journal of Cardiovascular Electrophysiology*, 2021 — систематический обзор: медиана 21 сутки, неврологическая симптоматика 75 %, неизменённая первичная томография у 24 %.
- Severe Periprocedural Complications After Ablation for Atrial Fibrillation. *JACC: Clinical Electrophysiology*, 2024 — 33 879 процедур: тампонада 0,68 %, инсульт 0,097 %, фистула 0,021 %, летальность 0,021 %; доля отсроченных тампонад.
- Incidence and Predictors of Cardiac Tamponade in Contemporary Thermal Catheter Ablation of Atrial Fibrillation. *Journal of Cardiovascular Electrophysiology*, 2025 — 12 820 процедур: тампонада 0,64 %, предикторы, объём дренирования.
- Concise Guidelines of the European Cardiac Arrhythmias Society on Catheter Ablation of Atrial Fibrillation, 2025 — суммарная частота осложнений 5,1–7,5 %, структура фатальных событий, поздние тампонады.
- Heeger C.-H. et al. Phrenic Nerve Injury During Cryoballoon-Based Pulmonary Vein Isolation: Results of the Worldwide YETI Registry. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology*, 2022 — 17 356 пациентов: частота 4,2 %, восстановление 97 % в течение года, стойкое повреждение 0,1 %.
- Pericarditis After Catheter Ablation for Atrial Fibrillation. *JACC: Clinical Electrophysiology*, 2023 — 1540 пациентов, частота 3,7 %, медиана дебюта 1 сутки.
- Acute pericarditis after atrial fibrillation ablation: incidence, characteristics, and risk factors. *Heart Rhythm*, 2022 — 2215 пациентов, частота 10,2 %, новый выпот у 9,3 %, изменения ЭКГ у 19,5 %.
- Risk of acute pericarditis after pulsed-field ablation pulmonary vein isolation. *Heart Rhythm* O2, 2025 — PFA 4,3 % против РЧ 3,4 %, медиана дебюта 4 и 1 сутки соответственно.
- Clinical Features of Post Cardiac Injury Syndrome Following Catheter Ablation of Arrhythmias: Systematic Review, 2018 — структура синдрома: плевритическая боль и лихорадка по 76 %, инфильтраты в лёгких 28,6 %, неэффективность антибактериальной терапии.
- 2025 ESC Guidelines — диагностические критерии синдрома постповреждения сердца, оценочная частота после аблации фибрилляции предсердий 3,7–10 %.
- Burri H. et al. EHRA consensus statement on optimal implantation technique for conventional pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators — пневмоторакс 0,4–2,8 %, перфорация 0,1–1,5 %, тампонада 0,5–1,5 %, дислокация электрода 1,2–3,3 %, инфекция 0,6–3,4 %.
- Navigating Complications in Cardiac Pacemakers: A Comprehensive Review and Management Strategies. *Reviews in Cardiovascular Medicine*, 2024 — классификация

перфораций по срокам, сроки дислокации электрода, пневмоторакс с дренированием 0,66 %.

- Percutaneous Coronary Intervention and vascular access complications: a contemporary review. *npj Cardiovascular Health*, 2025 — гематома радиального доступа 1,2–2,6 %, бедренного 2–12 %; ложная аневризма 0,02–0,09 % и 0,05–8 %; забрюшинное кровотечение 0,025–0,9 %.
- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы, 2025 — объём симптоматической помощи и маршрутизация.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
gray806_phrenic_vagus.png	Диафрагмальный нерв и его отношения с блуждающим нервом	Gray H. Anatomy of the Human Body, 1918, план 806. Public domain, через Викисклад
phrenic_risk_points.svg	Точки риска для диафрагмальных нервов при вмешательствах	Составлено для настоящего материала. CC BY-NC-SA 4.0
Схемы в виде текстовых блоков	Маршруты доступа, анатомия соседей левого предсердия, сроки осложнений	Составлены для настоящего материала. CC BY-NC-SA 4.0

Выходные данные

Материал: «Боль в груди после инвазивного вмешательства на сердце». Версия 1.0 от 15 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай приведён как учебная виньетка. Он собран из типичной картины и не является выпиской из медицинской документации: сведения, позволяющие установить личность, отсутствуют, детали изменены, совпадения возможны и неизбежны — такие вызовы происходят ежедневно.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.