

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Педиатрические дозы по массе

Предрасчитанные значения для 3, 5, 10, 15, 20 и 30 кг



Цифры — «Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи», приложение к приказу ДЗМ от 18.05.2023 № 535. Страницы указаны в тексте.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.1 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Энергия

Дефибрилляция: первый разряд 2 Дж/кг до 1 года и 4 Дж/кг с 1 года; все последующие — 4 Дж/кг (стр. 159). Синхронизированная кардиоверсия при нестабильной узкой тахикардии: 1 Дж/кг, затем 2 Дж/кг (стр. 191). При фибрилляции предсердий с проведением по дополнительному соединению и при полиморфной желудочковой тахикардии: 1–2 Дж/кг, затем 4 Дж/кг (стр. 191–193).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Дефибрилляция 2 Дж/кг (первый разряд до 1 года)	6 Дж	10 Дж	20 Дж	—	—	—
Дефибрилляция 4 Дж/кг (первый с 1 года и все повторные)	12 Дж	20 Дж	40 Дж	60 Дж	80 Дж	120 Дж
Кардиоверсия 1 Дж/кг	3 Дж	5 Дж	10 Дж	15 Дж	20 Дж	30 Дж
Кардиоверсия 2 Дж/кг	6 Дж	10 Дж	20 Дж	30 Дж	40 Дж	60 Дж
Кардиоверсия 4 Дж/кг	12 Дж	20 Дж	40 Дж	60 Дж	80 Дж	120 Дж

Реанимация

Эпинефрин внутривенно и внутрикостно (стр. 158, 159, 194): 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг) в разведении натрия хлорида 0,9% 1:10000 каждые 3–5 мин; при брадикардии суммарно до 1 мг (1 мл). Ампла 0,1% = 1 мг/мл (приложение 44). 0,01 мл/кг ампулы = 0,01 мг/кг. Приложение 45: 1 мл эпинефрина развести 9 мл натрия хлорида 0,9% (1:10000); в той же строке расчётная доза указана как 0,1 мл/год жизни.

Эндотрахеально при асистолии (стр. 158): 0,1 мг/кг (0,1 мл/кг) в разведении 1:1000. В блоке фибрилляции на стр. 159 при той же дозе 0,1 мг/кг в скобках стоит 0,01 мл/кг.

Амиодарон: 5 мг/кг (0,1 мл/кг) после третьего разряда при ФЖ / желудочковой тахикардии без пульса; разовая доза не более 300 мг (стр. 159, 190–193; приложение 45). При асистолии и электрической активности без пульса амиодарон не указан.

Лидокаин при непереносимости амиодарона: 1 мг/кг (0,05 мл/кг), вводить только 1% раствор, 2% разводят 1:1 (стр. 159, 192–193; приложение 45, ампула 20 мг/мл).

Атропин: 0,01–0,02 мг/кг (0,01–0,02 мл/кг) (стр. 193). Приложение 45: 0,01 мг/кг, 0,1 мл на каждые 10 кг. Нижнего порога разовой дозы в этих строках нет.

Трифосаденин: 0,1 мг/кг (0,01 мл/кг), первая доза не более 6 мг; затем 0,2 мг/кг (0,02 мл/кг), не более 12 мг (1,2 мл) (стр. 190). Приложение 45: 0,1–0,2 мг/кг, 0,01 мл/кг, максимальная доза 1 мл.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин в/в, 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг ампулы 0,1%)	0,03 мг / 0,03 мл	0,05 мг / 0,05 мл	0,1 мг / 0,1 мл	0,15 мг / 0,15 мл	0,2 мг / 0,2 мл	0,3 мг / 0,3 мл
Тот же после разведения 1+9 (1:10000)	0,3 мл	0,5 мл	1,0 мл	1,5 мл	2,0 мл	3,0 мл
Эпинефрин эндотрахеально, 0,1 мг/кг (0,1 мл/кг)	0,3 мг / 0,3 мл	0,5 мг / 0,5 мл	1 мг / 1 мл	1,5 мг / 1,5 мл	2 мг / 2 мл	3 мг / 3 мл
Амиодарон 5 мг/кг (0,1 мл/кг)	15 мг / 0,3 мл	25 мг / 0,5 мл	50 мг / 1 мл	75 мг / 1,5 мл	100 мг / 2 мл	150 мг / 3 мл
Атропин 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг)	0,03 мг	0,05 мг	0,1 мг	0,15 мг	0,2 мг	0,3 мг
Атропин 0,02 мг/кг (0,02 мл/кг)	0,06 мг	0,1 мг	0,2 мг	0,3 мг	0,4 мг	0,6 мг
Трифосаденин 0,1 мг/кг (0,01 мл/кг), ≤ 6 мг	0,3 мг / 0,03 мл	0,5 мг / 0,05 мл	1 мг / 0,1 мл	1,5 мг / 0,15 мл	2 мг / 0,2 мл	3 мг / 0,3 мл
Трифосаденин 0,2 мг/кг (0,02 мл/кг), ≤ 12 мг	0,6 мг / 0,06 мл	1 мг / 0,1 мл	2 мг / 0,2 мл	3 мг / 0,3 мл	4 мг / 0,4 мл	6 мг / 0,6 мл
Лидокаин 1 мг/кг (0,05 мл/кг ампулы 2%)	3 мг / 0,15 мл	5 мг / 0,25 мл	10 мг / 0,5 мл	15 мг / 0,75 мл	20 мг / 1 мл	30 мг / 1,5 мл

Инфузия и глюкоза

Натрия хлорид 0,9% 20 мл/кг болюсно — шок, анафилаксия (раздел 15). При гиповолемии новорождённого: 10 мл/кг. Гипогликемия: декстроза 10% — 2 мл/кг внутривенно (стр. 168; приложение 45).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
NaCl 0,9 %, 20 мл/кг	60 мл	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	600 мл
NaCl 0,9 %, 10 мл/кг	30 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	300 мл
Декстроза 10 %, 2 мл/кг	6 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	60 мл

Анафилаксия

Эпинефрин внутримышечно в передне-боковую поверхность бедра: 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг) (стр. 164–165). Потолок разовой дозы: до 6 лет — 0,15 мг (0,15 мл); с 6 до 12 лет — 0,3 мг (0,3 мл); с 12 лет — 0,5 мг (0,5 мл). При отсутствии эффекта — повтор через 5 мин. Преднизолон 3–5 мг/кг (0,1–0,16 мл/кг) внутривенно.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин в/м, 0,01 мг/кг (0,01 мл/кг)	0,03 мг / 0,03 мл	0,05 мг / 0,05 мл	0,1 мг / 0,1 мл	0,15 мг / 0,15 мл	0,2 мг / 0,2 мл	0,3 мг / 0,3 мл
Преднизолон 3–5 мг/кг	9–15 мг	15–25 мг	30–50 мг	45–75 мг	60–100 мг	90–150 мг

Для 20 кг расчёт 0,2 мг. Если возраст меньше 6 лет, разовая доза ограничена 0,15 мг (0,15 мл).

Судороги

Диазепам, приложение 43 (стр. 434): с 1 месяца; исходная доза 0,15–0,2 мг/кг (0,03–0,04 мл/кг) внутривенно медленно за 5 минут; далее до максимальной разовой: до 5 лет — 5 мг (1 мл), старше 5 лет — 10 мг (2 мл). В алгоритмах разделов 15 и 19 рядом стоит 0,3–0,5 мг/кг (0,06–0,1 мл/кг) внутривенно и 0,5 мг/кг (0,1 мл/кг) внутримышечно. Приложение 45: 0,2–0,5 мг/кг внутривенно, 0,5 мг/кг внутримышечно. Вальпроевая кислота с 6 месяцев: 15 мг/кг (0,15 мл/кг) внутривенно медленно (стр. 197).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Диазепам, исходная, 0,15–0,2 мг/кг (прил. 43)	0,45–0,6 мг	0,75–1,0 мг	1,5–2,0 мг	2,25–3,0 мг	3,0–4,0 мг	4,5–6,0 мг
Диазепам в/в, 0,3–0,5 мг/кг	0,9–1,5 мг	1,5–2,5 мг	3–5 мг	4,5–7,5 мг	6–10 мг	9–15 мг
Диазепам в/в, мл 0,5 % при 0,3–0,5 мг/кг	0,18–0,3	0,3–0,5	0,6–1,0	0,9–1,5	1,2–2,0	1,8–3,0
Вальпроевая кислота 15 мг/кг (0,15 мл/кг)	45 мг / 0,45 мл	75 мг / 0,75 мл	150 мг / 1,5 мл	225 мг / 2,25 мл	300 мг / 3 мл	450 мг / 4,5 мл

Потолок диазепама задан возрастом, не массой: 5 мг до пяти лет, 10 мг старше пяти. Клетка 30 кг при 0,3–0,5 мг/кг даёт 9–15 мг; 15 мг выше потолка приложения 43.

Лихорадка

Порог жаропонижающих при остром бронхите и сходных строках раздела 16: температура тела $\geq 38,5$ °C; $\geq 38,0$ °C у детей до 3 месяцев, при отягощённом преморбиде и судорожном анамнезе. Парацетамол 15 мг/кг внутрь или ректально. Метамизол натрия 10 мг/кг (0,02 мл/кг) внутримышечно или внутривенно (стр. 182, 197; приложение 45). Физические методы охлаждения противопоказаны при бледной гипертермии.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Парацетамол 15 мг/кг	45 мг	75 мг	150 мг	225 мг	300 мг	450 мг
Метамизол 10 мг/кг (0,02 мл/кг)	30 мг / 0,06 мл	50 мг / 0,1 мл	100 мг / 0,2 мл	150 мг / 0,3 мл	200 мг / 0,4 мл	300 мг / 0,6 мл

Круп

Будесонид через небулайзер (стр. 181): I степень — 0,5 мг (1 мл) в разведении до 3 мл; II степень — 1 мг (2 мл) в разведении 2 мл; III степень — 2 мг (4 мл) в разведении 2 мл одновременно с эпинефрином. Эпинефрин при III степени: 0,1 мг/кг (0,1 мл/кг), не более 3 мг (1 мл). Преднизолон или дексаметазон — по степени, как на той же странице.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин ингаляционно, 0,1 мг/кг (0,1 мл/кг), не более 1 мл	0,3 мл	0,5 мл	1,0 мл	1,0 мл	1,0 мл	1,0 мл

В клетках 15 кг и выше объём обрезан до 1 мл — так в скобках на стр. 181.

Анальгезия

Фентанил: 1–4 мкг/кг (0,02–0,08 мл/кг) (стр. 167, 191; приложение 45, ампула 50 мкг/мл).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Фентанил 1–4 мкг/кг	3–12 мкг	5–20 мкг	10–40 мкг	15–60 мкг	20–80 мкг	30–120 мкг
Фентанил, мл 0,005 %	0,06–0,24	0,1–0,4	0,2–0,8	0,3–1,2	0,4–1,6	0,6–2,4

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи, приложение к приказу Департамента здравоохранения города Москвы от 18.05.2023 № 535. Раздел 15 (стр. 158–168); раздел 16 (круп, лихорадка, стр. 181–182); раздел 18 (стр. 190–194); раздел 19 (судороги, стр. 197); приложение 43 (стр. 434); приложения 44–45 (стр. 435–447).
- Препарасчёт: доза на килограмм из указанной строки, умноженная на массу столбца. Где в той же строке задан потолок, в клетке стоит меньшее из двух чисел.
- Где одна и та же книга пишет два числа, оба оставлены: эндотрахеальный эпинефрин 0,1 мл/кг (стр. 158) и 0,01 мл/кг (стр. 159); трифосаденин 12 мг (стр. 190) и 1 мл (приложение 45); диазепам 0,15–0,2 мг/кг (приложение 43) и 0,3–0,5 мг/кг (разделы 15, 19); эпинефрин при крупе «3 мг (1 мл)» (стр. 181).

В материале нет формул массы, САД и размера трубки: в перечисленных разделах их нет. При расхождении с экземпляром, который лежит в машине, приоритет у экземпляра в машине.