

Амиодарон

Антиаритмик III класса · свойства всех четырёх классов по Вогану — Уильямсу

ФОРМА ВЫПУСКА

5 % · 3 мл = **150 мг**
50 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Блокада K⁺-каналов фазы 3 → удлинение потенциала действия и рефрактерного периода. Дополнительно: блокада Na⁺-каналов (I), неконкурентная β-блокада (II), блокада Ca²⁺-каналов (IV). Вазодилатация (частично от полисорбата 80). T½ 40–55 суток.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
ФЖ / ЖТ без пульса (после 3-го разряда)	300 мг (6 мл) ; повторно 150 мг (3 мл) однократно	в/в струйно
Ширококомплексная тахикардия, стабильная гемодинамика	150–300 мг (3–6 мл) в Д5% до 20 мл	в/в струйно
Ширококомплексная тахикардия, нестабильная гемодинамика (фон до ЭИТ)	150 мг (3 мл) в Д5% — 250 мл	в/в кап.
Узкокомплексная тахикардия при ХСН	300–450 мг (6–9 мл) в Д5% — 250 мл	в/в кап.
ФП < 48 ч (при противопоказаниях к пропafenону / прокаинамиду)	5 мг/кг (макс. 450 мг) в Д5% — 250 мл, ожидание до 20 мин	в/в кап.
Такисистолия ФП при застойной СН без гипотензии	300–450 мг (6–9 мл) в Д5% — 20 мл, насос, за 20 мин	в/в
Дети: такисистолия, WPW	5 мг/кг (0,1 мл/кг) в Д5%, инфузия ≥ 30 мин	в/в кап.
Пируэтная тахикардия (torsades de pointes)	противопоказан — магния сульфат	

Растворитель: только декстроза 5 % (Д5%). NaCl 0,9 % — осадок. Концентрация ≥ 0,6 мг/мл. Инфузия через шприцевой дозатор (полисорбат искажает каплю).

НАСОС 31-Р Дети: 150 мг (3 мл) + 47 мл Д5% = 50 мл (3 мг/мл); ступени 5, 10, 15 мкг/кг/мин. Взрослые: 150 мг (3 мл) + 17 мл Д5% = 20 мл (7,5 мг/мл).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Пируэтная тахикардия — сам удлиняет интервал QT
- Сочетание с бета-адреноблокаторами или верапамилом — тяжёлая брадикардия, АВ-блокада, гипотензия
- Препараты, удлиняющие QT (макролиды, антипсихотики) — риск torsades de pointes
- Новорождённые: бензиловый спирт в растворителе (синдром «gasping»)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Болюс вне остановки кровообращения — риск тяжёлой гипотензии; вне СЛР вводить за 20 мин
- Повышает концентрацию дигоксина вдвое; усиливает варфарин (рост МНО)
- T½ до 100 суток: пациент, прекративший приём месяц назад, по-прежнему под действием
- Линию промывать Д5%; не смешивать с другими препаратами в одном шприце