

ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

«Белая» лихорадка у детей

Прогностически неблагоприятный вариант лихорадки: признаки вазоспазма, литическая смесь и обязательный консилиум со старшим врачом

Источник: информационно-методическое письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/1702 от 30.05.2024.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 30 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Информационно-методическое письмо адресовано выездному медицинскому персоналу и посвящено «белой» лихорадке — варианту прогностически неблагоприятного течения лихорадки у детей.

Операционное правило: **признаки «белой» лихорадки у ребёнка — показание к дистанционному медицинскому консилиуму с ответственным старшим врачом ССМП подстанции; только консилиум определяет показания к применению литической смеси.**

«Белая» лихорадка как состояние

Лихорадка — защитно-приспособительная реакция организма на патогенные раздражители, характеризующаяся перестройкой терморегуляции с повышением температуры тела и стимуляцией естественной реактивности. Если теплоотдача не соответствует теплопродукции вследствие значимого нарушения периферического кровообращения (вазоспазма), возникает вариант прогностически неблагоприятного течения — так называемая «белая» лихорадка. Состояние чаще встречается у детей и характеризуется увеличением теплопродукции при снижении теплоотдачи.

Клиническая картина

Признак	Характеристика
Температура	Быстрое повышение; отсутствие эффекта от жаропонижающих препаратов
Кожа	Бледность, мраморность, сухость, акроцианоз; холодные стопы и ладони — маркер вазоспазма периферического русла
Гемодинамика	Тахикардия
Общее состояние	Выраженное ухудшение самочувствия, озноб; возможно нарушение сознания
Течение	Нарушение микроциркуляции, метаболические расстройства, прогрессивно нарастающая дисфункция жизненно важных органов и систем

Холодные стопы и ладони на фоне высокой температуры — клинический признак, отграничивающий «белую» лихорадку от «розовой» (адекватной) при осмотре.

Допустимая терапия по письму

Согласно действующим инструкциям по медицинскому применению лекарственных препаратов и методическим рекомендациям Департамента здравоохранения города Москвы № 19 «Лихорадка у детей: тактика ведения и лечения», при «белой» лихорадке допустимо применение:

- **литической смеси** — растворы метамизола натрия, папаверина гидрохлорида и хлоропирамина — у детей в возрасте от 6 месяцев и старше;
- **раствора метамизола натрия в качестве монотерапии** — у детей в возрасте от 3 месяцев и старше.

Дозы письмо не приводит; определение показаний к применению указанных препаратов осуществляется по результатам проведённого дистанционного медицинского консилиума с ответственным старшим врачом ССМП подстанции.

Предписания письма

- Выездному медицинскому персоналу — учитывать письмо при оказании медицинской помощи лихорадящим детям.
- Письмо доводится до сведения выездного персонала под роспись.
- Предписано повторное ознакомление сотрудников с информационным письмом Станции от 09.10.2018 № 1-14/2974 «Особенности клинического течения ОРВИ и осложнений у детей до 3-х лет».

Источники

- Информационно-методическое письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/1702 от 30.05.2024.
- Методические рекомендации Департамента здравоохранения города Москвы № 19 «Лихорадка у детей: тактика ведения и лечения».
- Информационное письмо Станции № 1-14/2974 от 09.10.2018 «Особенности клинического течения ОРВИ и осложнений у детей до 3-х лет» (в письме предписано повторное ознакомление).

Выходные данные

«Белая» лихорадка у детей · версия 1.0 · сентябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.