

ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Коклюш

Периоды болезни, особенности у детей раннего возраста и
жизнеугрожающие осложнения по письму Станции

Источник: информационное письмо ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/3859 от 06.12.2024.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 30 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письмо

Письмо посвящено эпидемиологической настороженности медицинских работников при выявлении пациентов с коклюшем. Заболеваемость носит циклический характер с подъёмами каждые 4–6 лет.

Операционное содержание для бригады: **учитывать особенности дифференциальной диагностики коклюша и проводить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза с внесением сведений в карту вызова.**

Коклюш как болезнь

Коклюш — острая бактериальная инфекция, вызываемая *Bordetella pertussis*. При контакте с больным заболевание развивается у 90 % восприимчивых лиц. Чаще болеют дети дошкольного возраста; у взрослых заболевание протекает легче. Резервуар — больные и бактерионосители; механизм передачи аспирационный, путь — воздушно-капельный, ворота инфекции — слизистая респираторного тракта.

Патогенез: выделяемый бордетеллой эндотоксин вызывает паралич мерцательного эпителия, что обуславливает спастический кашель; формируется очаг возбуждения в дыхательном центре продолговатого мозга.

Клиническая картина

В анамнезе характерен сухой навязчивый или приступообразный кашель, приступы которого могут заканчиваться рвотой. Течение разделяется на три периода:

- **катаральный** — непродуктивный нарастающий кашель без выраженной интоксикации;
- **спазматический** — приступы спастического кашля с репризами: серией кашлевых толчков на выдохе, за которыми следует свистящий вдох (реприза);
- **разрешения** — постепенное урежение и ослабление приступов.

У детей раннего возраста вместо типичных приступов кашля отмечаются его эквиваленты — чихание, крик, плач; част геморрагический синдром: петехии на коже лица и верхней части туловища, кровоизлияния в склеры и центральную нервную систему.

Жизнеугрожающие осложнения

По письму, осложнениями коклюша, опасными для жизни, являются:

- нарушения дыхания — диспноэ и апноэ;
- пневмония с нарастающей дыхательной недостаточностью;
- ателектазы лёгких;
- ложный круп;
- пневмомедиастинум;
- острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт).

Апноэ и эквиваленты кашлевых приступов у детей раннего возраста относятся к основаниям для экстренной госпитализации.

Предписания письма

- Письмо доводится до выездного персонала под роспись и размещается на образовательном портале Станции (сроки — декабрь 2024 года).

- Выездной персонал учитывает особенности дифференциальной диагностики коклюша и проводит тщательный сбор эпидемиологического анамнеза с внесением сведений в карту вызова.

Источники

- Информационное письмо ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/3859 от 06.12.2024.

Выходные данные

Коклюш · версия 1.0 · сентябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом» · CC BY-NC-SA 4.0.
Материал носит справочный характер и не заменяет действующие приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.