

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Педиатрические дозы по массе

Предрасчитанные значения для 3, 5, 10, 15, 20 и 30 кг



Цифры — Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи, Москва, 2025. Страницы
указаны в таблицах.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Масса и нижняя граница САД

Параметр	Формула	Источник
Масса, 1–10 лет	возраст (годы) × 2 + 8 кг	Раздел 15
Масса до 12 мес	(возраст в месяцах + 9) / 2	Оценка при неизвестной массе
Нижняя граница САД, 1–10 лет	70 + возраст (годы) × 2 мм рт. ст.	Раздел 15
ЭТТ без манжеты	возраст / 4 + 4 мм	Раздел 15
ЭТТ с манжетой	возраст / 4 + 3,5 мм	Раздел 15

Энергия

Дефибрилляция, первый разряд: 2 Дж/кг до 1 года, 4 Дж/кг с 1 года; все последующие — 4 Дж/кг (стр. 159). Синхронизированная кардиоверсия: 1 Дж/кг, затем 2 Дж/кг; при фибрилляции предсердий с дополнительным путём и при полиморфной желудочковой тахикардии — до 4 Дж/кг (стр. 191–193).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Дефибрилляция 2 Дж/кг (первый разряд до 1 года)	6 Дж	10 Дж	20 Дж	—	—	—
Дефибрилляция 4 Дж/кг (первый с 1 года и все повторные)	12 Дж	20 Дж	40 Дж	60 Дж	80 Дж	120 Дж
Кардиоверсия 1 Дж/кг	3 Дж	5 Дж	10 Дж	15 Дж	20 Дж	30 Дж
Кардиоверсия 2 Дж/кг	6 Дж	10 Дж	20 Дж	30 Дж	40 Дж	60 Дж
Кардиоверсия 4 Дж/кг	12 Дж	20 Дж	40 Дж	60 Дж	80 Дж	120 Дж

Реанимация

Эпинефрин внутривенно и внутрикостно: 0,01 мг/кг каждые 3–5 мин (раздел 15; при брадикардии — стр. 194, суммарно до 1 мг). Раствор 1:10 000 (0,1 мг/мл): 0,01 мг/кг = 0,1 мл/кг. Эндотрахеально: 0,1 мг/кг раствора 1:1000 (0,1 мл/кг), если нет внутривенного доступа.

Амиодарон: 5 мг/кг после третьего разряда при ФЖ / желудочковой тахикардии без пульса; разовая доза не более 300 мг (стр. 190–193). При асистолии и электрической активности без пульса амиодарон не вводится.

Лидокаин при непереносимости амиодарона: 1 мг/кг, только 1% раствор; 2% разводят 1:1 (стр. 192–193). Один процент содержит 10 мг/мл, поэтому 1 мг/кг = 0,1 мл/кг. В том же абзаце книги указано 0,05 мл/кг — это объём 2% раствора без разведения, не 1%.

Атропин: 0,01–0,02 мг/кг (стр. 193). Разовая доза ниже 0,1 мг не применяется.

Трифосаденин: 0,1 мг/кг (не более 6 мг), затем 0,2 мг/кг (не более 12 мг) (стр. 190). В приложении 45 указан максимум 10 мг (1 мл) — расхождение внутри того же издания.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин в/в, СЛР, 0,01 мг/кг (1:10 000)	0,03 мг / 0,3 мл	0,05 мг / 0,5 мл	0,1 мг / 1 мл	0,15 мг / 1,5 мл	0,2 мг / 2 мл	0,3 мг / 3 мл
Эпинефрин эндотрахеально, 0,1 мг/кг (1:1000)	0,3 мг / 0,3 мл	0,5 мг / 0,5 мл	1 мг / 1 мл	1,5 мг / 1,5 мл	2 мг / 2 мл	3 мг / 3 мл
Амиодарон 5 мг/кг	15 мг	25 мг	50 мг	75 мг	100 мг	150 мг
Атропин 0,01 мг/кг, не менее 0,1 мг	0,1 мг	0,1 мг	0,1 мг	0,15 мг	0,2 мг	0,3 мг
Атропин 0,02 мг/кг, не менее 0,1 мг	0,1 мг	0,1 мг	0,2 мг	0,3 мг	0,4 мг	0,6 мг
Трифосаденин 0,1 мг/кг (≤ 6 мг)	0,3 мг	0,5 мг	1 мг	1,5 мг	2 мг	3 мг
Трифосаденин 0,2 мг/кг (≤ 12 мг)	0,6 мг	1 мг	2 мг	3 мг	4 мг	6 мг
Лидокаин 1 мг/кг, 1%	3 мг / 0,3 мл	5 мг / 0,5 мл	10 мг / 1 мл	15 мг / 1,5 мл	20 мг / 2 мл	30 мг / 3 мл

Инфузия

Болус натрия хлорида 0,9 % при шоке: 20 мл/кг (раздел 15; анафилаксия — разделы 16, 18–20). При гиповолемии новорождённого: 10 мл/кг.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
NaCl 0,9 %, 20 мл/кг	60 мл	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	600 мл
NaCl 0,9 %, 10 мл/кг (новорождённый)	30 мл	50 мл	—	—	—	—

Анафилаксия

Эпинефрин внутримышечно в передне-боковую поверхность бедра: 0,01 мг/кг раствора 1:1000 (1 мг/мл), то есть 0,01 мл/кг (разделы 16, 18–20). Потолок разовой дозы по возрасту: до 6 лет — 0,15 мг; 6–12 лет — 0,3 мг; старше 12 лет — 0,5 мг. При отсутствии эффекта доза повторяется через 5 мин.

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин в/м, 0,01 мг/кг (1:1000)	0,03 мг / 0,03 мл	0,05 мг / 0,05 мл	0,1 мг / 0,1 мл	0,15 мг / 0,15 мл	0,2 мг / 0,2 мл	0,3 мг / 0,3 мл

Для 20 кг расчёт 0,2 мг. Если возраст меньше 6 лет, разовая доза ограничена 0,15 мг (0,15 мл). Преднизолон при анафилаксии: 3–5 мг/кг внутривенно.

Судороги

Диазепам, приложение 43: внутривенно 0,3–0,5 мг/кг (0,06–0,1 мл/кг раствора 0,5 %); внутримышечно 0,5 мг/кг (0,1 мл/кг). Максимум: до 5 лет — 5 мг (1 мл); с 5 лет — 10 мг (2 мл).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Диазепам в/в, 0,3–0,5 мг/кг	0,9–1,5 мг	1,5–2,5 мг	3–5 мг	4,5–5 мг	6–10 мг	9–10 мг
Диазепам в/в, мл 0,5 %	0,18–0,3	0,3–0,5	0,6–1,0	0,9–1,0	1,2–2,0	1,8–2,0

В клетках 15, 20 и 30 кг верхняя граница уже обрезана возрастным максимумом (5 мг до пяти лет, 10 мг с пяти). Вальпроевая кислота с 6 месяцев: 15 мг/кг внутривенно медленно (разделы 16, 18–20).

Лихорадка

Парацетамол 15 мг/кг внутрь или ректально. Метамизол натрия 10 мг/кг (0,02 мл/кг) внутримышечно или внутривенно. Порог снижения температуры: 38,5 °С; 38,0 °С у детей младше 3 месяцев, при отягощённом преморбиде и судорожном анамнезе (разделы 16, 18–20).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Парацетамол 15 мг/кг	45 мг	75 мг	150 мг	225 мг	300 мг	450 мг
Метамизол 10 мг/кг	30 мг	50 мг	100 мг	150 мг	200 мг	300 мг

Круп

Будесонид через небулайзер: I степень — 0,5 мг; II степень — 1 мг (2 мл); III степень — 2 мг одновременно с эпинефрином. Эпинефрин при крупе III степени: 0,1 мг/кг (0,1 мл/кг раствора 1:1000), не более 3 мг, через небулайзер. Раствор 1:1000 содержит 1 мг/мл, поэтому 3 мг = 3 мл. Преднизолон 1–5 мг/кг или дексаметазон 0,2–1,2 мг/кг в зависимости от степени (разделы 16, 18–20).

	3 кг	5 кг	10 кг	15 кг	20 кг	30 кг
Эпинефрин ингаляционно, 0,1 мг/кг (1:1000), ≤ 3 мг	0,3 мл	0,5 мл	1,0 мл	1,5 мл	2,0 мл	3,0 мл

Источники

- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим бригадами службы скорой медицинской помощи города Москвы, 2025. Раздел 15 (педиатрическая реанимация, стр. 155–170, дефибрилляция стр. 159); детская кардиология стр. 190–194; разделы 16, 18–20 (лихорадка, судороги, круп, анафилаксия, стр. 175–212); приложение 43 (дiazepam); приложение 45 (оснащение, максимум трифосаденина).
- Предрасчёт: указанная в алгоритме доза на килограмм, умноженная на массу столбца. Где алгоритм задаёт потолок, в клетке стоит меньшее из двух чисел.
- Внутри издания есть два расхождения, оба оставлены видимыми: максимум трифосаденина (12 мг на стр. 190 и 10 мг в приложении 45) и объём лидокаина (1 мг/кг 1% раствора = 0,1 мл/кг; в тексте рядом стоит 0,05 мл/кг).
- Эпинефрин при крупе: «не более 3 мг». Раствор 1:1000 = 1 мг/мл, поэтому потолок = 3 мл.

В материале нет доз, которых нет в перечисленных разделах. При расхождении с действующим экземпляром книги приоритет у книги.