

Преднизолон

Синтетический глюкокортикостероид · геномный эффект через 4-6 ч

ФОРМА ВЫПУСКА

3 % · 1 мл = **30 мг**
30 мг/мл

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Геномный путь (основной, часы): транскрепрессия NF-κB → ↓ цитокинов; синтез аннексина A1 → блокада фосфолипазы A₂ → ↓ простагландинов и лейкотриенов. Негеномный (минуты): стабилизация мембран, permissive-эффект на катехоламины. 5 мг преднизолона ≈ 0,75 мг дексаметазона ≈ 20 мг гидрокортизона.

ДОЗИРОВАНИЕ ПО АЛГОРИТМАМ

Клиническая ситуация	Доза	Путь
Анафилактический шок (после адреналина, при САД < 80)	90-120 мг (3-4 мл)	в/в
Аллергический отёк ВДП	90-120 мг (3-4 мл)	в/в
Астма / ХОБЛ (после ингаляции)	90 мг (3 мл)	в/в
Крапивница, ангиотёк	60-90 мг (2-3 мл)	в/в, в/м
Перелом позвоночника с неврологией	150 мг (5 мл)	в/в
Дети: аллергия, круп	3-5 мг/кг	в/в
Дети: астма	1-2 мг/кг (макс. 60 мг)	в/в
ЧМТ любой степени тяжести	противопоказан (CRASH, 2004)	

ЭФФЕКТ клинический противовоспалительный эффект — через **4-6 часов**. Стероид не первый препарат на вызове.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- ЧМТ — рост летальности (CRASH)
- Спинальная травма — международные рекомендации отказались (NASCIS, осложнения), но строка ДЗМ сохранена
- Анафилаксия: ERC 2021 — не рутинно; адреналин всегда первым
- Контроль гликемии у диабетиков обязателен

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ТАКТИКА

- Не смешивать в одном шприце (осадок с гепарином)
- Гипокалиемия + дигоксин → потенцирование токсичности; предпочть дексаметазон
- Пероральный = в/в по эффективности (если может глотать)
- «Что я жду и когда?» — если ответ «через 4 часа», сначала другие препараты