



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 3 (25 %)

Méthodes statistiques (STT-1920)

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Une seule feuille aide-mémoire **manuscrite** de format lettre (8.5"×11") recto-verso.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte 8 exercices répartis sur 9 pages, pour un total de 90 points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (6 points)

Un ingénieur souhaite comparer la performance de trois marques de freins à disque pour vélo de route. La variable d'intérêt sera donc la distance de freinage parcourue pour passer de 40 km/h à 0 km/h. L'expérience est répétée n fois pour chaque type de frein. Utilisez la table d'analyse de la variance suivante pour répondre aux deux questions.

	SS	DDL	MS	F0	valeur-p
Traitement	45.77	2	22.885	14.329	0.000001
Erreur	91.03	57	1.597		

(a) (3 points) Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- ☐ Nous savons que $n = 60$.
- ☐ L'estimateur de la variance est 1,597.
- ☐ La variable réponse est la distance de freinage et le facteur est Erreur.
- ☐ Comme il s'agit d'une régression linéaire simple, il n'y a pas de facteur.

(b) (3 points) Quelle conclusion peut-on tirer à partir de cette table d'analyse de la variance, au seuil de 1% ?

- ☐ La variance de la distance de freinage d'au moins une marque de frein est différente d'au moins une autre marque.
- ☐ La distance de freinage moyenne d'au moins une marque de frein est différente d'au moins une autre marque.
- ☐ Toutes les moyennes sont égales.

Exercice 2 (8 points)

Nous faisons un test pour confronter $H_0 : \mu = 15$ à $H_1 : \mu \neq 15$. La règle de décision est de rejeter H_0 si $\bar{X} < 10$ ou si $\bar{X} > 20$. Dans chacun des cas suivants, déterminez si une erreur est commise et déterminez de quel type, le cas échéant.

(a) (2 points) La vraie valeur de μ est 16 et nous obtenons $\bar{x} = 12$.

- ☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(b) (2 points) La vraie valeur de μ est 15 et nous obtenons $\bar{x} = 12$.

- ☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(c) (2 points) La vraie valeur de μ est 15 et nous obtenons $\bar{x} = 21$.

- ☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

(d) (2 points) La vraie valeur de μ est 18 et nous obtenons $\bar{x} = 21$.

- ☐ Erreur de type I ☐ Erreur de type II ☐ Aucune erreur

Exercice 3 (12 points)

Une équipe en sciences biomédicales veut vérifier s'il existe une différence de réponse inflammatoire moyenne (score quantitatif) selon la concentration d'un agent actif dans une formulation.¹

Elle compare donc 8 concentrations différentes (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en réalisant 4 mesures indépendantes pour chaque concentration. La table d'analyse de la variance suivante est produite par le logiciel utilisé par l'équipe. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB et ??? . Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	ddl	MS	F0
traitement	1154.3	???	???	AAA
erreur	141.4	???	???	
Total	BBB	???		

(a) (3 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 164,9
- ☐ 8,163
- ☐ 27,989
- ☐ 1154,3
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) (3 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 8,163
- ☐ 1295,7
- ☐ 1012,9
- ☐ 0,122
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

(c) (3 points) Quelle est l'estimation de σ^2 ?

- ☐ 141,4
- ☐ 24
- ☐ 5,89
- ☐ 164,9
- ☐ Il n'est pas possible de donner une estimation de σ^2 avec les informations données.

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'analyse de la variance ?

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ La réponse inflammatoire moyenne d'au moins une concentration est significativement différente de celle d'au moins une autre concentration.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

1. Merci à Claude pour la suggestion de mise en situation.

Exercice 4 (10 points)

Soit $X_1, \dots, X_{16}$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 .

On fait le test d'hypothèses pour lequel $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu > 5$ au seuil $\alpha = 1\%$.

Pour quelles valeurs de s^2 rejette-t-on H_0 si $\bar{x} = 6,301$?

Exercice 5 (12 points)

Pour des raisons de santé publique, on cherche à savoir s'il est possible d'expliquer le taux maximal d'ozone O_3 de la journée par la température à midi donnée en degrés celsius. Afin d'étudier le modèle $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + E_i$, en supposant que les postulats de régression linéaire sont respectés, vous disposez des résultats suivants :

MSE: 160.529 sur 8 degrés de liberté

R-carré: 0.7041, R-carré ajusté: 0.6671

F0: 19.03 sur 1 et 8 degrés de liberté, valeur-p: 0.002403

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 219,1; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 5214,58; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 1026,4; \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 118446,6; \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 23650,84; \quad s_X^2 = 46,01.$$

- (a) (7 points) Donnez l'équation de la droite de régression permettant de prédire la concentration d'ozone O_3 dans l'air en fonction de la température à midi. Justifiez toutes les étapes de votre démarche.

- (b) (2 points) Donnez le pourcentage de la variabilité totale de la concentration d'ozone O_3 dans l'air qui est expliquée par la température à midi.

Suite de l'exercice 5 sur la feuille suivante

Suite de l'exercice 5

- (c) (1 point) Un chercheur aimerait estimer la concentration d'ozone O_3 dans l'air lors d'une journée précise. Le midi de cette journée, la température est de 14 degrés. La prévision ponctuelle de la concentration d'ozone O_3 dans l'air en cette journée est environ de 80,38. Choisissez l'intervalle de valeurs ayant 95% de chances de contenir la concentration d'ozone O_3 dans l'air en cette journée.

☐ $80,38 \pm t_{0,025, n-2} \sqrt{\text{MSE} \left[\frac{1}{n} + \frac{(14 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

☐ $80,38 \pm t_{0,025, n-2} \sqrt{\text{MSE} \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(14 - \bar{x})^2}{S_{XX}} \right]}$

- (d) (1 point) Si la température à midi ce jour-là était de 18 degrés, l'intervalle de valeurs calculé à la question précédente serait...

- ☐ plus court
- ☐ de même longueur
- ☐ plus long

- (e) (1 point) Quelle affirmation parmi les suivantes est vraie au seuil 1% ?

- ☐ La concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi ne sont pas unis par une relation linéaire significative.
- ☐ On ne peut pas prédire la concentration d'ozone O_3 dans l'air à partir de la température à midi.
- ☐ La concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi sont indépendantes.
- ☐ La relation linéaire entre la concentration d'ozone O_3 dans l'air et la température à midi est significative.

Exercice 6 (11 points)

Une chocolaterie prétend que ses sacs de 120 bonbons contiennent les saveurs suivantes dans les proportions indiquées : 30 % chocolat noir, 25 % chocolat au lait, 25 % caramel et 20 % noisette. Pour vérifier cette affirmation, un contrôleur de qualité prélève un sac au hasard et compte les bonbons de chaque saveur. Les résultats sont présentés ci-dessous.

Saveur	Noir	Lait	Caramel	Noisette	Total
Fréquence observée (O_i)	42	35	20	23	120

- (a) (2 points) Formulez les hypothèses nulle et alternative du test du khi-carré d'adéquation.
- (b) (4 points) Calculez la statistique de test D_0 . Vous pouvez utiliser le tableau dans votre démarche.
- (c) (2 points) Combien de degrés de liberté possède la loi de référence sous H_0 ?
- (d) (3 points) Au seuil $\alpha = 0,05$, quelle est votre conclusion ?

Exercice 7 (11 points)

Une étude cherche à déterminer s'il existe un lien entre le niveau de stress (faible, modéré, élevé) et la qualité du sommeil (bonne, mauvaise) chez des adultes. Un échantillon de 200 personnes donne les résultats suivants.

	Bonne qualité	Mauvaise qualité	Total
Stress faible			
O_{ij}	50	10	60
E_{ij}	33	27	
D_{ij}	8,758	10,704	
Stress modéré			
O_{ij}	45	35	80
E_{ij}	44	36	
D_{ij}	0,023	0,028	
Stress Élevé			
O_{ij}	15	45	60
E_{ij}	33	27	
D_{ij}	9,818	12	
Total observés	110	90	200

(a) (2 points) Formulez les hypothèses nulle et alternative du test d'indépendance.

(b) (4 points) Calculez la statistique de test D_0 .

(c) (2 points) Combien de degrés de liberté possède la loi de référence sous H_0 ?

(d) (3 points) Au seuil $\alpha = 0,01$, quelle est votre conclusion ?

Exercice 8 (20 points)

QCM synthèse (une seule bonne réponse par item).

- (a) (2 points) **Test à 1 échantillon.** On teste $H_0 : \mu = 50$ contre $H_1 : \mu \neq 50$ et on obtient une valeur- p de 0,03. Au seuil $\alpha = 0,05$, quelle est la bonne décision ?
☐ On ne rejette pas H_0 . ☐ On rejette H_0 . ☐ Le test est impossible à conclure sans la taille d'échantillon.
- (b) (2 points) **ANOVA à 1 facteur.** Quelle est l'hypothèse nulle du test F global ?
☐ Toutes les moyennes de groupes sont égales. ☐ Toutes les variances de groupes sont égales. ☐ Toutes les proportions de groupes sont égales.
- (c) (2 points) **Régression linéaire simple.** Dans le modèle $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, que signifie $\beta_1 > 0$?
☐ En moyenne, Y augmente quand X augmente. ☐ La variance de Y est positive. ☐ X et Y sont indépendantes.
- (d) (2 points) **Khi-carré d'ajustement.** Pour un test d'ajustement avec $k = 5$ catégories et aucun paramètre estimé à partir des données, combien y a-t-il de degrés de liberté ?
☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
- (e) (2 points) **Khi-carré d'indépendance.** Un test d'indépendance donne une valeur- p de 0,002 au seuil 5%. Quelle conclusion est correcte ?
☐ On ne rejette pas l'indépendance. ☐ On rejette l'indépendance : les variables sont associées. ☐ Les variables sont causales.