



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

Examen 2 (55 %)

Méthodes statistiques pour l'ingénierie (STT-1900)

30 avril 2026

18 h 30 à 21 h 20

Enseignant : Julien Miron

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Votre aide-mémoire d'une feuille recto-verso, écrit à la main.
 - Assurez-vous que cette évaluation comporte ?? exercices répartis sur ?? pages, pour un total de ?? points.
 - Veillez ne pas dégrafer votre examen.**
 - Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
 - Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
 - Vous devez laisser tout ce qui ne servira pas durant l'examen à l'avant de la salle AVANT de rejoindre votre place.
 - Vous n'avez droit à AUCUN appareil électronique en votre possession durant l'examen.
 - Une fois assis à votre place, vous devez demander l'autorisation pour vous lever, même si l'examen n'est pas encore commencé.
 - Dans les 5 dernières minutes de l'examen, il sera interdit de se lever avant que TOUTES les copies n'aient été ramassées.
- Le non-respect des consignes 7-8-9 entraînera une pénalité de 10%.

Exercice 1 (?? points)

Montrez que l'ensemble vide $\emptyset$ est à la fois mutuellement exclusif et indépendant de tout événement A pour lequel $0 < P(A) < 1$.

Exercice 2 (?? points)

Soit la table d'analyse de la variance suivante obtenue à l'aide de Rcmdr :

>summary(ANOVAModel)

	Sum Sq	Df	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Cantons	926.12	4	231.53	238.72	0.000001
Residuals	446.55	48	0.97		

À partir de la table d'analyse de la variance, quelle affirmation parmi les suivantes est **vraie** ?

- ☐ L'estimation de la moyenne du facteur Cantons est égale à 231,53.
- ☐ Nous avons 49 observations dans le jeu de données.
- ☐ La variance du facteur Cantons est environ 2 fois plus grande que la variance du facteur Residuals.
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,05$, nous pouvons affirmer que les moyennes de la variable réponse à chaque niveaux du facteur Cantons ne sont pas toutes égales.
- ☐ Au seuil $\alpha = 0,05$, nous pouvons affirmer que les variances de la variable réponse à chaque niveaux du facteur Cantons ne sont pas toutes égales.

Exercice 3 (?? points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ_X et de variance σ_X^2 et $Y_1, \dots, Y_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ_Y et de variance σ_Y^2 . On procède à un test d'égalité des variances avec $H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$

et $H_1 : \sigma_X^2 > \sigma_Y^2$, au seuil α , en utilisant la statistique $F_0 = \frac{S_Y^2}{S_X^2}$.

- ☐ Il s'agit d'un test bilatéral.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à droite.
- ☐ Il s'agit d'un test unilatéral à gauche.
- ☐ Il nous manque d'information.

Exercice 4 (?? points)

On définit la fonction de survie S_X d'une variable aléatoire par $S_X(x) = P(X > x)$ et le taux de défaillance h_X par

$h_X(x) = \frac{f_X(x)}{S_X(x)}$, où f_X est la fonction de densité de X . Soit la variable aléatoire X dont la fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0, \\ 1 - e^{-3x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Que vaut h_X ?

- ☐ $h_X(x) = 3e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = e^{-3x}$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = 3$ pour $x > 0$ et 0 sinon.
- ☐ $h_X(x) = 1$ pour $x > 0$ et 0 sinon.

Exercice 5 (?? points)

Soit $W \sim \mathcal{N}(1275; 49)$. Laquelle des probabilités suivantes est la plus grande ?

- ☐ $P(W > 1282)$
- ☐ $P(W < 1268)$
- ☐ $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 0,5\right)$
- ☐ $P\left(\frac{W - 1275}{7} > 1\right)$

Exercice 6 (?? points)

Parmi les quatre façons de générer X et Y , laquelle donnera $\rho_{X,Y} = 1$?

- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y \sim \mathcal{N}(0,1)$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X^2$
- ☐ $X \sim \mathcal{N}(0,1)$ et $Y = X + \epsilon$ où $\epsilon \sim \mathcal{N}(0,1)$

Exercice 7 (?? points)

Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

- (a) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la moyenne échantillonnale est 25, environ 50% des observations sont plus grandes que 25 et environ 50% sont plus petites que 25.
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si $Q_1 = 12$, nous savons que le minimum de l'échantillon est 12.
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Si la médiane échantillonnale est 25, nous sommes certains que la valeur de l'observation du milieu est 25.
☐ Vrai ☐ Faux
- (e) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$. Nous devons changer au moins 50% des observations pour que la moyenne échantillonnale change.
☐ Vrai ☐ Faux
- (f) (1 point) Soit $x_1, \dots, x_n$ et la médiane échantillonnale $\tilde{x}$. Si on remplace $x_{(n)}$ par $10x_{(n)}$ (c'est-à-dire une valeur 10 fois plus grande), la nouvelle médiane est $10\tilde{x}$.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 8 (?? points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui indépendants et identiquement distribués selon une loi quelconque F_X . On veut estimer la médiane $\tilde{\mu}$ de F_X à l'aide de $\bar{X}$. Calculez le biais de $\bar{X}$ pour $\tilde{\mu}$.

Exercice 9 (?? points)

Soit $X_1, \dots, X_{14}$, des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées selon une loi normale d'espérance μ et de variance σ^2 . Nous désirons construire l'intervalle de confiance approprié de niveau 95% pour σ^2 . Nous notons cet intervalle $[C_1; C_2]$.

(a) (3 points) Que vaut $\mathbb{E}[C_2]$?

(b) (3 points) Que vaut $\text{Var}[C_2]$?

(c) (4 points) Quelle est la probabilité que C_2 soit supérieure ou égale à σ^2 ?

Exercice 10 (?? points)

Soit $X_1, \dots, X_n$ qui proviennent d'une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 25$. On fait le test d'hypothèses pour lequel $H_0 : \mu = 5$ et $H_1 : \mu > 5$ au seuil $\alpha = 2,5\%$. Pour quelles valeurs de n rejette-t-on H_0 si $\bar{x} = 5,1$?

Exercice 11 (?? points)

Une entreprise fabrique des palettes de chocolat et s'intéresse à la quantité moyenne de sucre dans une palette. Elle choisit au hasard 16 palettes. Dans l'échantillon, la quantité moyenne de sucre par palette est de 5,05 g et la variance échantillonnale est de 0,011 g². Sachant que X , la quantité de sucre dans une palette, est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance μ et de variance $\sigma^2 = 0,01$, elle fait le test suivant, au seuil $\alpha = 2,5\%$,

$$H_0 : \mu = 5$$

$$H_1 : \mu > 5.$$

- (a) (2 points) Quelle est la valeur critique du test en grammes, c'est-à-dire, à partir de quelle valeur de $\bar{X}$ rejette-t-on H_0 ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (b) (2 points) Quelle est la valeur de la statistique du test sous H_0 , arrondie à 3 décimales ?

☐ 1,960 ☐ 2,131 ☐ 2,000 ☐ 5,049 ☐ 5,053

- (c) (2 points) Quel est le seuil observé du test ?

☐ $\alpha^* = 0,025$.

☐ $\alpha^* = 0,02275$.

☐ $\alpha^* \in]0,025; 0,05[$.

☐ $\alpha^* \in]0,05; 0,1[$.

- (d) (3 points) Si en réalité $\mu = 5,1$ et que la règle de décision est de rejeter H_0 si $\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96$, quelle est l'expression de la puissance du test ?

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > 1,96\right)$

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5,1}{0,025} > -2,04\right)$

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > 1,96\right)$

☐ $P\left(\frac{\bar{X} - 5}{0,025} > -2,04\right)$

Exercice 12 (?? points)

Un ingénieur veut vérifier s'il existe une différence de rigidité d'un certain type de disque, selon le pourcentage de *Pouliovachium* qui le compose.

Il compare donc la rigidité de 8 pourcentages différents (10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% et 50%) en produisant 4 cylindres pour chaque pourcentage. La table d'ANOVA suivante est produite par le logiciel utilisé par l'ingénieur. Dans celle-ci, certaines quantités ont été remplacées par AAA, BBB, CCC et ????. Nous considérons que les postulats du modèle sont respectés.

ANOVA

	SS	ddl	MS	F0
pouliovachium	1154.3	???	???	AAA
Residuals	141.4	BBB	???	
Total	CCC	???		

(a) (2 points) Que vaut AAA ?

- ☐ 164,9
- ☐ 8,163
- ☐ 27,989
- ☐ 1154,3
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de AAA avec les informations données.

(b) (2 points) Que vaut BBB ?

- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 31
- ☐ 32
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de BBB avec les informations données.

(c) (2 points) Que vaut CCC ?

- ☐ 8,163
- ☐ 1295,7
- ☐ 1012,9
- ☐ 0,122
- ☐ Il n'est pas possible de trouver la valeur de CCC avec les informations données.

(d) (3 points) Au seuil de 5%, quelle conclusion pouvons-nous tirer de la table d'ANOVA? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Il n'est pas possible de tirer de conclusion car nous ne connaissons pas les valeurs remplacées par ???.
- ☐ Il faudrait répéter l'expérience plus de fois pour pouvoir conclure.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement différentes.
- ☐ La rigidité moyenne des disques d'au moins un pourcentage est significativement différente de celle d'au moins un autre pourcentage.
- ☐ Toutes les moyennes sont significativement égales.

Exercice 13 (?? points)

Soit le tableau suivant dans lequel certaines informations ont été remplacées par *AAA* et *BBB* :

i	1	2	3	4	5
x_i	-3	-2	0	1,5	3,5
y_i	-1,1	AAA	1,1	2	2,5
$x_i y_i$	3,3	BBB	0	3	8,75
x_i^2	9	4	0	2,25	12,25

Sachant que $\hat{\beta}_0 = 1$, que vaut $\hat{\beta}_1$?

$\hat{\beta}_1 =$

Exercice 14 (?? points)

Un ingénieur civil cherche à modéliser la résistance à la compression (en MPa) d'une formulation de béton à partir de trois variables : la proportion de ciment (X_1 , en %), le rapport eau/ciment (X_2) et la durée de cure (X_3 , en jours). Il ajuste le modèle de régression linéaire multiple suivant :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + E_i,$$

où les E_i sont indépendants et identiquement distribués de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Les données portent sur 47 mélanges de béton. Les sorties suivantes ont été obtenues, deux éléments étant remplacés par AAA et BBB.

```
> summary(RegModel.1)
Call:
lm(formula = Resistance ~ Ciment + EauCiment + DureeCure, data = Beton)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	2.34150	0.38520	6.079	0.000001
Ciment	0.42900	0.14300	AAA	0.0041
EauCiment	-3.15200	0.71040	-4.436	0.000001
DureeCure	0.08830	0.11260	0.784	0.4373

Residual standard error: 2.187 on 43 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7650, Adjusted R-squared: BBB

F-statistic: 46.77 on 3 and 43 DF, p-value: 0.000001

(a) (1 point) Quelle est la valeur de AAA ?

☐ -3,000 ☐ 3,000 ☐ 2,037 ☐ 6,079

(b) (3 points) Calculez la valeur de BBB, le R^2 ajusté. **Donnez les détails de votre démarche.**

(c) (2 points) Au seuil de 5%, l'effet de la durée de cure (X_3) sur la résistance à la compression est-il significatif, en présence des deux autres variables dans le modèle ? Une seule réponse est bonne.

- ☐ Oui.
☐ Non.
☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

(d) Nous voulons maintenant tester, au seuil 5%,

H_0 : aucune des variables indépendantes n'a d'effet sur la résistance à la compression,

H_1 : au moins une variable indépendante a un effet sur la résistance à la compression.

i. (1 point) Quelle est la valeur- p associée à ce test ?

☐ 0,0041
☐ 0,4373
☐ 0,000001
☐ 0,05

☐ Nous n'avons pas assez d'information pour le savoir.

ii. (1 point) Quelle est la conclusion ?

☐ Nous rejetons H_0 au seuil 5% : au moins une variable a un effet significatif sur la résistance à la compression.

☐ Nous ne rejetons pas H_0 au seuil 5%.

☐ Aucune des trois variables n'a d'effet significatif sur la résistance à la compression.

☐ Nous ne pouvons pas conclure car des valeurs sont inconnues.