

Tercera Lista de Problemas

Segunda Parte

Matemáticas para las Ciencias Aplicadas I
Facultad de Ciencias, UNAM

Flores Morán Julieta Melina
Zarco Romero José Antonio

12 de noviembre de 2023

1. Sección 4.1

Análisis De Funciones I: Aumento, Disminución Y Concavidad

1.1. Ejercicio 31

name

Encuentre: (a) los intervalos en los que f aumenta, (b) los intervalos en los que f disminuye, (c) los intervalos abiertos en los que f es cóncava hacia arriba, (d) los intervalos abiertos en los que f es cóncava hacia abajo, y (e) las coordenadas x de todos los puntos de inflexión.

$$f(x) = \tan^{-1}(x^2 - 1)$$

Podemos determinar si $f(x)$ crece o decrece en un intervalo según si su derivada es positiva o negativa en ese intervalo. Por esta razón, para determinar

(a) y (b) primero necesitamos que derivar $f(x)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(\tan^{-1}(x^2 - 1)) \\ &= \frac{1}{1 + (x^2 - 1)^2} \cdot \frac{d}{dx}((x^2 - 1)) \\ &= \frac{1}{1 + (x^2 - 1)^2} \cdot 2x \\ \therefore f'(x) &= \frac{2x}{1 + (x^2 - 1)^2} \end{aligned}$$

La derivada vale 0 cuando $2x = 0$, es decir, cuando $x = 0$.

- Cuando $x > 0$, $f'(x) > 0$, es decir, es positiva y por lo tanto es creciente.
- Cuando $x < 0$, $f'(x) < 0$, es decir, es negativa y por lo tanto es decreciente.

\therefore (a): el intervalos en los que f aumenta es $[0, \infty]$

(b): el intervalos en los que f decrece es $(-\infty, 0]$

Para responder a los últimos 3 incisos necesitamos información de la se-

gunda derivada. Así que conviene calcularla.

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{2x}{1 + (x^2 - 1)^2} \right) \\
 &= \frac{(1 + (x^2 - 1)^2) \cdot \frac{d}{dx}(2x) - [2x \cdot \frac{d}{dx}(1 + (x^2 - 1)^2)]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{(1 + (x^2 - 1)^2) \cdot 2 - [2x \cdot \frac{d}{dx}[(x^2 - 1)^2]]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{2(1 + (x^2 - 1)^2) - [2x \cdot 2(x^2 - 1) \frac{d}{dx}(x^2 - 1)]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{2(1 + (x^2 - 1)^2) - [2x \cdot 2(x^2 - 1) \cdot 2x]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{2 + 2(x^2 - 1)^2 - [8x^2 \cdot (x^2 - 1)]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{2 + 2(x^4 - 2x^2 + 1) - [8x^4 - 8x^2]}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{2 + 2x^4 - 4x^2 + 2 - 8x^4 + 8x^2}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 &= \frac{-6x^4 + 4x^2 + 4}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} \\
 \therefore f''(x) &= -2 \frac{3x^4 - 2x^2 - 2}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2}
 \end{aligned}$$

La concavidad depende del signo de $f''(x)$. Para identificar estos intervalos primero conviene ubicar en que puntos $f''(x) = 0$, para reconocer más fácilmente $f''(x) < 0$ y $f''(x) > 0$.

$$\begin{aligned}
 f''(x) &= -2 \frac{3x^4 - 2x^2 - 2}{(1 + (x^2 - 1)^2)^2} = 0 \\
 &\iff
 \end{aligned}$$

$$3x^4 - 2x^2 - 2 = 0$$

Para calcular x más fácilmente sustituimos la variable x^2 por t .

$$3t^2 - 2t - 2 = 0$$

Y usaremos la fórmula general.

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(3)(-2)}}{2(3)} \\
 &= \frac{2 \pm \sqrt{4 + 24}}{6} \\
 &= \frac{2 \pm \sqrt{28}}{6} \\
 &= \frac{2 \pm \sqrt{7 \cdot 4}}{6} \\
 &= \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{6} \\
 &= \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3} \\
 \therefore x^2 &= \pm \sqrt{\frac{1 \pm \sqrt{7}}{3}}
 \end{aligned}$$

Considerando que $1 - \sqrt{7} \approx -1.64$, $x = \pm \sqrt{\frac{1 - \sqrt{7}}{3}}$ tiene raíces imaginarias. Por lo tanto las raíces reales que nos interesan son

$$x = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{7}}{3}}$$

Estos son los puntos de inflexión, donde $f(x) = 0$. Así que evaluaremos cada intervalo que nos es de interés, para conocer el signo de $f''(x)$. Donde es negativa, es cóncava hacia abajo y donde es positiva es cóncava hacia arriba.

\therefore (c): los intervalos en los que f es cóncava hacia arriba $(-\sqrt{\frac{1 + \sqrt{7}}{3}}, \sqrt{\frac{1 + \sqrt{7}}{3}})$

(d): los intervalos en los que f es cóncava hacia abajo son $(\sqrt{\frac{1 + \sqrt{7}}{3}}, \infty)$ y $(-\infty, -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{7}}{3}})$

Intervalo concavidad hacia	Signo de $f''(x)$
$(-\infty, -\sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}})$ abajo	-
$(-\sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}}, \sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}})$ arriba	+
$(\sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}}, \infty)$ abajo	-

(e): las cordenadas x de todos los puntos de inflexión son $x = \sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}}$ y $x = -\sqrt{\frac{1+\sqrt{7}}{3}}$

1.2. Ejercicio 57

name

- (a) Demuestre que un polinomio cúbico general

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

tiene exactamente un punto de inflexión.

- (b) Demuestre que si un polinomio cúbico tiene tres intersecciones en el eje x, entonces el punto de inflexión ocurre en el valor promedio de las intersecciones.
- (c) Utilice el resultado del inciso (b) para encontrar el punto de inflexión del polinomio cúbico $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$, y verifique su resultado usando f'' para determinar dónde f es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo.

1.3. Ejercicio 71

name

Suponiendo que A, k y L son constantes positivas, verifique que la gráfica de $y = L/(1 + Ae^{-kt})$ tiene un punto de inflexión en $(\frac{1}{k} \ln A, \frac{1}{2}L)$. La fórmula dada es la función que describe el crecimiento de curvas lógicas. Para conocer los puntos de inflexión, necesitamos conocer la segunda derivada con respecto a t . Si multiplicamos ambos lados de la fórmula por $e^{kt}(1 + Ae^{-kt})$, obtenemos:

$$ye^{kt}(1 + Ae^{-kt}) = Le^{kt}$$

$$ye^{kt} + yAe^{kt}e^{-kt} = Le^{kt}$$

$$ye^{kt} + yAe^{kt-kt} = Le^{kt}$$

$$ye^{kt} + yAe^0 = Le^{kt}$$

$$ye^{kt} + yA = Le^{kt}$$

Y usando derivación implícita podemos obtener:

$$\frac{d}{dt}[y(e^{kt} + A)] = \frac{d}{dt}(Le^{kt})$$

$$y\frac{d}{dt}e^{kt} + (e^{kt} + A)\frac{dy}{dt} = L\frac{d}{dt}(e^{kt})$$

$$yke^{kt} + (e^{kt} + A)\frac{dy}{dt} = Lke^{kt}$$

$$(e^{kt} + A)\frac{dy}{dt} = Lke^{kt} - yke^{kt}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{ke^{kt}(L - y)}{e^{kt} + A}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{ke^{kt}(L - y)}{Le^{kt}/y}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{K}{L}y(L - y)$$

Necesitamos la segunda derivada.

$$\frac{d^2y}{dt^2} = \frac{dy}{dt} \left[\frac{K}{L}y(L - y) \right]$$

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{K}{L} \left[y \frac{d}{dt}(L - y) + (L - y) \frac{dy}{dt} \right] \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{K}{L} \left[(y) \left(-\frac{dy}{dt} \right) + (L - y) \frac{dy}{dt} \right] \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{K}{L} \left[(y) \left(-\left[\frac{K}{L} y(L - y) \right] \right) + (L - y) \frac{K}{L} y(L - y) \right] \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= \frac{K}{L} \left[-y^2 \frac{K}{L} (L - y) + (L - y)^2 \frac{K}{L} y \right]\end{aligned}$$

2. Sección 4.2

Análisis De Funciones II: Extremos Relativos; Graficar Polinomios

2.1. Ejercicio 31

name

Utilice la derivada dada para encontrar todos los puntos críticos de f y en cada punto crítico determine si ocurre un máximo relativo, un mínimo relativo o ninguno de los dos. Supongamos en cada caso que f es continua en todas partes.

$$f'(x) = \ln \left(\frac{2}{1 + x^2} \right)$$

2.2. Ejercicio 55

name

Haz una gráfica del polinomio y etiqueta las coordenadas de las intersecciones, los puntos estacionarios y los puntos de inflexión. Comprueba tu trabajo con una utilidad gráfica.

$$p(x) = (x + 1)^2(2x - x^2)$$

Primero, podemos calcular las intersecciones con los ejes.

-Intersecciones con el eje x:

$$p(x) = (x + 1)^2(2x - x^2) = 0 \iff$$

$$x + 1 = 0 \iff x = -1 \text{ o}$$

$$2x - x^2 = 0 \iff x = 0, 2$$

Por lo que los puntos de intersección con x son:

$$(0, 0), (2, 0), (-1, 0)$$

Donde -1 es un raíz con una multiplicidad de 2, entonces la gráfica de p(x) será tangente al eje x en x=-1, pero no lo cruzara y no habrá un punto de inflexión aquí. 0 y 2 tienen multiplicidad simple, por lo que la grafica no es tangente al eje x en x=0 y x=2, cruza el eje x ahí y puede o no tener un punto de inflexión aquí.

-Intersección con el eje y:

$$p(0) = (0 + 1)^2(2 \cdot 0 - 0^2) = 0$$

La intersección en ambos ejes se da en (0,0).

Los puntos estacionarios se dan cuando $p'(x) = 0$.

Para saber esto, necesitamos primero calcular $p'(x)$.

$$\begin{aligned} p'(x) &= \frac{d}{dx} [(x + 1)^2(2x - x^2)] \\ &= (x + 1)^2 \frac{d}{dx}(2x - x^2) + (2x - x^2) \frac{d}{dx}(x + 1)^2 \\ &= (x + 1)^2(2 - 2x) + (2x - x^2)2(x + 1) \\ &= (x + 1) ((x + 1)(2 - 2x) + 2(2x - x^2)) \\ &= (x + 1) (2x - 2x^2 + 2 - 2x + 4x - 2x^2) \\ \therefore p'(x) &= (x + 1) (-4x^2 + 4x + 2) \end{aligned}$$

$$p'(x) = (x + 1) (-4x^2 + 4x + 2) = 0$$

$$\iff$$

$$x + 1 = 0 \iff x = -1$$

$$-4x^2 + 4x + 2 = 0 \iff x = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

Evaluando estos puntos:

$$p\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) + 1\right)^2 \left(2\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^2\right) = \frac{9+6\sqrt{3}}{4}$$

$$p\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) = \left(\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) + 1\right)^2 \left(2\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)^2\right) = \frac{9-6\sqrt{3}}{4}$$

Por esto, los puntos estacionarios son:

$$\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}, \frac{9+6\sqrt{3}}{4}\right) \text{ y } \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2}, \frac{9-6\sqrt{3}}{4}\right)$$

2.3. Ejercicio 77

name

En cada parte, encuentre k de modo que f tenga un extremo relativo en el punto donde $x = 3$.

(a) $f(x) = x^2 + \frac{k}{x}$

(b) $f(x) = \frac{x}{x^2+k}$

3. Sección 4.3

Análisis De Funciones III: Funciones Racionales, Cúspides Y Tangentes Verticales

3.1. Ejercicio 21

name

Dibuja una gráfica de la función racional y etiqueta las coordenadas de los puntos estacionarios y los puntos de inflexión. Muestra las asíntotas horizontales, verticales, oblicuas y curvilíneas y etiquétalas con sus ecuaciones.

Etiquete los puntos, si los hay, donde la gráfica cruza una asíntota. Comprueba tu trabajo con una utilidad gráfica.

$$\frac{(x-2)^3}{x^2}$$

3.2. Ejercicio 36

name

Dé una gráfica de la función e identifique las ubicaciones de todos los puntos críticos y puntos de inflexión. Comprueba tu trabajo con una utilidad gráfica.

$$5x^{2/3} + x^{5/3}$$

3.3. Ejercicio 54

name

Utilizando la regla de L'Hôpital se puede verificar que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0 \qquad \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

En estos ejercicios: (a) Utilice estos resultados, según sea necesario, para encontrar los límites de $f(x)$ cuando $x \rightarrow +\infty$ y cuando $x \rightarrow -\infty$. (b) Dibuje una gráfica de $f(x)$ e identifique todos los extremos relativos, puntos de inflexión y asíntotas (según corresponda). Comprueba tu trabajo con una utilidad gráfica.


$$f(x) = x^3 e^{x-1}$$

3.4. Ejercicio 70

name

La figura adjunta muestra una gráfica generada por computadora del polinomio $y = 0.1x^5(x+1)^2$ usando una ventana de visualización de $[2, 1.5] \times [0.2, 0.2]$. Demuestre que la elección de la escala vertical hizo que la computadora pasara por alto características importantes de la gráfica. Encuentra

las características que faltaron y haz tu propio boceto del gráfico que muestra las características que faltan.



Generated by Mathematica

▲ **Figure Ex-70**