

Tercera Lista de Problemas

Tercera Parte

Matemáticas para las Ciencias Aplicadas I
Facultad de Ciencias, UNAM

Flores Morán Julieta Melina
Zarco Romero José Antonio

12 de noviembre de 2023

1. Sección 4.4

Máximos Y Mínimos Absolutos

1.1. Ejercicio 48

Zarco Romero José Antonio

Demuestre que $\cos x \geq 1 - (x^2/2)$ para todo x en el intervalo $[0, 2\pi]$.

Una manera de demostrar que $\cos x \geq 1 - (x^2/2)$ para todo x en el intervalo $[0, 2\pi]$ es demostrar que $0 \leq \cos x - [1 - (x^2/2)]$, es decir $0 \leq \frac{x^2}{2} + \cos x - 1$, para todo x en el intervalo dado; y una forma de demostrar esta última desigualdad es demostrar que el valor mínimo absoluto de $y = \frac{x^2}{2} + \cos x - 1$ en el intervalo no es negativo. Para demostrar esto, tenemos que la continuidad de f junto con el hecho de que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2} + \cos x - 1 = \frac{0^2}{2} + \cos 0 - 1 = 0 + 1 - 1 = 0$$

es finito y permite la posibilidad de que f tenga un mínimo absoluto en $[0, 2\pi]$. Si es así, tendría que ocurrir en un punto crítico de f , por lo que

consideramos

$$f'(x) = x - \sin x$$

dicha derivada es ≥ 0 para todo valor de x en el intervalo $[0, 2\pi]$

$$f'(0) = 0 - \sin 0 = 0 - 0 = 0$$

$\therefore \cos x \geq 1 - (x^2/2)$ para todo x en el intervalo $[0, 2\pi]$.

■

1.2. Ejercicio 53

Zarco Romero José Antonio

Supongamos que las ecuaciones de movimiento de un avión de papel durante los primeros 12 segundos de vuelo son

$$x = t - 2 \sin t \qquad y = 2 - 2 \cos t \qquad (0 \leq t \leq 12)$$

¿Cuáles son los puntos más alto y más bajo de la trayectoria, y cuándo está el avión en esos puntos?

A fin de conocer los extremos absolutos, debemos encontrar $y'(t)$, esto es

$$y'(t) = 2 \sin t$$

Sabemos, por el comportamiento de $\sin t$, que $y'(t) = 0$ cuando t es múltiplo de π , es decir $t = k\pi$ donde k es un entero entre 0 y 3, inclusive.

Evaluando y en los siguientes puntos, obtenemos que

$$y(0) = 2 - 2 \cos 0 = 2 - 2 = 0$$

$$y(\pi) = 2 - 2 \cos \pi = 2 + 2 = 4$$

$$y(2\pi) = 2 - 2 \cos 2\pi = 2 - 2 = 0$$

$$y(3\pi) = 2 - 2 \cos 3\pi = 2 + 2 = 4$$

de lo cual concluimos que el mínimo absoluto de y en $0 \leq t \leq 12$ es 0, que ocurre en $t = 0, 2\pi$, y el máximo absoluto de y en $0 \leq t \leq 12$ es 4, que ocurre en $t = \pi, 3\pi$.

\therefore Los puntos más altos de trayectoria son $(\pi, 4)$ y $(3\pi, 4)$. A su vez, los puntos más bajos de trayectoria son $(0, 0)$ y $(2\pi, 0)$.

2. Sección 4.5

Problemas De Máximos Y Mínimos Aplicados

2.1. Ejercicio 14

Zarco Romero José Antonio

Un alambre de 12 pulgadas de largo se puede doblar en un círculo, doblar en un cuadrado o cortar en dos pedazos para formar un círculo y un cuadrado. ¿Cuánto alambre se debe usar para el círculo si el área total encerrada por las figura(s) debe ser (a) un máximo (b) un mínimo?

Sea

- A = área total encerrada por las figuras (in^2)
- r = radio del círculo (in)
- l = longitud de los lados del cuadrado (in)

Como la fórmula para el área es la suma de ambas figuras, tenemos

$$A = \pi r^2 + l^2$$

Sabemos también que el perímetro del círculo está dado por la fórmula $x = 2\pi r$, por lo que $r = \frac{x}{2\pi}$. Análogamente el perímetro del cuadrado está dado por la fórmula $y = 4l$, por lo que $l = \frac{y}{4}$. Al sustituir estos valores en la fórmula del área tenemos

$$A = \pi \left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{y}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{y^2}{16}$$

Como el largo del alambre es de 12 pulgadas, las variables x y y están relacionadas mediante la ecuación

$$x + y = 12, \text{ así } y = 12 - x$$

Sustituyendo en la ecuación del área tenemos que

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{x^2}{4\pi} + \frac{(12-x)^2}{16} \\
 &= \frac{x^2}{4\pi} + \frac{144 - 24x + x^2}{16} \\
 &= \frac{4x^2 + \pi x^2 - 24\pi x + 144\pi}{16\pi} \\
 &= \frac{4x^2 + \pi x^2}{16\pi} - \frac{24\pi x}{16\pi} + \frac{144\pi}{16\pi} \\
 &= \frac{\pi + 4}{16\pi}x^2 - \frac{3}{2}x + 9
 \end{aligned}$$

que expresa A en términos de x únicamente. Debido a que x representa una longitud, no puede ser negativa y debido a que no puede exceder la longitud del alambre de 12 pulgadas; la variable x debe satisfacer

$$0 \leq x \leq 12$$

Así, hemos reducido el problema al de encontrar el valor (o valores) de x en $[0, 12]$, para el cual A es máximo/mínimo. Como A es un polinomio en x , es continuo en $[0, 12]$, por lo que el máximo/mínimo debe ocurrir en un punto final de este intervalo o en un punto crítico.

Procedemos ahora a diferenciar A con respecto a x

$$\frac{dA}{dx} = \frac{\pi + 4}{8\pi}x - \frac{3}{2}$$

Calculando $dA/dx = 0$ obtenemos

$$\begin{aligned}
 \frac{\pi + 4}{8\pi}x - \frac{3}{2} &= 0 \\
 \frac{\pi + 4}{8\pi}x &= \frac{3}{2} \\
 x &= \frac{12\pi}{\pi + 4}
 \end{aligned}$$

Evaluando A en los siguientes puntos, obtenemos que


$$\begin{aligned}
 A(0) &= \frac{\pi+4}{16\pi}(0)^2 - \frac{3}{2}(0) + 9 = 9 \\
 A\left(\frac{12\pi}{\pi+4}\right) &= \frac{\pi+4}{16\pi}\left(\frac{12\pi}{\pi+4}\right)^2 - \frac{3}{2}\left(\frac{12\pi}{\pi+4}\right) + 9 \\
 &= \frac{9\pi}{\pi+4} - \frac{18\pi}{\pi+4} + 9 \\
 &= \frac{-9\pi + 9\pi + 36}{\pi+4} \\
 &= \frac{36}{\pi+4} \\
 A(12) &= \frac{\pi+4}{16\pi}(12)^2 - \frac{3}{2}(12) + 9 \\
 &= \frac{\pi+4}{16\pi}(144) - 9 \\
 &= \frac{\pi+4}{\pi}(9) - 9 \\
 &= \frac{9\pi + 36 - 9\pi}{\pi} \\
 &= \frac{36}{\pi}
 \end{aligned}$$

\therefore El alambre que debe usarse para el círculo si el área total encerrada por las figuras debe ser un **máximo** es $x = 12$, y $x = \frac{12\pi}{\pi+4}$ si debe ser un **mínimo**.

2.2. Ejercicio 47

name

Un trapezoide está inscrito en un semicírculo de radio 2 de modo que un lado está a lo largo del diámetro (Figura Ex-47). Encuentra el área máxima posible para el trapezoide. [*Sugerencia:* Expresa el área del trapezoide en términos de θ .]




▲ Figure Ex-47

2.3. Ejercicio 64

name

El principio de Fermat en óptica establece que la luz que viaja de un punto a otro sigue aquel camino cuyo tiempo total de viaje es mínimo. En un medio uniforme, los caminos de “tiempo mínimo” y “distancia más corta” resultan ser los mismos, de modo que la luz, si no hay obstáculos, viaja en línea recta. Supongamos que tenemos una fuente de luz, un espejo plano y un observador en un medio uniforme. Si un rayo de luz sale de la fuente, rebota en el espejo y viaja hasta el observador, entonces su trayectoria constará de dos segmentos de línea, como se muestra en la Figura Ex-64. Según el principio de Fermat, el camino será tal que el tiempo total de viaje t sea mínimo o, dado que el medio es uniforme, el camino será tal que la distancia total recorrida de A a P y a B sea lo más pequeña posible. Suponiendo que el mínimo ocurre cuando $dt/dx = 0$, demuestre que el rayo de luz incidirá en el espejo en el punto P donde el “ángulo de incidencia” θ_1 es igual al “ángulo de reflexión” θ_2 .



◀ Figure Ex-64


2.4. Ejercicio 65

name

El principio de Fermat (Ejercicio 64) también explica por qué los rayos de luz que viajan entre el aire y el agua se curvan (refracción). Imagine que tenemos dos medios uniformes (como aire y agua) y un rayo de luz que viaja desde una fuente A en un medio hasta un observador B en el otro medio (Figura Ex-65). Se sabe que la luz viaja a una velocidad constante en un medio uniforme, pero más lenta en un medio denso (como el agua) que en un medio fino (como el aire). En consecuencia, el camino de menor tiempo de A a B no es necesariamente una línea recta, sino más bien un camino de línea discontinua de A a P a B que permite a la luz aprovechar al máximo su mayor velocidad a través del medio delgado. **La ley de refracción de Snell** establece que la trayectoria del rayo de luz será tal que

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

donde v_1 es la velocidad de la luz en el primer medio, v_2 es la velocidad de la luz en el segundo medio y θ_1 y θ_2 son los ángulos que se muestran en la figura Ex-65. Demuestre que esto se deriva del supuesto de que la trayectoria del tiempo mínimo ocurre cuando $dt/dx = 0$.



▲ Figure Ex-65

3. Sección 4.6

Movimiento Rectilíneo

3.1. Ejercicio 24

name

Sea $s(t) = t/e^t$ la función de posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea de coordenadas, donde s está en metros y t está en segundos. Utilice una utilidad gráfica para generar las gráficas de $s(t)$, $v(t)$ y $a(t)$ para $t \geq 0$, y utilice esas gráficas cuando sea necesario.

- Utilice la gráfica apropiada para hacer una estimación aproximada del momento en que la partícula invierte por primera vez la dirección de su movimiento; y luego encuentre la hora exacta.
- Encuentre la posición exacta de la partícula cuando invierte por primera vez la dirección de su movimiento.
- Utilice las gráficas apropiadas para hacer una estimación aproximada de los intervalos de tiempo en los que la partícula se acelera y en los que se desacelera; y luego encuentre esos intervalos de tiempo exactamente.

3.2. Ejercicio 40

name

Sean $s_A = 15t^2 + 10t + 20$ y $s_B = 5t^2 + 40t$, $t \geq 0$, las funciones de posición de los automóviles A y B que se mueven a lo largo de carriles rectos paralelos de una carretera.

- (a) ¿A qué distancia está el automóvil A por delante del automóvil B cuando $t = 0$?
- (b) ¿En qué instantes de tiempo están los autos uno al lado del otro?
- (c) ¿En qué instante de tiempo tienen la misma velocidad? ¿Qué coche va delante en este instante?

4. Sección 4.7

Método De Newton

4.1. Ejercicio 18

name

Utilice una utilidad gráfica para determinar el número de veces que se cruzan las curvas; y luego aplique el método de Newton, cuando sea necesario, para aproximar las coordenadas x de todas las intersecciones.


$$y = \frac{1}{8}x^3 - 1 \quad \text{y} \quad y = \cos x - 2$$

4.2. Ejercicio 34

name

Un **segmento** de círculo es la región encerrada por un arco y su cuerda (Figura Ex-34). Si r es el radio del círculo y θ el ángulo subtendido en el centro del círculo, entonces se puede demostrar que el área A del segmento es $A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin \theta)$, donde θ está en radianes. Encuentre el valor de θ para

el cual el área del segmento es un cuarto del área del círculo. Calcula θ al grado más cercano.



◀ Figure Ex-34