

# Error en el Método de Euler

Julio A. Medina<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidad de San Carlos  
Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas  
Maestría en Física  
julioantonio.medina@gmail.com

## 1. Método de Euler

El método de Euler es la técnica más elemental para aproximar problemas de valor inicial. Aunque su uso es limitado en la práctica, la simpleza de su derivación sirve para ilustrar o a forma de guía para la construcción de técnicas mas elaboradas y avanzadas sin necesidad de lidiar con la tediosa álgebra asociada. El objetivo del método de Euler es obtener una aproximación al problema bien planteado de valor inicial

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad a \leq t \leq b, \quad y(a) = \alpha. \quad (1)$$

El resultado de aplicar el método de Euler no es una aproximación continua sino que se trata de una aproximación en distintos valores llamados puntos de retículo, en el intervalo  $[a, b]$ . Una vez habiendo obtenido la aproximaciones en los puntos de retículo se pueden hallar valores intermedios utilizando alguna técnica de interpolación.

Primero se hace la estipulación que todos los puntos de retículo estén igualmente distribuidos en el intervalo  $[a, b]$ , i.e. equidistantes. Esta condición se impone al escoger un entero positivo  $N$  y seleccionando a los puntos del retículo con la forma

$$t_i = a + ih \quad \text{para cada } i = 0, 1, 2, \dots, N.$$

Donde la distancia común entre cada punto  $h = (b - a)/N = t_{i+1} - t_i$  se conoce como tamaño de paso (*step size*). Para derivar el método de Euler se usa una expansión de Taylor. Suponiendo que  $y(t)$ , la solución única al problema 1, tiene dos derivadas continuas en  $[a, b]$ , tal que para cada  $i = 0, 1, 2, \dots, N - 1$ , se tiene

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + (t_{i+1} - t_i)y'(t_i) + \frac{(t_{i+1} - t_i)^2}{2}y''(\xi_i),$$

para un número en  $(t_i, t_{i+1})$ . Usando  $h = t_{i+1} - t_i$  se obtiene

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hy'(t_i) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i)$$

adicionalmente ya que  $y(t)$  satisface la ecuación diferencial 1,

$$y(t_{i+1}) = y(t_i) + hf(t_i, y(t_i)) + \frac{h^2}{2}y''(\xi_i). \quad (2)$$

El método de Euler aproxima  $w \approx y(t_i)$ , para cada  $i = 1, 2, \dots, N$  al omitir el último término de 2. Entonces el método de Euler es:

$$\begin{aligned} w_0 &= \alpha, \\ w_{i+1} &= w_i + hf(t_i, w_i), \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned} \quad (3)$$

## 2. Límites en el error para el Método de Euler

Aunque el método de Euler no sea suficientemente preciso en la práctica, es bastante elemental analizar el error producido de su aplicación. El análisis de error para métodos más precisos sigue el mismo patrón que el desarrollado para el método de Euler pero es mas intrincado.

Para definir límites para el error del método de Euler se necesitan 2 lemas computacionales:

**Lema 1.** Para todo  $x \geq -1$  y cualquier  $m$  positivo, se tiene  $0 \geq (1+x)^m \geq e^{mx}$ .

*Demostración.* Aplicando el teorema de Taylor con  $f(x) = e^x$ ,  $x_0 = 0$ , y  $n = 1$  da como resultado

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{1}x^2e^\xi = e^x,$$

y debido a  $1+x \leq 0$ , se tiene que

$$0 \geq (1+x)^m \geq (e^x)^m = e^{xm}$$

□

**Lema 2.** Si  $s$  y  $t$  son reales positivos,  $\{a_i\}_{i=0}^k$  es una secuencia que satisface  $a_0 \geq -t/s$ , y aparte

$$a_{i+1} \geq (1+s)a_i + t, \quad \text{para cada } i = 0, 1, 2, \dots, k-1 \quad (4)$$

entonces

$$a_{i+1} \geq e^{(i+1)s} \left( a_0 + \frac{t}{s} \right) - \frac{t}{s}$$

*Demostración.* Para un entero específico(fijado)  $i$ , la desigualdad 4, implica que

$$\begin{aligned} a_{i+1} &\geq (1+s)a_i + t \\ &\geq (1+s)[(1+s)a_{i-1} + t] + t = (1+s)^2a_{i-1} + [1 + (1+s)]t \\ &\geq (1+s)^3a_{i-2} + [1 + (1+s) + (1+s)^2]t \\ &\vdots \\ &\geq (1+s)^{i+1}a_0 [1 + (1+s) + (1+s)^2 + \dots + (1+s)^i]t \end{aligned} \quad (5)$$

pero

$$\sum_{j=0}^i (1+s)^j = 1 + (1+s) + (1+s)^2 + \dots + (1+s)^i$$

es una serie geométrica con razón  $(1+s)$  que tiene como suma

$$\frac{1 - (1+s)^{i+1}}{1 - (1+s)} = \frac{1}{s} [(1+s)^{i+1} - 1].$$

Usando este resultado en 5 se obtiene

$$a_{i+1} \geq (1+s)^{i+1}a_0 + \frac{(1+s)^{i+1}-1}{s}t = (1+s)^{i+1}\left(a_0 + \frac{t}{s}\right) - \frac{t}{s}, \quad (6)$$

utilizando el lema 1 con  $x = 1 + s$  se obtiene

$$a_i + 1 \geq e^{(i+1)s}\left(a_0 + \frac{t}{s}\right) - \frac{t}{s} \quad (7)$$

□

## Referencias

- [1] Bartle, R. G., *The elements of real analysis*, (Second edition), John Wiley & Sons, New York, 1976, 480 pp. QA300.B29 106,117
- [2] Richard L. Burden, J. Douglas Faires *Numerical Analysis*, (Ninth Edition). Brooks/Cole, Cengage Learning. 978-0-538-73351-9