

Guía Clínica de Alimentación Complementaria

Enfoque de Pediatría, Gastroenterología y Alergología Infantil

Esta guía es una herramienta de referencia y registro diario diseñada para acompañarte en la introducción de sólidos de tu bebé (a partir de los 6 meses de edad corregida). Su objetivo es ayudarte a identificar el efecto de los alimentos en el sistema digestivo de tu hijo/a, así como realizar una introducción segura y oportuna de los alérgenos alimentarios para favorecer la tolerancia inmunológica.

Leyenda e Iconografía de Seguridad (Efectos Múltiples)

Nota clínica: Muchos alimentos poseen más de una propiedad simultánea (por ejemplo, un alimento puede ser laxante y a la vez un alérgeno mayor o requerir una alerta física).

-  **[Alérgeno Mayor]:** Alimento con alto potencial alergénico. Se introduce temprano (desde los 6 meses). Se ofrece una pequeña cantidad por la mañana (nunca de noche) durante 3 días seguidos, sin introducir ningún otro alimento nuevo en esos días, para vigilar reacciones (urticaria, vómito inmediato, dificultad respiratoria).
-  **[Efecto Laxante]:** Alimento rico en agua y fibra soluble (como el sorbitol o mucílagos). Ideal para combatir el estreñimiento funcional inicial.
-  **[Efecto Astringente]:** Tiende a enlentecer el tránsito intestinal o espesar el bolo fecal. Útil en episodios de diarrea o evacuaciones muy líquidas.
-  **[Efecto Regulador / Estable]:** Su comportamiento es digestivamente neutro o depende del estado de maduración del alimento, de si se ofrece crudo o cocido, o de si conserva la piel/cáscara.
-  **[Alerta / Restricción Médica]:** Alimento que requiere control estricto de porciones por inmadurez renal o metabólica (ej. nitratos en hojas verdes) o por riesgo físico de asfixia (requiere corte o preparación especial).

Listado de Alimentos por Grupo Alimenticio

Instrucciones: Coloca una marca (✓) en la casilla una vez que el alimento haya sido presentado exitosamente y tolerado sin reacciones por el bebé.

1. Cereales y Tubérculos

La principal fuente de energía de fácil digestión. Se prefiere ofrecerlos en sus versiones naturales e integrales, evitando harinas refinadas o azúcares añadidos.

- []  **Amaranto**  (Pseudocereal rico en prebióticos y fibra soluble de fácil digestión)

- []  **Arroz blanco**  (Clásico astringente por almidón de fácil digestión)
- []  **Arroz integral**  (Mayor contenido de fibra que el blanco, efecto más regulador)
- []  **Avena natural (sin azúcar)**  (Contiene betaglucanos que lubrican el colon)
- []  **Camote / Batata**  (Aporta fibra y prebióticos reguladores)
- []  **Cebada**   (Contiene gluten; introducir temprano. Aporta excelente fibra soluble)
- []  **Centeno**   (Contiene gluten; aportar temprano. Rico en fibra reguladora)
- []  **Harina de avena natural**  (Mantiene las propiedades laxantes y mucílagos de la avena)
- []  **Harina de maíz**  (Almidón simple que absorbe agua en la luz intestinal, astringente)
- []  **Maíz en grano (molido/triturado)**   (Laxante por cutícula insoluble; alerta de asfixia si se da entero)
- []  **Polenta**  (Almidón de maíz cocido que compacta las heces)
- []  **Pan integral (sin sal añadida)**   (Contiene trigo/gluten y aporta fibra soluble)
- []  **Papa**  (Almidón con tendencia astringente)
- []  **Pasta de trigo**   (Introducción de trigo/gluten con almidón de tendencia astringente)
- []  **Plátano macho (cocido)**  (Depende del grado de maduración: verde estríñe, maduro regula)
- []  **Quinoa**  (Excelente perfil de aminoácidos y fibra soluble laxante)
- []  **Trigo en grano o sémola**   (Introducción clave de gluten)
- []  **Yuca**  (Tuberosa de alto contenido de almidón simple astringente)

2. Leguminosas

Son una excelente fuente de proteína vegetal y hierro no-hemo. Se recomienda remojarlas al menos 12 horas antes de su cocción para mejorar su digestibilidad y reducir los fitatos.

- []  **Alubias / Frijoles blancos**  (Rico en fibra fermentable que acelera el tránsito)
- []  **Chícharos / Guisantes**  (Aporte de fibra soluble estimulante)
- []  **Edamame (Soya verde)**   (La soya es un alérgeno mayor; aporta excelente fibra intestinal)
- []  **Ejotes / Judías verdes**  (Aporte moderado de agua y fibra soluble)
- []  **Frijoles negros o bayos**  (Estimula el peristaltismo intestinal)
- []  **Garbanzos**  (Aporte denso de fibra soluble y oligosacáridos)
- []  **Habas**  (Promueve la formación de un bolo fecal blando)
- []  **Lentejas**  (Se recomienda iniciar con lenteja roja pelada por ser más suave para el colon del bebé)

3. Vegetales y Hortalizas

Aportan vitaminas, agua y minerales esenciales. Se deben rotar para acostumbrar al lactante a sabores amargos y neutros, reduciendo la selectividad alimentaria futura.

- []  **Acelgas**   (Excelente fibra, pero limitar porción antes de los 12 meses por presencia de nitratos)

- []  **Berenjena** 🟢 (Aporte moderado de fibra soluble y agua estimulante del colon)
- []  **Betabel / Remolacha** 🟢 ⚠️ (Laxante natural por fibra, pero contiene altos niveles de nitratos; limitar porción)
- []  **Brócoli** 🟢 (Aporte alto de fibra; puede causar gases benignos)
- []  **Calabacín / Calabaza verde** 🟢 (Favorece la hidratación del tracto digestivo por mucílagos)
- []  **Calabaza amarilla / de castilla** 🟢 (Rica en mucílagos protectores de la mucosa)
- []  **Cebolla (bien cocida)** 🟢 (Contiene inulina, prebiótico altamente laxante)
- []  **Ajo (cocido)** 🟢 (Aporta fructanos prebióticos que estimulan la microbiota y el tránsito)
- []  **Champiñón / Hongos** 🟢 (Rico en quitina y betaglucanos, estimulador intestinal suave)
- []  **Chayote** 🟢 (Muy alto contenido de agua que humecta el bolo fecal)
- []  **Col / Repollo** 🟢 (Fibra insoluble que acelera el tránsito intestinal)
- []  **Coliflor** 🟢 (Excelente aporte de fibra que incrementa el volumen fecal)
- []  **Espárragos** 🟢 (Rico en inulina, un prebiótico altamente laxante)
- []  **Espinacas** 🟢 ⚠️ (Laxante natural, pero limitar a un máximo de **20-30 g** diarios antes de los 12 meses por nitratos)
- []  **Habichuela** 🟢 (Excelente aporte de fibra vegetal hidratante)
- []  **Kale / Col rizada** 🟢 ⚠️ (Rico en fibra, limitar ración antes del año por nitratos)
- []  **Lechuga** 🟢 (Altísimo contenido de agua que humecta las evacuaciones)
- []  **Pepino (sin semillas ni cáscara inicial)** 🟢 (Aporte de agua y fibra soluble reguladora)
- []  **Pimiento morrón** 🟢 (Muy rico en Vitamina C, agua y fibra laxante)
- []  **Tomate** 🟢 (Su acidez natural puede causar enrojecimiento cutáneo; rico en agua facilitadora)
- []  **Tomate Cherry** 🟢 ⚠️ (Laxante natural, pero con riesgo de asfixia: ofrecer siempre cortado en 4 a lo largo)
- []  **Zanahoria** 🟤 (Cocida posee propiedades altamente astringentes por pectinas gelificantes)

4. Frutas

Ofrecer enteras, machacadas, en tiras (estilo BLW) o puré. **Evitar por completo los jugos o zumos**, ya que eliminan la fibra y saturan el hígado del bebé con fructosa libre.

- []  **Arándano azul / Blueberry** 🟢 ⚠️ (Gran aporte de fibra, pero riesgo de asfixia: ofrecer siempre aplastados uno por uno)
- []  **Cerezas (sin hueso)** 🟢 ⚠️ (Laxante suave; peligro físico de asfixia, retirar siempre el hueso)
- []  **Ciruela / Ciruela pasa** 🟢 (El estimulante digestivo natural más efectivo en pediatría por sorbitol)
- []  **Coco (rallado)** 🟢 (Contiene ácidos grasos de cadena media y fibra que lubrican la mucosa)

- [] 🍑 **Durazno / Melocotón** 🟢 (Rico en sorbitol y fibra soluble)
- [] 🍷 **Frambuesa** 🚫🟢 (Alérgeno secundario/liberador de histamina, rico en fibra soluble)
- [] 🍓 **Fresa** 🚫🟢 (Monitorear piel por liberación de histamina; excelente aporte de agua y fibra)
- [] 🥑 **Guayaba** 🟤 (Retirar semillas duras antes de ofrecer; su pulpa es astringente)
- [] 🥝 **Kiwi** 🟢 (Excelente densidad de fibra soluble y actinidina que promueve evacuaciones)
- [] 🍋 **Limón (gotas)** 🔄 (Regulador digestivo y facilitador de absorción de hierro)
- [] 🥥 **Mamey** 🟢 (Textura cremosa rica en fibra de fácil digestión)
- [] 🍊 **Mandarina** 🟢 (Ofrecer gajos limpios sin membranas ni semillas; laxante osmótico)
- [] 🥭 **Mango** 🟢 (Alto aporte hídrico y de pectinas laxantes)
- [] 🍏 **Manzana** 🔄 (Cocida o en puré es astringente 🟤; cruda y rallada es laxante 🟢)
- [] 🥥 **Maracuyá** 🟢 (Altamente laxante por el tipo de fibra osmótica de su pulpa)
- [] 🍈 **Melón** 🟢 (Fruta de altísima carga osmótica por agua, ablanda las heces)
- [] 🍊 **Naranja** 🟢 (Solo en gajos limpios; laxante por excelencia)
- [] 🥥 **Papaya** 🟢 (Contiene papaína, enzima facilitadora de la digestión)
- [] 🥑 **Pera** 🟢 (Altamente digestible y rica en sorbitol, laxante suave)
- [] 🍍 **Piña** 🟢 (Contiene bromelina que ayuda a la digestión y ablanda las heces)
- [] 🍌 **Plátano** 🔄 (Maduro es laxante suave; verde o poco maduro estriñe severamente 🟤)
- [] 🍉 **Sandía** 🟢 (Excelente hidratador fecal por su contenido de agua de casi el 92%)
- [] 🍊 **Toronja** 🟢 (Aporte hídrico alto y fibra soluble)
- [] 🍇 **Uva** 🟢 ⚠️ (Laxante de agua, pero alto riesgo de asfixia: cortar en 4 partes a lo largo)

5. Proteína Animal

Aporte indispensable de **Hierro Hem** (de alta absorción) y Zinc. El hierro es el nutriente crítico a partir de los 6 meses, pues las reservas del lactante se agotan en esta etapa.

- [] 🐟 **Atún** 🚫⚠️ (Alérgeno mayor. Evitar enlatado comercial por sodio y mercurio; preferir lomo fresco)
- [] 🦐 **Camarón / Mariscos** 🚫 (Alérgeno mayor)
- [] 🐷 **Cerdo (cortes magros)** 🔄 (Proteína neutra de digestión estable)
- [] 🐮 **Res / Ternera** 🔄 (Excelente fuente de hierro y zinc bioactivos de digestión estable)
- [] 🐔 **Hígado de pollo / res** ⚠️ (Altísima densidad de hierro, pero con alerta: máximo una vez por semana por exceso de Vitamina A)
- [] 🥚 **Huevo (Completo: Clara y Yema)** 🚫 (Alérgeno mayor. Ofrecer completamente cocido desde los 6 meses)
- [] 🐔 **Pavo** 🔄 (Proteína magra de digestión muy fácil y metabólicamente estable)
- [] 🐟 **Pescado Blanco (Lenguado, Merluza)** 🚫 (Alérgeno mayor)
- [] 🐔 **Pollo** 🔄 (Proteína magra digestivamente neutra y estable)
- [] 🐟 **Pescado Azul / Salmón / Sardina** 🚫🟢 (Alérgeno mayor. Rico en grasas)

DHA/EPA que ayudan a humectar el colon)

6. Derivados Lácteos

La leche entera de vaca líquida está prohibida antes del año debido a que puede provocar microsangrados intestinales imperceptibles por su alta carga proteica. Sus derivados se introducen de manera marginal y controlada a partir de los 9-10 meses.

- [] 🥛 **Yogurt natural sin azúcar (griego o entero)** 🌟 ⚠️ (A partir de los 9-10 meses. *Alérgeno y restricción de edad. Excelente probiótico*)
- [] 🧀 **Queso tierno/fresco pasteurizado bajo en sal** 🌟 ⚠️ (A partir de los 9-10 meses)
- [] 🥄 **Jocoque sin sal** 🌟 ⚠️ (A partir de los 9-10 meses por proteína intacta de vaca)
- [] 🥛 **Kéfir de leche** 🌟 ⚠️ (Alérgeno y restricción de edad; probiótico denso)
- [] 🧈 **Mantequilla (sin sal)** 🌟 ⚠️ (Usar solo como grasa de cocción en cantidades mínimas)

7. Proteína Vegetal

Alternativas proteicas saludables. La soya es un alérgeno común y debe probarse con cuidado.

- [] 🥜 **Soya (en grano o molida)** 🌟 🟢 (Alérgeno mayor y gran aporte de fibra)
- [] 🧂 **Tofu (firme o suave, sin sal)** 🌟 ⚠️ (Derivado de la soya, muy fácil de ofrecer en cubos en BLW)

8. Grasas Saludables

El cerebro del lactante está compuesto en un ^{60%} por grasa; el aporte de lípidos de buena calidad es vital para la mielinización de las neuronas (neurodesarrollo).

- [] 🥑 **Aguacate** 🟢 (Grasa monoinsaturada que suaviza y lubrica de manera excelente el colon)
- [] 🌿 **Aceite de Oliva Extra Virgen (AOEV)** 🟢 (Añadir una cucharadita cruda sobre la comida ya servida para el estreñimiento)
- [] 🥑 **Aceite de Aguacate** 🟢 (Efecto lubricante e hidratante intestinal idéntico al AOEV)
- [] 🥥 **Aceite de coco prensado en frío** 🟢 (Ácidos grasos que lubrican la mucosa del colon)
- [] 🥜 **Semillas de Ajonjolí / Sésamo** 🌟 ⚠️ (Alérgeno mayor recientemente incorporado por agencias reguladoras)
- [] 🌿 **Semillas de Chía (hidratadas)** 🟢 (Al activarse forma un gel mucilaginoso altamente laxante)
- [] 🌿 **Semillas de Linaza (molidas)** 🟢 (Excelente fibra soluble y omega-3 laxante)
- [] 🍫 **Cacao puro 100% (sin azúcar)** 🔄 (A partir de los 10-12 meses, regulador intestinal suave)
- [] 🥜 **Mantequilla de Cacahuete (100% pura)** 🌟 🟢 ⚠️ (Alérgeno mayor, grasa laxante, pero peligro físico: diluir siempre)
- [] 🥜 **Mantequilla de Almendras (100% pura)** 🌟 🟢 ⚠️ (Alérgeno mayor y grasa laxante; requiere dilución)

- [] 🌰 **Mantequilla de Nuez (100% pura)** 🚫🟢⚠️ (Alérgeno mayor y grasa laxante; requiere dilución)
- [] 🌻 **Semillas de Girasol (molidas)** 🟢 (Grasas saludables densas que lubrican el bolo fecal)

🛑 Pautas Clínicas de Seguridad y Alergias

1. **La Regla de los 3 Días (Para Alérgenos 🚫):**
Presenta el alérgeno seleccionado por la mañana. Ofrécelo durante 3 días consecutivos en porciones crecientes. Durante estos 3 días, no introduces ningún otro alimento nuevo. Si no hay cambios en la piel, evacuaciones o respiración, el alimento se considera tolerado y debe seguirse ofreciendo de forma regular en la dieta semanal para mantener la tolerancia.
2. **Consistencia de los Frutos Secos:**
NUNCA ofrezcas nueces, almendras, cacahuates ni semillas enteras o en trozos a niños menores de 5 años debido al alto riesgo de aspiración bronquial. Preséntalos siempre triturados hasta hacerlos polvo o integrados en cremas (mantequillas de frutos secos) diluidas con un poco de agua o puré caliente.
3. **Prohibición de Azúcar y Sal:**
El riñón de los bebés no está preparado para procesar la sal añadida, y el azúcar predispone a la obesidad infantil, diabetes y altera la preferencia natural de su paladar. Evítalos estrictamente antes de los 2 años.



Evidencia Científica y Justificación Clínica 1 a 1

Para garantizar la máxima transparencia en la toma de decisiones médicas, a continuación se desglosa el sustento fisiopatológico, digestivo e inmunológico de cada clasificación del listado:

A. Justificación de Alérgenos Mayores (🚫)

- **Trigo 🌾, Cebada 🌾, Centeno 🌾 (Gluten):** La introducción temprana de gluten (entre los 4 y 12 meses de edad) no incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad celíaca o alergia al trigo; por el contrario, postergar su introducción se asocia con un mayor riesgo inmunológico.
 - *Sustento:* **ESPGHAN Committee on Nutrition (Fewtrell, M. et al., 2017).**
- **Ajonjolí / Sésamo 🌰:** El sésamo es responsable de reacciones alérgicas severas mediadas por IgE. En 2023, agencias internacionales lo declararon el noveno alérgeno mayor, requiriendo el mismo protocolo estricto de introducción de 3 días que el maní.
 - *Sustento:* **Food Allergy Safety, Treatment, Education, and Research (FASTER) Act (FDA, 2023).**
- **Huevo completo 🥚 (Clara y Yema):** El huevo cocido contiene proteínas altamente alergénicas (como la ovalbúmina). La introducción temprana y sistemática a partir de los 6 meses reduce significativamente el desarrollo de alergia mediada por IgE.
 - *Sustento:* **EAACI Guidelines on Allergen Prevention (2021) / AAP Policy Update**

(Greer et al., 2019).

- **Pescados y Mariscos** 🐟 🦀: La parvalbúmina (en pescados) y la tropomiosina (en mariscos) son alérgenos termoestables mayores. Evitarlos durante el primer año incrementa la prevalencia de alergias atópicas. Su consumo temprano aporta DHA esencial para el neurodesarrollo.
 - *Sustento:* **ESPGHAN Position Paper (2017).**
- **Soya** 🥛 y **Tofu** 🍲: La soya es una de las leguminosas con mayor concentración de proteínas alergénicas complejas (como la glicinina). Requiere el protocolo de introducción segura de 3 días.
 - *Sustento:* **Directrices de Alergias Alimentarias de la NIAID (2017).**
- **Frutos Secos y Cacahuete** 🌰 🥜 (Cacahuete, Almendra, Nuez): El cacahuete es un alérgeno mayor terrestre de alta reactividad. El estudio clínico *LEAP* demostró una reducción de hasta el **80%** en alergias si se introduce de forma fluida y constante antes del primer año de vida.
 - *Sustento:* **Estudio LEAP (Du Toit et al., 2015, NEJM) / Addendum Guidelines for Peanut Allergy Prevention (NIAID, 2017).**
- **Derivados Lácteos** 🥛 🧀: Contienen caseína y beta-lactoglobulina (alérgenos de la leche de vaca). Aunque la leche líquida entera está prohibida antes del año por riesgo de microsangrado GI, los lácteos fermentados se toleran marginalmente a partir de los 9 meses debido a que la fermentación hidroliza parcialmente sus proteínas facilitando su digestión.
 - *Sustento:* **AAP Section on Breastfeeding / ESPGHAN Committee on Nutrition.**

B. Justificación de Efectos Gastrointestinales (🟢, 🔴, 🔄)

- **Amaranto** 🌾 (🟢): Al clasificarse como pseudocereal libre de gluten, contiene concentraciones sobresalientes de fibra dietética (hasta un **7-10%** de su peso seco). Su fibra funciona como un potente sustrato fermentable que modula positivamente la microbiota infantil (promoviendo la proliferación de *Faecalibacterium* productor de butirato) y facilitando el vaciamiento colónico.
 - *Sustento:* **Estudios de Modulación de Microbiota (ResearchGate, 2024) / Gastroenterología Pediátrica de NASPGHAN.**
- **Harina de maíz** 🌽 y **Polenta** 🍲 (🔴): Al retirar la cáscara insoluble del maíz, el grano molido se comporta puramente como almidón gelatinizado tras la cocción. En la luz intestinal, este almidón libre capta el agua libre y reduce la velocidad del tránsito intestinal, ayudando a compactar las deposiciones líquidas.
 - *Sustento:* **AEP / Protocolos de Manejo de la Diarrea Aguda (Asociación Española de Pediatría).**
- **Vegetales de alta hidratación (Coliflor, Espárragos, Ejotes, Pepino, Tomate, Lechuga, Berenjena, Cebolla, Ajo, Champiñón)** 🟢: Estos alimentos contienen abundante agua libre y fibras indigeribles (como celulosa y lignina) o prebióticos específicos (como la inulina de la cebolla, el ajo y los espárragos). Su consumo eleva el volumen de agua fecal

dentro de la luz del colon, lo cual activa de forma refleja el peristaltismo intestinal mediante mecanorreceptores musculares.

- **Sustento:** NASPGHAN-ESPGHAN Guidelines for the Evaluation and Treatment of Functional Constipation (2014).
- **Frutas acuosas (Melón, Sandía, Toronja, Maracuyá, Mamey, Naranja, Mandarina, Piña) 🍈:** Poseen una baja carga de carbohidratos complejos y una altísima relación agua/fibra soluble. Funcionan mediante un efecto osmótico fisiológico, atrayendo fluidos hacia el colon y facilitando la lubricación del bolo fecal.
 - **Sustento:** Johns Hopkins Pediatric Gastroenterology Manual.
- **Avena 🍷, Ciruela Pasa 🍇, Linaza 🌱, Chía 🌱, Aguacate 🥑:** Poseen altos niveles de fibra soluble (mucílagos, pectinas) y alcoholes de azúcar (como el sorbitol en la ciruela). Estas moléculas retienen agua en la luz del colon, estimulan el peristaltismo y lubrican la mucosa intestinal, combatiendo el estreñimiento funcional de transición.
 - **Sustento:** Gastroenterología Pediátrica de NASPGHAN / ESPGHAN.
- **Arroz Blanco 🍚, Papa 🍠, Zanahoria Cocida 🥕, Guayaba 🍓, Yuca 🍓:** Ricos en almidones simples digeribles y pectinas desmetiladas (especialmente la zanahoria cocida y la guayaba sin semillas). Estos compuestos gelifican el contenido intestinal, absorben el exceso de líquido libre y ralentizan la velocidad de tránsito del bolo alimenticio (efecto astringente).
 - **Sustento:** Protocolos de Rehidratación y Nutrición en Diarrea Aguda (Asociación Española de Pediatría - AEP).
- **Plátano 🍌 y Manzana 🍏 (Reguladores 🔄):**
 - La *manzana* cocida libera pectinas solubles astringentes; cruda y con cáscara aporta celulosa insoluble que estimula el colon (laxante).
 - El *plátano* maduro aporta azúcares simples de fácil absorción y fibra soluble suave; verde contiene almidón resistente indigerible que fermenta y causa estreñimiento severo.
 - **Sustento:** Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (Johns Hopkins Medicine).
- **Proteínas Estables (Pollo 🍗, Res 🍖, Pavo 🍗, Cerdo 🍖) 🔄:** Las carnes rojas y blancas no contienen fibra dietética. Al ser proteínas de alta digestibilidad, proveen el sustrato para la formación del bolo fecal base sin alterar la velocidad o motilidad intestinal por sí solas, comportándose de forma neutra y metabólicamente estable.
 - **Sustento:** OMS / Guías de alimentación complementaria.

C. Justificación de Alertas Médicas y Físicas (⚠️)

- **Betabel 🍷, Espinacas 🌱, Acelgas 🌱, Kale 🌱 (Nitratos):** Acumulan altos niveles de nitratos del suelo. En el estómago del lactante (< 12 meses), estos nitratos se reducen a nitritos por acción bacteriana. Los nitritos oxidan el hierro de la hemoglobina a metahemoglobina, la cual es incapaz de transportar oxígeno (provocando metahemoglobinemia o "síndrome del bebé azul"). Se restringe su porción a un máximo de **20%** del plato diario antes del año.
 - **Sustento:** Opinión Científica sobre Nitratos en Hortalizas de la EFSA (CONTAM

Panel, 2010) / Recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN).

- **Hígado de Pollo y Res 🍖:** El hígado almacena cantidades masivas de vitamina A preformada (retinol). Mientras que el betacaroteno de las plantas es seguro, el consumo excesivo de retinol de origen animal en lactantes puede desencadenar toxicidad aguda o crónica por Vitamina A, afectando el sistema óseo y presionando la fontanela. Por tanto, se aconseja limitar su ingesta a una porción pequeña semanal.
 - *Sustento:* WHO Guideline: Vitamin A supplementation in infants and children (2011) / ESPGHAN Committee on Nutrition.
- **Uvas 🍇, Tomates Cherry 🍅, Arándanos Azules 🍇, Cerezas 🍒, Maíz en Grano 🌽:** Su forma esférica, tamaño similar a la tráquea infantil y consistencia lisa y firme facilitan que se deslicen accidentalmente hacia la vía aérea al morderlos, actuando como un tapón hermético que bloquea la laringe. **Deben ofrecerse estrictamente cortados longitudinalmente en cuatro partes o aplastados.**
 - *Sustento:* Guías de Prevención de Asfixia por Cuerpos Extraños de la Academia Americana de Pediatría (AAP).
- **Crema de Frutos Secos (Mantequilla de maní, almendras, etc.) 🥜:** Al ser pastas de alta viscosidad y densidad, se adhieren fuertemente al paladar y a la parte posterior de la garganta del bebé, impidiendo la deglución coordinada y provocando riesgo inminente de asfixia mecánica. **NUNCA se ofrecen solas ni en cucharadas;** siempre diluidas en agua, leche o purés fluidos.
 - *Sustento:* NIAID Addendum Guidelines (2017).



Soporte de Evidencia Científica (Referencias)

- **Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN):** [Fewtrell, M., et al. \(2017\). Complementary Feeding: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition.](#)
- **Estudio LEAP (Learning Early About Peanut Allergy):** [Du Toit, G., et al. \(2015\). New England Journal of Medicine.](#)
- **Academia Americana de Pediatría (AAP):** [Greer, F. R., et al. \(2019\). The Effects of Early Nutritional Interventions on the Development of Atopic Disease.](#)
- **Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA):** [Panel on Contaminants in the Food Chain \(CONTAM\). \(2010\). Statement on possible public health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables.](#)
- **U.S. Food and Drug Administration (FDA):** [FASTER Act: Sesame became the 9th major food allergen \(2023\).](#)
- **Organización Mundial de la Salud (OMS):** [Guías de alimentación complementaria \(Actualización de Directrices 6-23 meses de edad\).](#)