

GUIA PRÁTICO GRATUITO

Controle da Ansiedade

Um guia prático para entender a ansiedade e lidar com ela no dia a dia.



Claudia Alves de Assis

Enfermeira, pós-graduada em psiquiatria

Sumário

Apresentação

1. O que é ansiedade
2. Como a ansiedade aparece
3. O ciclo da ansiedade e da evitação
4. Técnicas para o momento de crise
5. Lidando com pensamentos ansiosos
6. Hábitos que ajudam
7. Autoavaliação
8. Seu plano e exercícios para a semana
9. Quando buscar ajuda

Uma palavra final

Apresentação

O coração acelera antes de uma conversa importante. A cabeça não para de imaginar o que pode dar errado. O sono demora a chegar porque os pensamentos ficam girando. Se você já viveu algo assim, sabe como a ansiedade pode ocupar espaço no dia a dia.

Sentir ansiedade é humano. Ela faz parte do nosso sistema de proteção e, em muitos momentos, nos ajuda. O problema começa quando ela fica intensa demais, aparece com muita frequência ou passa a decidir por você o que você faz e o que deixa de fazer.

Este guia não tem a proposta de fazer a ansiedade desaparecer, porque isso nem seria possível nem desejável. A proposta é ajudar você a **entender o que acontece** quando ela aparece e a ter **ferramentas práticas** para atravessar esses momentos com mais tranquilidade e menos sofrimento.

Você vai encontrar explicações curtas, técnicas para usar na hora em que a ansiedade aperta, formas de lidar com os pensamentos que alimentam a preocupação, hábitos que contribuem para o equilíbrio e exercícios para acompanhar a sua evolução.

Como usar este guia: leia com calma, um capítulo por vez. Escolha uma técnica e pratique quando estiver tranquila(o), não só na hora da crise. Quanto mais familiar ela for, mais fácil será lembrar dela quando você precisar.

1. O que é ansiedade

A ansiedade é uma **resposta natural de alerta** do nosso organismo diante de algo que percebemos como ameaça, desafio ou incerteza. Ela prepara o corpo e a mente para agir: o coração bate mais rápido, a respiração muda, os músculos ficam prontos e a atenção se volta para o possível perigo.

Essa reação foi essencial para a sobrevivência humana. Diante de um perigo real, ela nos ajuda a fugir, a nos proteger ou a reagir rápido. No dia a dia, em doses moderadas, ela também ajuda: faz você estudar para a prova, revisar a apresentação ou olhar duas vezes antes de atravessar a rua.

Quando a ansiedade deixa de ajudar

O nosso sistema de alerta nem sempre diferencia um perigo real de um perigo imaginado. Uma lembrança, uma mensagem não respondida ou um pensamento sobre o futuro podem disparar a mesma reação que um risco concreto. A ansiedade passa a atrapalhar quando:

- **é desproporcional** à situação, ou seja, muito mais intensa do que o que está acontecendo de fato;
- **dura muito tempo** ou aparece com frequência, mesmo sem um motivo claro;
- **gera muito sofrimento** e deixa você esgotada(o);
- **limita a sua vida**, fazendo você deixar de ir a lugares, falar com pessoas ou fazer coisas de que gosta.

X "Preciso parar de sentir ansiedade de qualquer jeito."

✓ "A ansiedade é um alarme. Posso aprender a ouvir o que ela indica sem deixar que ela decida tudo por mim."

Importante: ansiedade não é fraqueza, frescura ou falta de força de vontade. É uma reação do corpo e da mente, e pode ser compreendida e cuidada.

2. Como a ansiedade aparece

A ansiedade não fica só na cabeça. Ela se manifesta em três áreas que se influenciam o tempo todo: o corpo, os pensamentos e o comportamento. Perceber como ela aparece em você é o primeiro passo para agir mais cedo, antes que ela fique muito intensa.

Área	Como pode aparecer	Exemplos
No corpo	Sinais físicos de alerta.	Coração acelerado, respiração curta, aperto no peito, tensão muscular, mãos frias ou suadas, estômago embrulhado, tremores, cansaço, dificuldade para dormir.
Nos pensamentos	A mente se volta para o perigo e para o futuro.	"E se der errado?", "Não vou dar conta", "Vai acontecer alguma coisa ruim", dificuldade de concentração, preocupação que não desliga.
No comportamento	O que fazemos para tentar aliviar o desconforto.	Evitar situações, adiar tarefas, checar várias vezes, buscar confirmação o tempo todo, inquietação, comer mais ou menos, ficar muito tempo no celular.
Nas emoções	Sensações que acompanham o alerta.	Medo, nervosismo, irritação, impaciência, sensação de estar "no limite" ou de que algo ruim vai acontecer.

Cada pessoa tem o seu jeito de sentir ansiedade. Algumas percebem primeiro o corpo; outras, os pensamentos; outras só se dão conta quando já estão evitando algo. Não existe um jeito certo.

*Mariana tem uma entrevista de emprego amanhã. À noite, sente o estômago apertado (**corpo**), pensa "vou travar na hora e passar vergonha" (**pensamento**), sente medo e irritação (**emoção**) e fica rolando a tela do celular até tarde para não pensar no assunto (**comportamento**). Resultado: dorme mal, e a ansiedade do dia seguinte fica ainda maior.*

Para refletir: quais são os primeiros sinais que você percebe quando a ansiedade começa? Onde ela aparece primeiro em você?

3. O ciclo da ansiedade e da evitação

Quando sentimos ansiedade, é natural querer fugir do que a provoca. Evitar dá um alívio rápido, e por isso parece a solução. O problema é que, com o tempo, a evitação costuma **alimentar** a ansiedade, em vez de diminuí-la.

Como o ciclo funciona

1. **A situação:** algo é percebido como ameaçador (uma reunião, uma ligação, sair de casa, uma conversa).
2. **A ansiedade sobe:** o corpo entra em alerta e a mente imagina o pior.
3. **A evitação:** você cancela, adia, foge ou dá um jeito de não enfrentar.
4. **O alívio imediato:** a ansiedade baixa na hora, e o cérebro aprende que fugir "funcionou".
5. **O efeito a longo prazo:** a situação parece ainda mais perigosa da próxima vez, a confiança diminui e a lista de coisas evitadas cresce.

Com isso, você nunca tem a chance de descobrir que poderia dar conta, ou que o que temia não aconteceu, ou aconteceu de um jeito suportável.

Como quebrar o ciclo

Quebrar o ciclo não significa se jogar de uma vez na situação mais difícil. Significa **se aproximar aos poucos** do que você evita, em passos pequenos e possíveis, permitindo que a ansiedade apareça e perceba que ela sobe, chega a um pico e depois tende a baixar.

Se falar ao telefone gera muita ansiedade, você pode começar ligando para um número de atendimento automático. Depois, para alguém de confiança. Depois, para marcar uma consulta. Cada passo vencido mostra para o seu cérebro que aquela situação é possível.

X "Só vou fazer quando a ansiedade passar."

✓ "Posso fazer mesmo sentindo um pouco de ansiedade. Ela não precisa sumir para eu agir."

Comportamentos de segurança

Às vezes, a evitação é mais sutil: ir ao evento, mas ficar perto da porta; fazer a tarefa, mas checar dez vezes; sair de casa só acompanhada(o). Esses comportamentos trazem conforto no momento, mas podem manter a sensação de que você só está segura(o) por causa deles. Vale observar quais você usa e, aos poucos, testar reduzi-los.

4. Técnicas para o momento de crise

Quando a ansiedade aperta, pensar com clareza fica difícil. Por isso, as técnicas deste capítulo usam principalmente o **corpo** e os **sentidos** para ajudar você a voltar para o presente. Elas não fazem a ansiedade sumir na hora, mas podem ajudar a reduzir a intensidade e a atravessar o momento.

Respiração diafragmática lenta

Na ansiedade, a respiração costuma ficar curta e rápida, no alto do peito. Respirar devagar, usando a barriga, ajuda a sinalizar para o corpo que ele pode desacelerar.

1. Sente-se ou deite-se numa posição confortável. Coloque uma mão no peito e outra na barriga.
2. Inspire pelo nariz, devagar, contando até 4, sentindo a barriga subir. A mão do peito quase não se mexe.
3. Faça uma pausa curta, sem forçar.
4. Solte o ar devagar pela boca, contando até 6, como se estivesse soprando uma vela sem apagá-la.
5. Repita por alguns minutos. O importante é que a expiração seja um pouco mais longa que a inspiração.

Dica: se contar até 4 e 6 parecer difícil, use números menores. Não force a respiração: o objetivo é deixá-la mais lenta e confortável, não encher o pulmão ao máximo. Se sentir tontura, volte a respirar normalmente.

Técnica 5-4-3-2-1 (aterramento)

Quando a mente dispara para o futuro, os sentidos podem trazer você de volta para o aqui e agora. Olhe ao redor e identifique, com calma:

1. **5 coisas que você vê** (a cor da parede, um objeto na mesa, a luz da janela).
2. **4 coisas que você pode tocar** (a textura da roupa, o encosto da cadeira, os pés no chão).
3. **3 sons que você ouve** (um carro, o ventilador, a própria respiração).

4. **2 cheiros que você sente** (ou dois cheiros de que você gosta, se não perceber nenhum).
5. **1 sabor** que você sente na boca, ou algo bom que você pode dizer a si mesma(o).

Nomeie a emoção

Colocar em palavras o que você sente ajuda a criar uma pequena distância entre você e a emoção. Em vez de ser engolida(o) por ela, você passa a observá-la.

X "Eu estou enlouquecendo, não aguento mais."

✓ "Estou sentindo ansiedade. Meu coração está acelerado. É desconfortável, mas vai passar."

Outros recursos rápidos

- **Relaxe os músculos:** contraia as mãos com força por alguns segundos e solte devagar. Faça o mesmo com ombros, rosto e pernas, percebendo a diferença entre tensão e relaxamento.
- **Use água:** lavar o rosto ou as mãos com água fria pode ajudar a mudar o foco.
- **Mexa-se:** uma caminhada curta, mesmo dentro de casa, ajuda o corpo a gastar a energia do alerta.
- **Fale com alguém:** uma ligação ou mensagem para uma pessoa de confiança pode trazer apoio e outra perspectiva.

Atenção: se for a primeira vez que você sente sintomas físicos intensos, como dor ou aperto no peito, falta de ar, formigamento ou sensação de desmaio, procure um serviço de saúde. Esses sintomas podem ter outras causas e precisam ser avaliados.

5. Lidando com pensamentos ansiosos

A ansiedade costuma vir acompanhada de **pensamentos automáticos**: ideias rápidas, que surgem sem esforço e parecem verdades absolutas. "Vai dar errado", "todo mundo vai perceber", "eu não vou conseguir". Eles não são escolhidos, mas podemos aprender a percebê-los e a olhar para eles com mais cuidado.

Armadilhas comuns do pensamento ansioso

- **Catastrofizar**: imaginar o pior cenário possível como se fosse o mais provável. "Se eu errar nessa apresentação, vou ser demitida."
- **Adivinhar o futuro**: ter certeza de como as coisas vão acontecer. "Sei que vai ser horrível."
- **Ler pensamentos**: supor o que os outros pensam. "Ela não respondeu porque está brava comigo."
- **Tudo ou nada**: ver as coisas em extremos. "Se não for perfeito, é um fracasso."
- **Subestimar a si mesma(o)**: achar que não vai dar conta, mesmo já tendo enfrentado situações parecidas.

Perguntas para questionar o pensamento

Quando perceber um pensamento ansioso, em vez de brigar com ele ou tentar apagá-lo, faça algumas perguntas:

1. Que evidências eu tenho de que isso é verdade? E que evidências eu tenho do contrário?
2. Isso é um fato ou é uma interpretação minha?
3. Qual é o pior que pode acontecer, o melhor, e o mais provável?
4. Se acontecer o que eu temo, o que eu poderia fazer para lidar com isso?
5. O que eu diria para uma amiga ou um amigo que estivesse pensando assim?

Exemplo: a mensagem sem resposta

Você mandou uma mensagem para uma amiga de manhã e, à tarde, ela ainda não respondeu.

Pensamento ansioso: "Ela está chateada comigo. Devo ter falado alguma coisa errada. Vou perder essa amizade."

Pensamento mais equilibrado: "Não sei o motivo. Ela pode estar ocupada, como já aconteceu outras vezes. Se eu continuar preocupada amanhã, posso perguntar se está tudo bem."

O "e se..."

Muitos pensamentos ansiosos começam com "e se...": e se eu passar mal, e se eu for mal, e se acontecer algo com quem eu amo. Esses pensamentos levam para um futuro que ainda não existe. Algumas formas de responder:

- **Complete o "e se" com um plano:** "E se eu travar na apresentação? Então eu respiro, olho minhas anotações e continuo."
- **Separe o que depende de você:** pergunte se existe algo prático a fazer agora. Se existir, faça. Se não existir, reconheça que preocupar-se mais não muda o resultado.
- **Volte para o presente:** "Agora, neste momento, estou em casa, em segurança, e o que preciso fazer é..."

A "hora da preocupação"

Quando a preocupação aparece o dia inteiro, uma estratégia útil é **dar a ela um horário**. Em vez de tentar não se preocupar (o que costuma ter o efeito contrário), você combina consigo um momento do dia para isso.

1. Escolha um horário fixo, de 15 a 20 minutos, que não seja perto da hora de dormir.
2. Ao longo do dia, quando surgir uma preocupação, anote numa folha ou no celular e diga a si mesma(o): "Vou pensar nisso no meu horário".

3. Na hora combinada, leia a lista. Para cada item, pergunte: posso fazer algo a respeito? Se sim, defina um passo prático. Se não, deixe para lá.
4. Quando o tempo acabar, encerre e volte para outra atividade.

Com a prática, muitas pessoas percebem que várias preocupações perdem força até chegar a hora marcada.

6. Hábitos que ajudam

Nenhum hábito, sozinho, resolve a ansiedade. Mas a forma como você cuida do corpo e da rotina influencia o quanto o seu sistema de alerta fica sensível. Pequenos ajustes, mantidos com regularidade, podem fazer diferença.

Sono

Dormir pouco ou mal costuma deixar o corpo mais reativo e a mente mais preocupada. Algumas atitudes favorecem um sono melhor:

- tente dormir e acordar em horários parecidos, inclusive nos fins de semana;
- crie um ritual de desaceleração antes de deitar, como um banho morno, leitura leve ou a respiração lenta;
- se a mente estiver agitada, anote as preocupações num papel antes de dormir, para "tirar da cabeça".

Movimento

A atividade física ajuda o corpo a gastar a energia acumulada pelo estado de alerta e costuma trazer sensação de bem-estar. Não precisa ser academia: caminhar, dançar, pedalar ou alongar já contam. Escolha algo de que você goste e que caiba na sua rotina. Se você tiver alguma condição de saúde, converse com um profissional antes de começar.

Cafeína e álcool com moderação

- **Cafeína** (café, chá preto, chá mate, refrigerantes à base de cola, energéticos) é estimulante e, em algumas pessoas, pode intensificar sintomas parecidos com os da ansiedade, como coração acelerado e inquietação. Observe como você reage e evite consumir no fim do dia.
- **Álcool** pode parecer relaxante no momento, mas costuma prejudicar o sono e, para muitas pessoas, a ansiedade aumenta nos dias seguintes. Usar a bebida como forma de "acalmar" merece atenção.

Pausas ao longo do dia

Passar o dia inteiro em ritmo acelerado deixa pouco espaço para o corpo se recuperar. Pequenas pausas de poucos minutos, para respirar, beber água, olhar pela janela ou se alongar, ajudam a baixar a tensão antes que ela se acumule.

Telas e notícias

- Notícias e redes sociais em excesso podem manter a mente em estado de alerta. Considere escolher horários para se informar, em vez de acompanhar o tempo todo.
- Desative notificações que não são essenciais.
- Tente deixar o celular longe da cama e evitar telas pouco antes de dormir.

Conexões e atividades prazerosas

Conversar com pessoas de confiança, fazer algo de que você gosta e reservar tempo para o lazer não são luxos: são parte do cuidado com a saúde emocional. Quando a ansiedade aumenta, muitas pessoas se isolam e deixam essas atividades de lado, justamente quando elas mais ajudam.

Para começar: escolha apenas um hábito para ajustar nesta semana. Mudanças pequenas e possíveis costumam durar mais do que grandes promessas.

7. Autoavaliação

Responda pensando nas últimas duas semanas. O objetivo é perceber o quanto a ansiedade tem ocupado espaço na sua rotina e onde vale a pena cuidar mais. Não existe resposta certa.

0 = nunca · 1 = às vezes · 2 = quase sempre

Sinto o corpo tenso, agitado ou em estado de alerta.

0

1

2

Tenho dificuldade de parar de me preocupar.

0

1

2

Imagino que coisas ruins vão acontecer.

0

1

2

A preocupação atrapalha o meu sono.

0

1

2

Tenho dificuldade de me concentrar por causa da preocupação.

0

1

2

Fico irritada(o) ou impaciente com facilidade.

0

1

2

Evito situações, lugares ou pessoas por causa da ansiedade.

0

1

2

Adio tarefas importantes porque elas me deixam ansiosa(o).

0

1

2

Preciso que outras pessoas me tranquilizem com frequência.

0

1

2

Sinto que a ansiedade me impede de fazer coisas que eu gostaria.

0

1

2

0 a 6 pontos: a ansiedade parece ocupar pouco espaço na sua rotina neste momento. Continue cuidando dos hábitos que ajudam e pratique as técnicas para ter recursos quando precisar.

7 a 13 pontos: a ansiedade tem aparecido com alguma frequência. Escolha uma técnica de crise e a hora da preocupação para praticar nesta semana, e observe em quais situações ela aumenta.

14 a 20 pontos: a ansiedade parece estar ocupando bastante espaço na sua vida. As técnicas deste guia podem ajudar, e vale muito conversar com um profissional de saúde para receber um cuidado mais próximo.

Esta autoavaliação é um exercício de autoconhecimento e não tem valor de diagnóstico.

8. Seu plano e exercícios para a semana

Plano pessoal para momentos difíceis

Na hora da crise, é difícil lembrar do que ajuda. Por isso, vale preparar um plano com calma, num momento tranquilo, e deixá-lo num lugar fácil de encontrar (na carteira, na bolsa ou no celular).

Os primeiros sinais de que a ansiedade está aumentando em mim são:

Situações que costumam disparar a minha ansiedade:

Uma técnica que vou usar no momento de crise:

Uma frase que me ajuda a lembrar que vai passar:

Uma atividade que me acalma:

Pessoas para quem posso ligar ou mandar mensagem:

Profissional ou serviço de saúde que posso procurar:

Em caso de crise ou risco: CVV 188 (gratuito, 24 horas) · SAMU 192

Exercício 1: diário de ansiedade

Durante uma semana, anote os momentos em que a ansiedade apareceu. Com o tempo, você começa a perceber padrões: horários, situações e pensamentos que se repetem, e o que ajuda de verdade.

Dia	Situação	O que senti no corpo	O que pensei	Intensidade (0 a 10)	O que fiz e como ficou depois
Seg					
Ter					
Qua					
Qui					
Sex					
Sáb					
Dom					

Exercício 2: respiração todos os dias

Pratique a respiração diafragmática lenta por cinco minutos, uma ou duas vezes por dia, em momentos tranquilos. Treinar quando você está calma(o) torna mais fácil usar a técnica quando a ansiedade aparecer.

Exercício 3: reescreva um pensamento

Escolha um pensamento ansioso que se repetiu durante a semana e use as perguntas do capítulo 5:

Pensamento ansioso: _____

Evidências a favor: _____

Evidências contra: _____

O mais provável é: _____

Um pensamento mais equilibrado: _____

Exercício 4: um pequeno passo

Pense em algo que você tem evitado por causa da ansiedade e divida em passos menores, do mais fácil ao mais difícil. Nesta semana, dê apenas o primeiro passo. Depois, observe: o que você sentiu antes, durante e depois? A ansiedade foi do tamanho que você imaginava?

9. Quando buscar ajuda

As técnicas deste guia podem ajudar bastante no dia a dia, mas não substituem o cuidado profissional. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza: é uma forma de cuidar de si. Vale procurar um profissional de saúde se:

- a ansiedade é intensa, frequente e não melhora com o tempo;
- ela está atrapalhando o seu trabalho, os seus estudos, as suas relações ou o seu sono;
- você tem evitado cada vez mais lugares, pessoas ou situações;
- você tem crises súbitas de medo intenso, com sintomas físicos fortes;
- você tem usado álcool ou outras substâncias para conseguir se acalmar;
- você se sente sem esperança, muito triste ou sem vontade de fazer as coisas de que gostava;
- surgem pensamentos de se machucar ou de que não vale a pena viver.

Você pode começar pela Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, que pode orientar e encaminhar para outros serviços da rede, ou procurar um profissional de saúde mental da sua confiança.

Sintomas físicos merecem avaliação

Dor ou aperto no peito, falta de ar, palpitações fortes, tontura, formigamento ou sensação de desmaio podem acontecer em momentos de ansiedade intensa, mas **também podem ter outras causas**. Por isso, especialmente se for a primeira vez ou se os sintomas forem diferentes do habitual, procure um serviço de saúde para ser avaliada(o). Não presuma que é "só ansiedade" sem essa avaliação.

Em situação de crise ou risco, não espere. Ligue **188** (CVV, gratuito, 24 horas) para conversar com alguém, ou **192** (SAMU) em caso de emergência. Dor no peito, falta de ar ou sintomas parecidos devem ser avaliados por um serviço de saúde, porque podem ter outras causas.

Uma palavra final

Cuidar da ansiedade é um caminho, não uma linha de chegada. Vão existir dias em que as técnicas vão funcionar muito bem e outros em que a ansiedade vai parecer maior do que tudo. Isso não significa que você falhou. Significa que você é humana(o).

O mais importante é continuar praticando, com paciência e gentileza consigo. Cada vez que você respira com calma, questiona um pensamento ou dá um pequeno passo em direção ao que evitava, você mostra para si mesma(o) que é capaz de atravessar momentos difíceis.

Se quiser aprofundar esse caminho, conheça os outros conteúdos do site ou agende uma conversa.

Claudia Alves de Assis

Enfermeira, pós-graduada em psiquiatria

juliosv-hub.github.io/Sobre-voce

Este material tem caráter educativo e não substitui avaliação ou acompanhamento profissional. © 2026 Sobre você. Pode ser compartilhado livremente, desde que sem alterações e com os créditos.