



Seminarfach

Facharbeit

Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2



Gymnasium Mellendorf
Fritz-Sennheiser-Platz 2
30900 Wedemark
Schuljahr: 2026/27

Seminarfach

Verfasser:	Julian Luke Mawill Baden
Thema:	Entstehungsmechanismen und strukturelle Merkmale von Zentralbergen in Impaktkratern, Vulkanen und Äquatorialkämmen im Sonnensystem
Fachlehrkraft und Kursbezeichnung:	Herr Ropeter , 13sf2

Abgabetermin: 05.10.2026 zu Beginn der Seminarfachsitzung um 14 Uhr

Benotung:

Julian Luke Mawill Baden

Datum

Unterschrift der Lehrkraft

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	1
2 Zentralberge	1
2.1 Was sind Zentralberge	1
2.2 Entstehung	2
2.3 Zentralringe	2
3 Äquatorialkämme	2
3.1 Iapetus einzigartiges Gebirge	2
3.2 Entstehungstheorien	3
3.2.1 Theorie Cassini Region	3
4 Vulkane	3
Abbildungs- und Literaturverzeichnis	II




Abbildung 1: Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mouginis-Mark (2012: S.1619). Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. aufgerufen am 29.08.2026. https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png

1 Einführung

2 Zentralberge

2.1 Was sind Zentralberge

Zentralberge kommen in größeren Impaktkratern auf allen festen Himmelskörpern vor. Es handelt sich um zentrale Erhöhungen in der Kratermitte, die sich in der dritten Phase der Kraterentstehung formen (siehe Kapitel 2.2).

Ein anschauliches Beispiel für einen Krater mit Zentralberg ist der Tooting-Krater (siehe Abb.1). Der auf dem Mars, in der Amazonis Planitia, westlich des Olympus Mons, liegende Krater besitzt einen Radius von 29 km und einen $\sim 1100\text{m}$ hohen Zentralberg (Mouginis-Mark, 2012: S.1615, 1616, 1619). Das umliegende Terrain und das junge Alter des Kraters, macht exakte Tiefenmessungen möglich (ebd. S.1616). so liegt der Kraterboden der südlichen Kraterhälfte $\sim 1275\text{m}$ unter dem umliegenden Terrain und der nördliche Kraterboden auf $\sim 1080\text{m}$ (siehe Abb.1)(Mouginis-Mark, 2015: S.1).

Der Zentralberg des Tooting-Kraters liegt 119m unterhalb der Kraterumgebung und 768m unterhalb der durchschnittlichen Randkamms des Kraters (ebd.). Der Tooting-Krater zeichnet sich durch mehrere sekundäre Bergspitzen aus. Die zentrale Spitze erreicht eine Höhe von 1110m über dem Kraterboden (ebd.), Die Sekundären Spitzen 149m und 147m unterhalb dieser (Mouginis-Mark, 2012: S.1619).

2.2 Entstehung

Der Prozess der Kraterbildung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Das Ergebnis der Kontakt und Kompressionsphase, sowie der Aushölungsphase ist eine konkave, transiente Kraterform. Das Ausmaß der dritten Phase, der Modifikationsphase, ist für uns interessant und von der Größe des Kraters abhängig. Die instabile Kraterform führt bei kleineren Kratern dazu, dass die Kraterrände hinabfallendes Gestein die Form des Kraters abflacht. Bei größeren Kratern entsteht eine zentrale Erhebungen durch sich hebendes Gestein (Rae, 2018: S.10). Solche Krater werden als komplexe Krater bezeichnet und besitzen abgesehen von Zentralbergen oder Zentralringen häufig auch weitläufige terrassenförmige Zonen am Kraterrand, die hier nicht weiter behandelt werden sollen (ebd.).

Der Kraterradius, ab dem ein Zentralberg zu finden ist, wird größtenteils von der Größe des Himmelskörpers definiert. So beträgt der minimale Radius auf dem Mond ~ 15 km, auf Mars und Merkur etwa 7 km und auf der Erde $\sim 2-4$ km, abhängig von vorhandenen Gesteinsarten (ebd. S.12).

2.3 Zentralringe

In besonders großen Kratern wird der Zentralberg zu hoch, um stabil zu bleiben und kollabiert zu einem Zentralring (Rae, 2018: S.115). Diese ringförmigen Reliefs existieren sowohl auf anderen Himmelskörpern aus auch auf der Erde. Der Chicxulub-Krater auf der Yucatán-Halbinsel in Mexico besitzt einen Durchmesser von etwa 180 km und einen 400 m hohen Zentralring (Rae, 2018: S.100). Der $\sim 65,5$ Millionen Jahre alte Krater entstand durch den Asteroiden, welcher das Massenaussterbens am Ende der Kreidezeit verursachte und unter Anderem zum Aussterben der Dinosaurier führte (Schulte, 2010: S.1214).

Der instabile Zentralberg hat nach Berechnungen seine maximale Höhe nach ~ 200 s erreicht und kollabierte dann zu dem heutigen Zentralring mit 80-90 km Durchmesser (Rae, 2018: S.100, 113). Dessen Gestein findet sich nur zwischen 30 und 45 km entfernt von der Kratermitte (ebd. S.113). Auch beweist die Existenz von kristallinen Quarzstrukturen im Zentralring ein Anheben dieses Gesteins während der Modifikationsphase von mehr als 2 km (ebd. S.102 f.).

3 Äquatorialkämme

3.1 Iapetus einzigartiges Gebirge

Eines der mysteriösesten Objekte im Sonnensystem ist der Äquatorialkamm des Saturnmondes Iapetus (siehe Abb.2). Auf Bildern der 2004 am Iapetus vorbeigeflogene Cassini-Sonde ist ein Gebirgsring am Äquator des Mondes




Abbildung 2: Aufnahmen der Saturnmondes Iapetus; Entnommen aus Porco (2005: S.1240)

zu sehen (Porco, 2005: S.1237). Dieser bis zu 20 km hohe Äquatorialring (ebd. S.1241) erstreckt sich nicht durchgehend über mindestens 75% des Umfangs von Iapetus (Dombard, 2008).

Der Gebirgsring ist zusammen mit der Cassini-Region (siehe Kapitel ??) eines der ältesten Merkmale des Iapetus (Giese, 2008: S.postnote). Da er in manchen Regionen aus drei parallel verlaufenden Berggraten besteht (Porco, 2005: S.1242), gibt es viel Diskurs zu seiner Entstehung.

3.2 Entstehungstheorien

Seit der Entdeckung des Äquatorialkamms von Iapetus wurden verschiedene Theorien zu seiner Entstehung aufgestellt.

3.2.1 theorie cassini region

4 Vulkane

Abbildungsverzeichnis

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Links: Topografisches Profil des Tooting-Krater, das durch den höchsten Punkt des Zentralbergs verläuft. Die vertikale Maßstabsverzerrung beträgt $\times 10$. Entnommen aus Mougini-Mark (2012: S.1619).
Rechts: Foto des Tooting-Kraters. Ausschnitt von der Aufnahme der THEMIS-Mission der NASA. aufgerufen am 29.08.2026.
https://themis.mars.asu.edu/files/features/043_tooting_crater/043tooting.png | 1 |
| 2 | Aufnahmen der Saturnmonde Iapetus; Entnommen aus Porco (2005: S.1240) | 3 |

Literaturverzeichnis

- Dombard, A. / Andrew Cheng (März 2008). Constraints on the Evolution of Iapetus from Simulations of Its Ridge and Bulge.
- Giese, Bernd / Tilmann Denk / Gerhard Neukum / et al. (2008). The topography of Iapetus' leading side. In: *Icarus* 193, S. 359–371.
- Mougini-Mark, Peter J. (2015). Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. Techn. Ber. Pamphlet to accompany the Geologic Map of Tooting Crater, Amazonis Planitia Region of Mars. U.S. Geological Survey.
- Mougini-Mark, Peter J. / Joseph M. Boyce (2012). Tooting crater: Geology and geomorphology of the archetype large, fresh, impact crater on Mars. In: *Meteoritics and Planetary Science* 42.9, S. 1615–1625.
- Porco, C. C. / E. Baker / J. Barbara / et al. (2005). Cassini Imaging Science: Initial Results on Phoebe and Iapetus. In: *Science* 307.5713, S. 1237–1242.
- Rae, Auriol Stephen Prenter (2018). *The kinematics and dynamics of complex crater collapse*. Diss. Imperial College London.
- Schulte, Peter / Laia Alegret / Ignacio Arenillas / et al. (2010). The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary. In: *Science* 327.5970, S. 1214–1218.



Erklärung des Verfassers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken oder dem Internet entnommen wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht habe.

Verfasser: Julian Luke Mawill Baden

Ort und Datum

handschriftliche Unterschrift