


右房: 1. 分部 右房内壁与翻转开来的内壁 有梳状肌围成空间 固有心脏 腔V室 界限: 界沟

2. 结构 外部: 心耳 前变是受向左侧与房相通
心耳 内腔与心房是相通的

平行排列的结构叫梳状肌
主动脉隆突是什么结构 主动脉根部形成三个结构
朝北方正好是后尖
卵圆窝是卵圆孔闭孔后形成的遗迹
入口 上腔静脉口、下腔静脉口、冠状窦口
出口 右房室口。

右室: 最靠前的心脏 胸骨左缘第四肋切迹推药进右心室。



前室间沟的右侧→右心室

以室上沟为界分为两部分

结构。

心室的室壁上有很多纵横交错的肌隆起

突起像乳头状结构叫乳头肌。乳头肌上有很多纤维索状结构。称为腱索

腱索的另一端到瓣膜的游离缘:

舒张



收缩的时候, 乳头肌腱索向下拉, 瓣膜张开, 血液由心房流向心室。

收缩 腱索

右三、三个瓣膜对应 前乳头肌 隔侧 后

隔缘肉柱 隔侧反 节制索

防止心室过度扩张



左房. 入口: 二对肺V. 出口(左房室口)

左室. 分部

流入道. 前尖瓣
流出道

结构: 肉柱

乳头肌

腱索

入口: 二尖瓣 前尖


后尖

出口: 三个主动脉瓣


左右后瓣





房中隔与室中隔



静脉 冠状窦开口: 冠状窦口 右房 心脏本身的静脉血通过此口进入右房。



下纵隔借助于心包又分为前、中、后三个纵隔。



心脏位于中纵隔内 略偏左
后纵隔内一个是食管，一个是胸主动脉


前1-6肋软骨

后5-8胸椎

侧：肺和胸膜腔

心脏上方 出入心脏大血管
下方 膈

侧直的肌体形
中通外直的器官
肌性



二、形态 (一尖一底两面三缘四沟)

心尖，左前下，圆钝不连其他的东西。


心脏靠大血管吊起来，心脏联压肋间肌 搏动

心尖搏动点在锁骨中线内侧1-2cm。

心底，右后上方 底与尖的朝向相对 斜行轴

右房。


从左侧面看心脏




上下缘水平
左缘倾斜

四沟
冠状沟
前后室间沟
房室沟

三、心腔的结构



扫描全能王 创建





全身横脉止血 头颈部

耳屏前上方 颞浅A

咬肌前缘与下颌骨前缘交界 面动脉

胸锁乳突肌前缘中点 颈总A

锁骨中点上方的锁骨上窝处将该动脉压向后下方第一肋、锁骨下动脉



上肢

肱动脉 前臂和手部出血时,可在臂中部将肱动脉压向肱骨以暂时止血

腕部 尺、桡A

桡神经 拇指下方三角区

股神经 → 股V

下肢

腹股沟韧带中点下方 股动脉

胭窝, 动脉搏动

足


内外踝前中点连线 足背

内踝后方 足底





体循环组成 上腔 V S
下腔 V S
心 V S

上腔 收纳 头颈、上肢、胸部
合成 左右头臂 V
属支 颈静脉 (注入到上腔静脉后壁)



奇静脉




- ① 颈内静脉 面、舌、咽、甲状腺上、中 V
- ② 颈外静脉 在颈血管鞘内，与动脉伴行

△ 静脉角，颈内静脉和锁骨下静脉形成的夹角

全身淋巴液通过两个静脉导管汇入静脉角


第一肝门，三条肝静脉在腔静脉窝汇入腔静脉



胸部静脉 奇 V 半奇 V 副奇 V

下腔静脉系 合成 第四、五腰椎之间由髂总静脉合成
位置 下端 腔静脉裂孔 在脊柱左前方
属支 壁支 膈下 V、髂腰 V
脏支 成对 肾上、中、下 V (左右不一，左汇入下腔，右汇入肾 V)

肠系膜上静脉



不成对 腹腔、肠系膜下 V 肝静脉 △ 肝门静脉

左侧门静脉容易静脉曲张，因为回流阻力比较大

※ 肝门静脉系特点 1. 起端与止端都是毛细血管 (流 V 慢) 4.

2. 血液可逆流，无静脉瓣

3. 属支 肠系膜上 V、脾 V

合成 ① 胃左 → 食管 → 奇 V → 上腔


② 错了，见后

4. 门静脉吻合途径



扫描全能王 创建

静脉系统回流系



- 肝硬化.
- 门脉高压第一个症状
1. 脾大 (脾大可以挤到脾)
 2. 但下小腹痛 (腹痛难消下. 腹水)
 3. 血入胃左. 食管静脉曲张血液了
食管静脉曲张
吃粗糙食物易划破
静脉曲张
→ 呕血. 便血
 4. 腹壁静脉曲张. 海蛇头.

直肠静脉曲张.

② 肝门 → 脾 → 直肠系膜下 → 直肠上 & 直肠下
→ 肾内 → 肾总 → 下腔

③ 肝 → 肝脾 → 脐周V网 → 上行

→ 胸腹壁浅V → 股V → 肾下

→ 头臂V → 上腔.

2'. 下行 → 腹壁浅V → 大隐静脉 → 股V →

深 → 肾外

↓
肾总

↓
下腔.



静脉辅助回流系
 淋巴系统 淋巴管道
 淋巴组织
 淋巴器官

淋巴液生成与回流

大分子的,不能经过毛细血管壁
 到静脉血中回收的,走淋巴途径
 回收. (大分子物质进入毛细淋巴管,就变成淋巴液了.)
 淋巴系是静脉血回流的辅助路.

淋巴管道分级
 一级 毛细淋巴管
 二级 淋巴管
 三级 淋巴干 (9条)
 ※ 四级 淋巴导管 (2条)

→ 数量庞大 多
 ↓
 少

淋巴导管 左淋巴导管 (胸导管) ① 起始 L₁ 前方的乳糜池

第腰椎水平 梭形的膨大. 乳糜池

穿过主动脉裂孔上升至第五腰椎水平

斜行向左穿过食管和脊柱之间的缝隙 跨过主动脉
 最终注入左颈三角.
 静脉

② 接收的淋巴干 1° 起始. 左右腰干和一个肠干

大部分淋巴液由胸导管汇入静脉

2° 终止部
 颈干
 锁骨下干 (左侧)
 支气管纵隔干

右淋巴导管 (1cm 短干) ← 右侧

淋巴器官 包括有 1. 淋巴结 2. 胸腺 3. 扁桃体. 4. 脾 (max)

脾: 左季肋区 9-11肋间 长轴与10肋平行

脾在肋弓内

正常人在肋弓下角触及不到脾




肝、脾 质软而脆, 暴力下易破裂

上下叫端, 前后叫缘 外侧和内侧叫面

前缘有两到三个脾切迹 (病态肋弓下可以摸到脾)

内侧有脾门 脾切迹和脾门

神经、淋巴出入



内足踝前方: 大隐静脉
后方 胫后静脉
外足踝后: 小隐静脉

颈内静脉 = 腹肌淋巴结是鼻咽癌常见转移淋巴结。

颈外侧下淋巴结 — 锁骨上淋巴结 — 斜角肌淋巴结 — Virchow 淋巴结

骨内淋巴结
骨外淋巴结
骨内淋巴结 → 骨总淋巴结 → 腰淋巴结 → 左、右腰干
骨外淋巴结

淋巴管分为深、浅淋巴管。浅淋巴与浅静脉伴行。深淋巴多与血管神经伴行。

脾在胚胎早期有造血功能。出生后^变化为淋巴器官。但仍有造血功能。

骨

子宫底、上部
卵巢血管上行 → 卵巢
子宫圆韧带穿腹股沟管 → 腹股沟浅淋巴
子宫血管行两侧
子宫下部
骨内、外
子宫主韧带
沿闭孔血管排列的闭孔淋巴结
骨盆韧带
骨盆淋巴

九条淋巴干

颈干 — 颈外侧^加深淋巴干的输出淋巴管构成
收集同侧头颈部浅、深淋巴管和胸壁上部的浅淋巴管

锁骨下干 — 腋窝淋巴结

同侧上肢、及部分胸壁的浅深。

支气管 — 气管旁淋巴结和纵隔前淋巴结。

同侧胸腔器官和部分胸壁

腰淋巴结 — 腹后壁、腹腔内成对脏器的

肠干 — 腹腔淋巴结、肠系膜上、下淋巴结。

不成对

