

9.一名放学后在狗舍工作的青少年已经有 2 年的皮肤红肿、嗜酸性粒细胞增多、肝脏和脾脏肿大。
以下哪项是最可能导致这种感染的原因？

- A. 蓝氏贾第鞭毛虫病
- b. 弓形体病
- c. 旋毛虫病
- d. 囊虫病

- e. 内脏幼虫移行症

16.心肌病是以下并发症之一:

- A. 美洲锥虫病
- b. 黑水热
- c. 黑热病
- d. 肠外阿米巴病

- e. 皮肤黑热病

22.当被游离铁或血红素结合铁激活时，它会形成一种以碳为中心的红色自由基化合物，能够使 PfATP6 和血红素等多种 prote 蛋白烷基化。

- A, 氯喹
- B, 奎宁
- C, 磺胺嘧啶
- D, 甲氧苄啶
- E, 青蒿素

27.下列哪种感染与恶性肿瘤相似

- A. 单眼包虫病
- b. 多房包虫病
- c. 血吸虫肉芽肿
- d. 裂头蚴病
- e. 旋毛虫病

33.蛔虫病的原因:

- a. 阑尾炎。
- b. 肠梗阻
- c. 出血性胰腺炎
- d. 肠套叠
- e. 以上所有

39.纳皮尔醛试验是一种血清学检查

- a. 黑热病。
- b. 东方痛
- c. 恰加斯病
- d. 皮肤利什曼病
- e. 非洲昏睡病

40.它是治疗盘尾丝虫病的禁忌症，因为它会引起与微丝虫破坏有关的严重反应。

- A. 哌嗪
- B, 吡喹酮
- C、乙胺嗪(12 月)
- D, 伊维菌素
- E, 酒石酸锑钾

43.除()外，均为细胞内寄生虫

- a. 利什曼虫 donovani
- b. 刚地弓形虫
- c. 间日疟原虫
- d. Cryptosporium 以及
- e. 以上皆非

55.在慢性感染过程中形成，在囊肿中缓慢繁殖的寄生虫称为-

- a. 速殖子
- b. 裂殖子
- c. Phanerozoites
- d. 潜隐体
- e. 裂殖子

71.人兽共患寄生虫病中的家畜或野生动物，在流行病学上是该种人体寄生虫的：()

- A. 终宿主
- B. intermediate host
- C. reservoir host
- D. 转续宿主
- E. 以上都不是

79.下列虫种，哪个进入体后，先在肺部停留并发育，然后才到正常寄生部位寄生：

- A. 猪肉绦虫
- B. 华支睾吸虫
- C. 蛔虫 lumbricoides

- D. 蛲虫
- E. 膜壳绦虫属娜娜

86. “伴随免疫” 表现为

- A. 蛲虫
- b. 班氏丝虫
- c. 与象皮病马来
- d. 钩虫属 duodenale
- e. 血吸虫 japomicum

116.抗疟活性可能是由于醌类药物的代谢产物干扰了泛醌作为呼吸链电子载体的功能。

- A.氯喹
- B,青蒿素
- C,奎宁
- D,伯氨喹
- E,乙嘧啶

128.在-中可见有 IgM 沉积的桑椹胚细胞

- a.黑热病。
- b. 昏睡病
- c. 古典丝虫病
- d. 弓形体病
- e. Neurocysticercosis

139.选择关于麦地那龙线虫的错误陈述

- a.它在圣经中被称为“火蛇”
- b.雌性蠕虫从水疱中伸出来产卵
- c.世卫组织根除清单中提到的下一种寄生虫病
- d.蠕虫的自然栖息地是人类的皮下组织
- e.以上皆非

161.痰液检查对以下症状的诊断有一定的指导意义

- a.鞭虫。trichura
- b. 钩虫属 duodenale
- c. Paragonimus westermani
- d. 类圆线虫属 stercoralis
- e.以上皆非

170.胼胝体肿胀是-i 型便秘的临床特征

- a.钩蚘性皮炎
- b. 罗阿丝虫
- c. Angiostrongylous cantonensis
- d. 血吸虫肉芽肿
- e. 致盲丝虫的

191.微丝虫中曼森'的中心体从

- a. G1 细胞后 V 点
- b. G1 细胞前 V 点
- c.排泄孔至 G4 细胞
- d. G4 细胞的神经环
- e.以上皆非

205.下列蠕虫中不属于线虫的是()

- A.旋毛虫 spirilis
- B. 鞭虫 trichiura
- C. 蛲虫
- D. 蛔虫
- E. 斯氏狸殖吸虫

232.寄生虫通常引起肺嗜酸性粒细胞综合征

- A. 旋毛虫
- b. 毛首鞭形线虫
- c. 钩蠕虫
- d. 鞭虫
- e. 丝虫属丝虫

233.皮肤幼虫的迁移是由于幼虫的

- A 蛲虫
- b. 旋毛虫
- c. 微丝蚴丝虫
- d. 美洲钩虫
- e. 犬弓蛔虫

239.蠕变喷发是由钩虫引起的

- A.杆状蚴。
- b. 丝状蚴

- c。蛋
- d。成人蠕虫
- e.有幼虫的中间宿主

275. “神秘丝虫病”是-的同义词

A.游走性幼虫病。

- b。河盲症
- c.热带肺嗜酸性细胞
- d。古典丝虫病

E.皮肤对蛔虫病的诱惑

286.下列蠕虫不属于线虫纲的是

- A. 蛲虫
- B。班氏丝虫
- C。Trichinella spiralis
- D。蛔虫

- E。斯氏狸殖吸虫

289.昏睡病中的 Wintern 底征是指-

- a.颈后淋巴结清扫术
- b。嗜睡症
- c。单边结膜炎
- d。瞬态红斑
- e。Cancum 口的

292.检测圆线虫幼虫的最佳方法是下面哪个选项?

- A.Baermann 技术
- b.酶免疫测定
- C.NIH 拭子样本
- d.稀释后的鸡蛋数
- e.乙状结肠镜检查及粘膜病变活检

299.在印度南部最常见的丝虫病感染是

- A.班氏丝虫。
- b。马来丝虫
- C。罗阿丝虫
- d。盘尾属 vulvulus

e。Mansonella ozzardi

308.肠套叠是肠套叠的一个特征性临床特征，是由哪些寄生虫感染引起的?

- A.钩虫病。
- B 牛肉带虫感染
- c。鞭虫病
- d。蛲虫病
- e。蛔虫病

328.除-外，所有病毒均经粪口途径传播

- A.蛔虫病
- b。贾第虫病
- c。小袋虫病
- d。类圆线虫病
- e。蛲虫病

362.麦地那龙线虫生命周期中的中间宿主为-

- A.人。
- b。克雷鱼
- c。剑水蚤
- d。老鼠跳蚤
- D.雌性按蚊

366.

儿童慢性痢疾、腹痛和直肠脱垂是由-引起的一个销蠕虫。

- b。Trichinella 蠕虫
- c。鞭虫
- d。轮虫
- e。麦地那龙线虫

385.

胼胝体肿胀是-i 型便秘的临床特征一个地面痒。

- b。贷款贷款

- c. Angiostrongylous cantonensis
- d. 血吸虫肉芽肿
- e. 致盲丝虫属

392.

以下哪一种是胎生的:

- 一。类圆线虫属 stercoralis
- b. 旋毛虫
- c. Enterobius vermicularis
- d. Sparganum 曼
- e. 以上皆非

393.

徒手侧凸是-的特征

- 一。棘球绦虫 granulosus
- b. 有钩绦虫
- c. 膜壳绦虫属 diminuta
- d. 猪 saginata
- e. 膜壳绦虫属娜娜

426.

以下关于囊虫病的描述是正确的，除了-
最常见的部位是脑膜和脑室

- b. 钙化很常见
- c. 引起局灶性神经并发症
- d. 发现于皮下组织
- e. 见于人类和中间宿主

433.

下列感染与恶性肿瘤相似

- 单眼包虫病
- b. 多房包虫病
- c. 血吸虫肉芽肿
- d. 人类 裂头蚴病

e. 旋毛虫病

438. 卡索尼氏试验是为了诊断-
钩虫感染

- b. 脑囊尾蚴病
- c. 丝虫的感染
- d. 血吸虫病
- e. 包虫病

451. 哪种寄生虫会产生有盖卵?

- A. 牛带绦虫
- b. 膜壳绦虫属
- c. 类圆线虫属 stercoralis
- d. 鞭虫
- e. 所 mansonii

454.

哪一种寄生虫卵不会漂浮在饱和盐溶液中

- a. 钩蠕虫。
- b. 鞭虫
- 猪肉磁带虫
- 圆虫受精卵

- e. 蛲虫

459. 哪一种寄生虫的卵由极性丝组成

- a. 猪肉绦虫
- b. 阔节裂头绦虫
- c. 棘球绦虫 granulosus
- d. 膜壳绦虫属娜娜
- e. 日本血吸虫

502. 侏儒绦虫是指-

- a. 棘球绦虫 multilocularis
- b. 猪肉绦虫
- c. 缩小膜壳绦虫

- d. 微小膜壳绦虫
- e. 曼氏迭宫绦虫

533.下列蠕虫中属于绦虫的是()

- a 棘球绦虫 granulosus
- B. Eentamoeba 阿米巴
- C. 日本血吸虫
- D. 班氏丝虫
- E. 卫氏并殖吸虫

577.囊虫病最常见的感染组织是-

- a.大脑。
- b. 眼
- c. 肌肉
- d. 肝
- e. 肠

623.是幼虫的名字

- a.钩球蚴
- b. 原尾蚴
- c. 钩球蚴
- d. 全尾蚴
- e.自由游泳

705.胆管癌是由-引起的

- a.Paragonimus westermani
- b. 日本血吸虫
- c. 华支睾吸虫
- d. Fasciolopsis buskii
- e. 肝片吸虫

759.哪种寄生卵在土壤中不发育

- a. 十二指肠钩虫病
- b. 猪带绦虫
- c. 蛔虫
- d. 鞭 trichura
- e. Necator 也

784.日本血吸虫居其中

- a.膀胱静脉丛
- b. 体循环
- c. 胆囊
- d. 脾静脉
- e. 肝脏

792.选择正确语句:

牛囊尾蚴可见于人类宿主。

日本血吸虫在肝脏中成熟。

c.华支睾吸虫 mir 酸化将有一个自由的游泳生活。

d.微丝菌的寿命约为 7 天。

日本血吸虫有两代重谱

838.

在-中可见妇科管

- a.女性血吸虫
- b. 男性血吸虫
- c. 血吸虫尾蚴
- d.班氏小丝虫
- e.以上皆非

849.血吸虫尾蚴具有最大的自由游动寿命

- a.70 天。
- b. 70 小时
- c. 30 天
- d. 3 个小时
- e.以上皆非

866.下列蠕虫中属于吸虫的是()

- a.ncylostoma duodenale
- B. 布氏姜片虫
- C. 猪带绦虫
- D. 膜壳绦虫属娜娜

E。Necator 也

894.Fairley 的测试是在-中完成的

a.Bancroftian 丝虫病

b。Cysticersosis

c。真皮 leishmanoid

d。黑热病

e。膀胱血吸虫病

897.生鱼可能会伤及以下哪一项，影响肝脏，并有覆卵?

a. 华支睾吸虫

b。Paragonimus westeroni

c。日本血吸虫

d。曼氏裂体吸虫

- e。微小膜壳绦虫

907.

黏液管干性肝硬化是肝硬化的主要病理特征

- a. 日本裂体吸虫病

b。肝阿米巴病

c。支睾吸虫病

d。血吸虫病

e.肝包虫病

975.

其中也被称为" Assassin bugs "

a.臭虫。

b。Reduvid 错误

c。人虱

d。阴虱

- e。印鼠客蚤

980.疥疮的实验室诊断最好采用以下方法:

a.粪便检查。

b。血清学

c。血液检查

d。皮肤刮

e。直肠活检

984.哪些蚊子被称为虎蚊

a.按蚊

b。库蚊

c。伊蚊

d。曼蚊属

e.以上皆非

1037.人类跳蚤就是其中之一

- a. 印鼠客蚤

b。虱 humanus

c。阴虱

- d。疥螨

- e。致痒蚤

1043.

发现疟疾传播的科学家

a.Laveran

b。保罗•穆勒

c。罗纳德•罗斯

d。高尔基

e。Romanowsky

1049.脂质体是传播-的载体

a.鲁兹锥体。

b。马来丝虫属

c.非洲眼虫

d。班氏丝虫的

e。致盲丝虫属

1102.无翅昆虫

人虱

b。舌蝇 palpalis

c。Reduvid 错误

d。Phlebotomus argentipus

e。黑色的飞

1131.哪种疾病是由螨虫传播的

a.巴贝西虫病

b。虱病

- c。蝇蛆病

d。恰加斯病

e。疥疮

1155.对人致病力较强的两种阿米巴原虫是()

a.溶组织性内阿米巴&肠内阿米巴

B。溶组织性内阿米巴和大肠杆菌

C。溶组织性内阿米巴&福尔莱里

D。内溶阿米巴和内溶性娜娜

- 溶组织性 *ntamoeba* & 脆双核阿米巴

1159.一个喜欢吃生汉堡的屠夫得了脉络膜视网膜炎。

萨宾-费尔德曼染色试验呈阳性。

最可能的感染原因是

a.贾第虫病

b。旋毛虫病

c。血吸虫病

d。弓形体病

e。黑热病

- 1160. “果酱色脓”形成于

a.肠阿米巴脓肿

b。脑型疟疾

阿米巴性肝脓肿

d。发冷的疟疾

e。神经囊虫病

1161.导致十二指肠炎症的寄生虫是:

a.痢疾杆菌

b。肠袋虫属杆菌

c。痢疾阿米巴

d。兰伯氏贾第虫

e。等孢子球虫属瑞塔

1162.从体外红细胞分裂中释放出来的分生子称为

a.Phanerozoites

b。棒状体

c。裂殖子

- d。速殖子

e。潜隐体

1167.引起原发性阿米巴脑膜脑炎的病原体

a.福氏耐格里阿米巴

B。痢疾阿米巴

C。齿龈内阿米巴

D。非致病性阿米巴

ndolimax 娜娜

1168.

疟疾发作(阵发性)是由以下原因引起的:

从红细胞中释放毒素

红细胞被分生子侵入

严重溶血性贫血

d.以上所有

e. a 和 c

1170.

滋养体的“Accoli”形式见于

一个恶性疟原虫。

b。疟原虫那

c。malariae

d。间日疟原虫

e.以上皆非

1173.下列原虫中属于孢子虫的有()

canthamoeba culbertsoni

B。兰伯氏贾第虫

C。刚地弓形虫

D。华支睾吸虫

ntamoeba 阿米巴

1176.

哪些物种的分裂前期红细胞减少

一个间日疟原虫。

b。恶性疟原虫

c。malariae

d。疟原虫那

e。鼠

1177.十二指肠引流检查法用于诊断

一个。

阴道毛滴虫

B。

痢疾阿米巴

C。

兰伯氏贾第虫

D。

痢疾杆菌

E。

毛滴虫 hominis

1181.

红细胞中齐曼点的存在是-的特征特征

感染

疟原虫。那

b。恶性疟原虫

c。malariae

d。间日疟原虫

e.以上所有

1188.能引起阿米巴痢疾样症状的寄生虫是()

scaris 蛔虫

B。

Enterobius vermicularis

C。

肠袋虫属杆菌

D.Paragonimus

E.Plasmodium

1189.

选择错误:

弓形虫:孢子虫

Naegleria fowlweri:根足类

隐孢子虫:球虫

d.人类毛滴虫:端孢子虫

疟原虫:球虫

1196.

隐孢子虫繁殖:

小肠的管腔

小肠上皮衬里的刷状边缘

大肠的腔

网状内皮细胞

呼吸粘膜细胞

1199.

凤尾鱼酱“脓”是形成

a.肠阿米巴脓肿

b。脑型疟疾

阿米巴性肝脓肿

- d. 发冷的疟疾
- e. 神经囊虫病

1212.
所有结构均存在于溶虫内阿米巴滋养体中除了-----
一个糖原的质量。

- b. Chromatoid 酒吧
- c. 偏心核
- d. 染色体
- e. 入口孔

1227.
选择错误:
弓形虫:孢子虫
Naegleria fowleri:根足类
隐孢子虫:球虫
d.人类毛滴虫:端孢子虫
疟原虫:球虫

1253.
哪一种不是病媒天生的
一。弓形体病
黑热病。
c. 丝虫病
d. 恰加斯病
e.非洲昏睡病

1262.
蝴蝶红斑出现在
a.非洲昏睡病
b. 东方痛

- c. 真皮 Leishmanoid
- d. 恰加斯病
- 片山 e. 疾病

1271.
肠道和肠外生命周期是其特征特征
一个杜氏利什曼虫。
b. 刚地弓形虫
c. 隐孢子虫
d. Pneumocystis 囊虫
e. 肠袋虫属杆菌

1289.
染色的血液涂片显示巨大的血小板和许多网状细胞，其中含有舒夫纳氏点、大的环状结构和分裂子，有 12 至 24 个分生子。
你可以把它命名为
一个间日疟原虫。
b. malariae
c. 恶性疟原虫
d. 疟原虫那
e. 巴贝西虫 spp

1293.
可见带状滋养体
疟原虫。那
b. malariae
c. 间日疟原虫
d. 恶性疟原虫
e. 疟原虫 knovei

1296.
阴道毛滴虫感染:
是由原生动物鞭毛虫引起的

- 感染期为滋养体
- 引起女性阴道分泌物
- d.可能感染男性
- e.以上所有

1312.
cruzi 锥虫的元环形式见于:
一个网状内皮细胞。

- b。心脏肌肉
- c.昆虫媒介口部
- d.受感染昆虫的后肠
- e.以上皆非

1324.
选择关于利什曼病的真实陈述:
Amastigotes 只在 RBC 内部发育
骨髓涂片原乳头状细胞形态是黑热病的诊断依据

- c。L。
- tropica 和 L。
- donovani 在形态学上是可以区分的
- 醛检阳性是由于血清中白蛋白过高所致
- 黑热病存在于印度东部

1329.
腹痛，脂肪吸收不良和泡沫大便提示-
肠道阿米巴病。
b.肠外阿米巴病
c。菌痢
d。急性贾第虫病
片山 e。疾病

1335.
阿米巴性肝脓肿可通过示-来诊断
a.无菌脓中的囊肿

- b.脓液中的滋养体
- c.肠内囊肿
- d.粪便中的滋养体
- e.以上所有

1345.经治疗后宿主可获得终身免疫的寄生虫感染是
A.Malaria
B。
阿米巴肝脓肿
C。
内脏利什曼病
D.Giardiasis
E.Trichomonas

1347.1。
-中不存在囊肿期
一。痢疾阿米巴
b。痢疾杆菌
c。鞭毛虫 intestinalis
d。Trichomona 鞘突
e。刚地弓形虫

1356.
隐形眼镜受污染可引致下列眼睛感染:
多食棘阿米巴巨型。
b。痢疾杆菌
c。盘尾属 valvulus
d。犬弓蛔虫
e。贷款贷款

1365.
疟疾疟原虫肾病综合征的病因是:
免疫复合物在肾小球毛细血管中的沉积
b.严重贫血

- c.低蛋白
- d.释放疟疾色素
- e.以上所有

1369.痢疾是

- A.一种寄生人体的条件致病内阿米巴
- B.一种非致病的人体内阿米巴
- C.与溶组织内阿米巴有同等致病力的内阿米巴种
- D.一种致病的尚未确定的内阿米巴种
- E.一种目前尚无法认定的阿米巴种

1372.

粘膜利什曼病是由-引起的

- 一。利什曼虫 *braziliensis*
- b。利什曼虫 *tropica*
- c。杜氏利什曼虫
- d. a 和 b
- e.以上皆非

1374.10 岁男童出现慢性腹痛、低烧、间歇性腹泻、吸收不良和卵囊，腹泻症状持续两年多。

他拉肚子的原因很可能是

- 一。痢疾阿米巴
- b。肠袋虫属杆菌
- c。兰伯氏贾第虫
- d。卡氏肺孢子虫
- e。Cryptosporium 以及

1394.

以下阿米巴原虫都生活在大肠中，除了-

- 一。痢疾杆菌
- b。内阿米巴科娜娜
- c。痢疾 *gingivalis*
- d。Iodamoeba buschii
- e。痢疾阿米巴

1404.

选择关于人类弓形虫病的真实陈述:

- a.在免疫功能受损的患者中变得活跃
- 急性感染可由母亲传染给胎儿
- 主要通过血清学检查诊断
- d.通过摄入未煮熟的肉类中的囊肿而传播
- e.以上所有

1428.

cruzi 锥虫的元环形式见于:

- 一个网状内皮细胞。
- b。心脏肌肉
- c.昆虫媒介口部
- d.受感染昆虫的后肠
- e.以上皆非

1431.

阿米巴变形虫，在形态学上与内阿米巴更接近变形虫是

- 一。痢疾 *dispar*
- b。痢疾杆菌
- c。双核内变形虫属 *fragilis*
- d。痢疾 *gingivalis*
- e。Iodamoeba buskii

1434.

在卡拉-阿扎尔没有

一个脑积水。

- b .血小板减少症
- c.红细胞溶血

d。Leucopenia

e。贫血

1459.可引起肝脓肿的原虫

一个。

间日疟原虫

B。

杜氏利什曼虫

C。

刚地弓形虫

D。

兰伯氏贾第虫

ntamoeba 阿米巴

1462.

摘要一位 24 岁的脑脊膜脑炎病人，其脑脊液在潮湿的悬浮液上显示出可运动的单细胞微生物。

最有可能的原因是

一。Acanthamoeba 卡斯特拉尼

b。痢疾阿米巴

c。Naegleria fowleri

d。鲁兹锥体

e.以上皆非

1463.

阿米巴性肝脓肿可以用-来诊断

a.无菌脓液中的囊肿

b.脓液中的滋养体

c.肠内囊肿

d.粪便中的滋养体

e.以上所有

1472.虫体有两个核和一个吸器的原虫是

一个。

双核内变形虫属 fragilis

B。

Iodamoeba butschlii

C。

兰伯氏贾第虫

D。

肠袋虫属杆菌

ndolimax 娜娜

1474.

其中哪一种不被认为是艾滋病的机会性寄生虫

一。卡氏肺孢子虫

b。刚地弓形虫

c。阴道毛滴虫

小球隐孢子虫 d。

e.以上皆非

1475.

环状出血是-的特征性特征

一个 Cerbral 疟疾。

b。发冷的疟疾

c。败血病的疟疾

脑囊尾蚴病 d。

e。肝阿米巴病

1489.

哪种染色方法不用于 bloo d 涂片中的疟原虫

一款全新的染色

b。。

B 的染色

c。字段的染色

d。染色的染色

e。艾伯特的染色

1496.下列哪种原虫不是寄生在细胞内：()

一个。

malariae

B。

卡氏肺孢子虫

C。

杜氏利什曼虫

D。

阴道毛滴虫

E。

刚地弓形虫

1506.

刚地弓形虫通过以下途径传播给人类:

摄入猫卵囊污染的土壤

母亲先天性传播急性弓形虫病

c.器官移植及输血(受感染供体)

在未煮熟的肉类中摄取囊肿

e.以上所有

1508.

疟疾发作(阵发性)是由以下原因引起的:

从红细胞中释放毒素

红细胞被分生子侵入

严重溶血性贫血

d.肝实质破坏

e.以上所有

1514.

哪种原动物感染不是通过受污染的水传播的

一。隐孢子虫病

b。阿米巴病

c。卡式肺囊虫肺炎

d。帕姆

e。小袋虫病

1518.

其中哪一种不被认为是艾滋病的机会性寄生虫

一。肺孢子菌

b。刚地弓形虫

c。阴道毛滴虫

小球隐孢子虫 d。

e.以上皆非

1527.

以下是恶性疟的一个特征

血液中出现分裂的所有阶段

b.红细胞多重感染

c.寄生红细胞体积增大

d.感染中出现的复发

红细胞周期在 72 小时内完成

1532.

棘阿米巴角膜炎是由

一。a . culbertsoni

b。A.castellanii

c。a .多食目

d。A.hatchetti

e。a . rhysodes

1540.机会致病原虫

A.Plasmodium

B.Leishmania

C.Naegleria

D.Acanthamoeba

E.Toxoplasma

1543.

血液涂片中成熟滋养体和幼裂殖体呈条带形成的不稳定趋势，红细胞未见扩大。
一个间日疟原虫。

b。恶性疟原虫

c。malariae

d。疟原虫那

e。疟原虫诺氏疟原虫

1555.

NNN 培养基用于培养

一。痢疾阿米巴

b。杜氏利什曼虫

c。刚地弓形虫

小球隐孢子虫 d。

e。Acanthamoeba culbertsoni

1556.寄生宿主和寄生部位广泛的原虫是一个。

痢疾阿米巴

B。

间日疟原虫

C。

杜氏利什曼虫

D。

阴道毛滴虫

E。

刚地弓形虫

1561.

关于细小隐孢子虫是正确的

a.只影响免疫功能受损患者

b.艾滋病常见的机会性感染之一

囊肿通过痰和支气管分泌物传播

治疗方法为甲硝唑

e.以上所有

1563.

弗伦克尔的皮肤试验呈阳性

脑囊尾蚴病。

b。弓形体病

c.包虫病

d。神秘丝虫病

e。滴虫病

1568.

在新鲜粪便检查中，致病性溶组织性内阿米巴最显著的特征是-

a.存在活跃的伪足

b。Erythrophagocytosis

c.胞浆内液泡的存在

d.存在两个核小体

e.以上所有

1572.

两个核的存在是其特征

一。卡氏肺孢子虫

小球隐孢子虫 b。

利什曼尼亚的阿玛斯蒂哥特

d。肠袋虫属杆菌

阴道毛滴虫滋养体

1574.

关于皮肤阿米巴病，这是不真实的

a.是一种广泛性皮肤坏死性炎症和皮下 t 细胞问题

可发生于肛周

抗阿米巴病治疗后病情有所改善

d.感染通过血源途径获得

e.以上皆非

1575.

恶性疟原虫引起最严重的感染形式是:

没有真正的复发

b .不规则的发作

c.内部器官毛细血管的粘附和阻塞

红细胞内多重感染

e.以上所有

1586.

最常见的一种具有抽动特性的原生动物

下列哪项

一个活检肌肉。

b 血液。

c。十二指肠送气音

d。痰

e。阴道分泌物

1591.下列寄生虫中属于鞭毛虫的是()

A. 牛肉绦虫

B.阴道毛滴虫

ryptosporidium

D.福氏耐格里阿米巴

• E 毛首鞭形线虫