빈칸 복습 75문항

1~5장 이론 시험 준비 / 2026-10-22

장별15문항,총75문항이다. 괄호 안을 채운 뒤 정의·이유를 한 문장 더 말해 본다. 정답은05에 분리했다. 여러 빈칸이 있어도 번호 하나가 한 문항이다.

1장 / 15문항

B01. 기존 영상을 변환·개선·분석하는 분야는 [_____]이다.

B02. 벡터 그래픽스는 도형의 [_____] 정보와 수식으로 저장한다.

B03. 래스터 그래픽스의 기본 표현 단위는 [_____]이다.

B04. 벡터는 확대 때 경계를 재계산하지만 래스터는 정해진 [_____]에 의존한다.

B05. 단순 도형에서는 벡터 파일이 작을 수 있으나 [항상 작다 / 조건에 따라 다르다] 중 맞는 것은 [_____]이다.

B06. 3D 생성의 개념 흐름은 모델링 → [_____] → 투영 → 렌더링이다.

B07. 물체의 형상을 만드는 과정은 [_____],카메라의 위치·방향을 정하는 과정은 [_____]이다.

B08. 3차원 장면을2차원 영상에 대응시키는 과정은 [_____]이다.

B09. 일반 디스플레이에 표시되는3D 그래픽스의 최종 결과는 [_____] 영상이다.

B10. 와이어프레임·다각형 표면·솔리드는 주로 [_____]·[_____]·[_____]를 표현한다.

B11. 랜덤 스캔은 [_____] 명령을 따라 그리고,래스터 스캔은 [_____]에 저장한 픽셀을 재생한다.

B12. 이중 프레임 버퍼는 화면을 [_____]하는 버퍼와 다음 그림을 [_____]하는 버퍼를 분리한다.

B13. GPU에서 실행되며 정점·픽셀 등의 처리를 정하는 프로그램은 [_____]다.

B14. 응용프로그램은 그래픽스 [_____]를 사용하여 하드웨어 기능을 이용한다.

B15. 발전 흐름에서1980년대의 PC·GUI 뒤1990년대에는3D API와 [_____]가 등장하고,최근에는 PBR·VR/AR·광선추적·AI가 확대되었다.

2장 / 15문항

B16. 절대 좌표는 두 끝점을,상대 좌표는 시작점과 [_____]을 사용한다.

B17. DDA의 일반화에서 steps=max([_____],[_____])다.

B18. DDA는 다음 단계에 반올림 [전 / 후]의 [_____]값을 사용한다.

B19. Bresenham 선의 기본 조건은 dx>0,기울기 [_____] 범위다.

B20. Bresenham 선의 초기 p는 [_____]이다.

B21. 선에서 p<0이면 다음 점은 [_____],p≥0이면 [_____]이다.

B22. 원 판별값의 초기식은 [_____]이며 상대 시작점은 [_____]이다.

B23. 원에서 p≥0일 때 다음 p는 p+[_____]이며,대입 x,y는 갱신 [전 / 후]의 값이다.

B24. 원 한 점에서 축 교환과 부호 변화를 이용하는 대칭은 [_____]방향 대칭이다.

B25. 대각선을 이웃으로 포함하는 것은 [_____]방향 연결이다.

B26. Flood Fill의 기준은 기존 [_____],Boundary Fill의 기준은 [_____]이다.

B27. 홀짝 규칙은 교차 횟수가 [_____]이면 내부,접기회수는 방향 합이 [_____]이면 내부다.

B28. 전체 에지를 ymin 순으로 관리하는 것은 [_____],현재 행과 만나는 에지 목록은 [_____]이다.

B29. 비수평 에지의 다음 행 교차 x는 현재 x+[_____]로 계산한다.

B30. SSAA는 전체 고밀도 샘플링,MSAA는 다중 피복 샘플과 보통 [_____] 공유,FXAA는 완성 영상 [_____] 방식이다.

3장 / 15문항

B31. 2D 점은 동차 열벡터 [x,y,[_____]]^T로 쓴다.

B32. 일반 이동을 포함한2D 변환은 [_____]×[_____] 동차행렬로 표현한다.

B33. A후B를 적용하는 합성행렬은 [_____]이다.

B34. 이동 T(tx,ty)의 마지막 열은 [_____]^T다.

B35. 반시계 회전의 x식은 x*cosθ-[_____],y식은 x*sinθ+[_____]이다.

B36. 반시계90도에서 (x,y)는 [_____]로 바뀐다.

B37. C중심 회전의 행렬곱은 T(C)*[_____]*T([_____])이다.

B38. C=(a,b) 기준 신축의 이동열 첫 두 성분은 [_____],[_____]이다.

B39. x축 반사는 [_____]좌표의 부호를,y축 반사는 [_____]좌표의 부호를 바꾼다.

B40. y=x 반사는 (x,y)→[_____],y=-x 반사는 (x,y)→[_____]다.

B41. y=x+b 반사는 (x,y)→[_____]다.

B42. x방향 밀림의 좌표식은 x'=[_____],y'=y다.

B43. 길이·각도 보존은 [_____]변환,균일 길이배율·모양 보존은 [_____]변환의 특징이다.

B44. 0이 아닌 이동은2D [선형 / 어파인] 중 [_____]이며,비균일 신축은 일반적인 유사변환이 [맞다 / 아니다] 중 [_____]다.

B45. 역변환에서 (B*A)역은 [_____]이며,S의 역이 존재하려면 sx,sy가 [_____]이어야 한다.

4장 / 15문항

B46. 세계에서 무엇을 보여줄지 정하는 것은 [_____],출력 위치를 정하는 것은 [_____]다.

B47. 뷰포트를 고정하고 윈도우를 줄이면 [_____],크기는 유지하고 옮기면 [_____]이다.

B48. 윈도우-뷰포트의 sx는 뷰포트 [_____] 나누기 윈도우 [_____]이다.

B49. xv=xvL+(xw-[_____])*sx다.

B50. 종횡비 보존을 위해 두 축 신축률은 [_____]아야 한다.

B51. 점 내부 조건은 xmin≤x≤xmax 그리고 [_____]이다.

B52. TBRL에서 왼쪽 코드는 [_____],위쪽 코드는 [_____]이다.

B53. Cohen-Sutherland에서 OR=0이면 [_____],AND≠0이면 [_____]이다.

B54. 끝점 코드 AND=0은 [채택 확정 / 추가 판정 필요] 중 [_____]다.

B55. 선분 매개식은 P(u)=P1+u*(P2-P1),기본 범위는 [_____]이다.

B56. Liang-Barsky의 왼쪽 p,q는 [_____],[_____]다.

B57. p*u≤q에서 p<0은 u의 [_____],p>0은 [_____]을 갱신한다.

B58. p=0,q<0이면 [_____],p=0,q≥0이면 [_____]이다.

B59. uin>uout이면 [_____],uin=uout이면 경계 포함 조건에서 [_____]이다.

B60. S-H에서 밖→안은 [_____],안→밖은 [_____]를 출력한다. 여러 분리 윤곽 추적에는 [_____]을 쓸 수 있다.

5장 / 15문항

B61. 주변 조명은 방향과 위치에 무관한 기본 밝기이며 식은 [_____]이다.

B62. 이상적 산란반사는 관찰자 [_____]에 무관하고,거울반사는 그 영향을 크게 받는다.

B63. N은 표면 [_____],L은 표면에서 [_____]으로 향하는 단위벡터다.

B64. N·L=cosθ로 쓰려면 N,L은 같은 좌표계의 [_____]벡터여야 한다.

B65. 강의 p.9~12의 거리감쇠 인자는 [_____]이며,물리적 이상 점광원 설명의1/d²와 구분한다.

B66. 뒷면 산란광을 막기 위해 N·L 대신 [_____]을 쓴다.

B67. 표면→광원인 L의 약속에서 반사벡터 R은 [_____]이다.

B68. Phong 거울항은 (Ip/d)*Ks*[_____]^n이다.

B69. n이 커지면 하이라이트 범위는 [_____]지고,V·R=1에서 거듭제곱은 [_____]이다.

B70. Lambert는 주변+산란,Phong 조명은 여기에 [_____]을 더한다.

B71. Flat은 면의 밝기를 [_____]하게 사용한다.

B72. Gouraud는 정점에서 계산한 [_____]를 보간한다.

B73. Phong 셰이딩은 [_____]를 보간하고 [_____] 후 각 프래그먼트 조명을 계산한다.

B74. 선형 보간은 I=(1-t)*I0+t*I1이고 두 가중치의 합은 [_____]이다.

B75. 광선 추적은 직접광에 [_____]광과 [_____]광을 합하며 횟수·기여 임계값 등으로 종료한다.