



# 高中数学 · 二阶

适用于联赛二试与冬令营

作者：Johnny Tang

组织：DEEP Team

时间：January 21, 2022

请：相信时间的力量，敬畏概率的准则

# 目录

第一部分	代数部分	3
第 1 章	不等式	4
1.1	不等式中的恒等变形 . . . . .	4
1.2	数学归纳法与数列变形 . . . . .	7
第二部分	几何部分	8
第三部分	组合部分	9
第 2 章	常见结论	10
2.1	抽屉原理 . . . . .	10
2.2	极端原理与无穷递降法 . . . . .	14
第四部分	数论部分	18

题目难度注记：

- 〔1〕表示可以自己做出或答案看完后可以完全掌握.
- 〔2〕表示初次不能理解答案，需要一些思考.
- 〔3〕表示与这道题僵持很久才拿下.

第一部分

代数部分

# 第 1 章 不等式

## 1.1 不等式中的恒等变形

### 1.1.1 整式变形

命题 1.1 (常见三元恒等变形公式)

(1)

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

(2)

$$(a + b)(b + c)(c + a) = a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 + 2abc$$

(3)

$$(a + b + c)(ab + bc + ca) = a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 + 3abc$$

(4)

$$(a - b)(b - c)(c - a) = -(a^2b + b^2c + c^2a) + (ab^2 + bc^2 + ca^2)$$

(5)

$$(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b) = a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 - a^3 - b^3 - c^3 - 2abc$$

(6)

$$(a + b + c)(a + b - c)(b + c - a)(c + a - b) = 2a^2b^2 + 2b^2c^2 + 2c^2a^2 - a^4 - b^4 - c^4$$

然而最近几年三元变形不太常考.

定理 1.1 (Schur 不等式)

设实数  $a, b, c, t$  满足  $a, b, c \geq 0$ , 则

$$a^t(a - b)(a - c) + b^t(b - c)(b - a) + c^t(c - a)(c - b) \geq 0$$

当且仅当  $a, b, c$  中有两个相等、另一个为 0 或  $a = b = c$  时取等.

**证明** 不妨设  $a \geq b \geq c$ , 注意到  $a - c = (a - b) + (b - c)$ , 所以

$$\begin{aligned} LHS &= a^t(a - b)^2 + a^t(a - b)(b - c) - b^t(b - c)(a - b) + c^t(b - c)^2 + c^t(a - b)(b - c) \\ &= a^t(a - b)^2 + c^t(b - c)^2 + (a^t - b^t + c^t)(a - b)(b - c) \geq 0 \end{aligned}$$

□

推论 1.1

当  $t = 1$  时, 有

$$a(a - b)(a - c) + b(b - c)(b - a) + c(c - a)(c - b) \geq 0$$

即

$$a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2$$



**注** 这个不等式意义在于:  $\sum ab(a+b)$  放在较小的一侧, 这是 Cauchy/均值不等式等无法做到的.

**例题 1.1.1** 已知  $a \geq b \geq c \geq 0$ , 证明:

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 \leq \frac{1}{8}(a+b+c)^3$$

**提示** 将不对称的形式转化为对称处理.

**解** 由  $-(a^2b + b^2c + c^2a) + (ab^2 + bc^2 + ca^2) = (a-b)(b-c)(c-a) \leq 0$ , 可知

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 \leq a^2b + b^2c + c^2a$$

于是

$$ab^2 + bc^2 + ca^2 \leq \frac{1}{2}(a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2)$$

现在只需证明

$$(a+b+c)^3 \geq 4(a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2)$$

即

$$a^3 + b^3 + c^3 + 6abc \geq a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2$$

实际上, 由  $3abc \geq 0$  与  $a^3 + b^3 + c^3 + 3abc \geq a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2$ , 这个式子自然成立.

## 1.1.2 分式变形

**例题 1.1.2** 设  $n$  是正整数,  $a_1, a_2, \dots, a_n$  是非负实数, 证明:

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)} + \dots + \frac{a_1a_2 \cdots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} \leq 1$$

**提示** 观察左式形式, 尝试进行通分操作.

$$n=1, \quad \frac{1}{1+a_1} = 1 - \frac{a_1}{1+a_1}$$

$$n=2, \quad \frac{1}{1+a_1} + \frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)} = \frac{1+a_1+a_2}{(1+a_1)(1+a_2)} = 1 - \frac{a_1a_2}{(1+a_1)(1+a_2)}$$

$$n=3, \quad \frac{1}{1+a_1} + \frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)} + \frac{a_1a_2}{(1+a_1)(1+a_2)(1+a_3)} = 1 - \frac{a_1a_2a_3}{(1+a_1)(1+a_2)(1+a_3)}$$

于是猜测

$$LHS = 1 - \frac{a_1a_2 \cdots a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)}$$

**解** 记  $f(n) = LHS$ ,  $g(n) = 1 - \frac{a_1a_2 \cdots a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)}$ .

作

$$\frac{a_1a_2 \cdots a_{n-1}}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} + \frac{a_1a_2 \cdots a_n}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} = \frac{(a_1a_2 \cdots a_{n-1})(1+a_n)}{(1+a_1)(1+a_2) \cdots (1+a_n)} = 1 - g(n-1)$$

即  $f(n) - f(n-1) + 1 - g(n) = 1 - g(n-1)$ . 于是  $f(n) - g(n) = f(n-1) - g(n-1)$ . 可以对  $n$  归纳证明

$f(n) = g(n)$ :

当  $n=1$  时,  $f(n) = \frac{1}{2} = g(n)$ ; 假设当  $n=k$  时成立, 即  $f(n) = g(n)$ , 由上述等式可知  $f(n+1) = g(n+1)$ ,

于是当  $n = k + 1$  时也成立. 由数学归纳原理,  $f(n) = g(n)$ . 故

$$LHS = 1 - \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{(1 + a_1)(1 + a_2) \cdots (1 + a_n)} \leq 1$$

### 1.1.3 求和符号变形

#### 命题 1.2 (常见求和符号变形公式)

(1)

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j$$

(2)

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i \right) \cdot \left( \sum_{j=1}^n a_j \right) = \sum_{i=1}^n \left( a_i \cdot \sum_{j=1}^n a_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_i a_j$$

(3)

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n a_i a_j = \sum_{j=2}^n \sum_{i=1}^{j-1} a_i a_j$$

**例题 1.1.3** 设  $2n$  个实数  $a_1, a_2, \cdots, a_{2n}$  满足条件

$$\sum_{i=1}^{2n-1} (a_{i+1} - a_i)^2 = 1$$

求

$$(a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{2n}) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)$$

的最大值.

**提示** 利用求和符号化简.

**解** 设  $\{b_n\}$  满足  $b_i = a_{i+1} - a_i$ , 由题可知  $b_1^2 + \cdots + b_n^2 = 1$ . 由于

$$S_0 = \sum_{i=1}^n (a_{n+i} - a_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^{n+i-1} b_j$$

对于给定的  $b_k$ , 满足  $i \leq k \leq n + i - 1$  的  $i$  的个数就是最终  $b_k$  的系数. 容易发现该个数为

$$\begin{cases} k, & k \leq n \\ 2n - k, & k \geq n \end{cases}$$

于是

$$S_0 = b_1 + 2b_2 + \cdots + (n-1)b_{n-1} + nb_n + (n-1)b_{n+1} + \cdots + b_{2n-1}$$

由 Cauchy 不等式, 可知

$$\begin{aligned} (S_0)^2 &\leq (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_{2n-1}^2)[2(1^2 + 2^2 + \cdots + (n-1)^2) + n^2] \\ &= \frac{(n-1)n(2n-1)}{3} + n^2 = \frac{2n^3 + n}{3} \end{aligned}$$

故  $S_0 \leq \sqrt{\frac{2n^3 + n}{3}}$ , 当且仅当  $\frac{b_1}{1} = \cdots = \frac{b_n}{n} = \frac{b_{n+1}}{n-1} = \cdots = \frac{b_{2n-1}}{1}$  时取等.

## 1.2 数学归纳法与数列变形

**例题 1.2.1** 证明：对任意的正整数，有

$$\sqrt{1^2 + \sqrt{2^2 + \sqrt{3^2 + \cdots + \sqrt{n^2}}} < 2$$

**提示** 尝试对  $n$  进行归纳证明. 发现在  $n = k + 1$  时，不等号方向不对，而证明加强命题比较麻烦，不如换个角度进行归纳.

**解** 设  $a_m = \sqrt{m^2 + \sqrt{(m+1)^2 + \cdots + \sqrt{n^2}}}$ . 于是  $a_m = a_{m-1}^2 - (m-1)^2$ ，且  $a_n = n$ ， $a_1 = LHS$ .

以下对  $m$  反向归纳证明  $a_m < m + 1$ . 当  $m = n$  时命题成立；假设  $m = k$  时命题成立，那么当  $m = k - 1$  时，

$$a_{k-1} = \sqrt{a_k + (k-1)^2} < \sqrt{k^2 - k + 2} \leq k$$

其中  $k \geq 2$ . 由归纳原理， $a_m < m + 1$  ( $m \geq 1$ )，于是  $LHS = a_1 < 2$ .



## 第二部分

### 几何部分

## 第三部分

## 组合部分

## 第2章 常见结论

### 2.1 抽屉原理

#### 定理 2.1 (抽屉原理)

有  $m$  个小球,  $n$  个抽屉, 那么存在一个抽屉放了至少  $\left\lceil \frac{m-1}{n} \right\rceil + 1$  个、至多  $\left\lfloor \frac{m}{n} \right\rfloor$  个小球.

**证明** (1) 假设所有抽屉最多有  $\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor$  个小球, 则总小球数目至多为

$$\left\lfloor \frac{m-1}{n} \right\rfloor \times n \leq \frac{m-1}{n} \times n = m-1 < m$$

这与条件矛盾.

(2) 假设所有抽屉至少有  $\left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil + 1$  个小球, 则总小球数目至少为

$$\left( \left\lceil \frac{m}{n} \right\rceil + 1 \right) \times n > \frac{m}{n} \times n = m$$

这与条件矛盾. □

#### 推论 2.1 (平均值原理)

对于给定的实数  $a_1, \dots, a_n$ , 存在  $a_i, a_j$  使得

$$a_i \geq \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n), \quad a_j \leq \frac{1}{n}(a_1 + \dots + a_n)$$

**例题 2.1.1** [1] 证明:

(1) 从前 100 个正整数中任意取出 51 个数, 都可以找到两个数, 使得它们中的一个另一个的整数倍.

(2) 从前 91 个正整数中任意取出 10 个数, 则一定有两个数, 使得这两个数中较大数不超过较小数的 1.5 倍.

(3) 若  $a_1, a_2, \dots, a_{100}$  都是实数, 且在集合  $\{a_1, \frac{a_1+a_2}{2}, \dots, \frac{a_1+a_2+\dots+a_{100}}{100}\}$  中至少有 51 个元素的值相等, 则  $a_1, a_2, \dots, a_{100}$  中有两个数相等.

**解** (1) 构造:

$$\{1 \times 2^0, \dots, 1 \times 2^6\}, \{3 \times 2^0, \dots, 3 \times 2^5\}, \dots, \{99 \times 2^0\}$$

共 50 个抽屉. 由抽屉原理, 在前 100 个正整数中必有两个数在同一个抽屉中, 即它们有倍数关系.

(2) 构造:

$$\{1\}, \{2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9, 10\}, \{11, 12, 13, 14, 15, 16\}, \{17, \dots, 25\}, \{26, \dots, 39\}, \{40, \dots, 60\}, \{61, \dots, 91\}$$

共 9 个抽屉. 由抽屉原理, 前 91 个正整数中必有两个在同一抽屉中, 即满足较大数不超过较小数的 1.5 倍.

(3) 记  $b_i = \frac{a_1 + \dots + a_i}{i}$ , 注意到, 若  $b_i = b_{i+1} = p$ , 则

$$\frac{a_1 + \dots + a_i}{i} = \frac{a_1 + \dots + a_i + a_{i+1}}{i+1}$$

可得  $a_{i+1} = \frac{a_1 + \dots + a_i}{i} = b_i = p$ . 设  $b_1, \dots, b_{100}$  中相等的 51 个数均等于  $p$ .

1° 当  $a_1 \neq p$  时: 构造

$$\{b_1, b_2\}, \dots, \{b_{99}, b_{100}\}$$

共 50 个抽屉, 同理存在  $a_{2k+1} = p$ ; 构造

$$\{b_2, b_3\}, \dots, \{b_{98}, b_{99}\}, \{b_{100}\}$$

共 50 个抽屉, 同理存在  $a_{2l} = p$ . 故  $a_{2k+1} = a_{2l}$ .

2° 当  $a_1 = p$  时: 构造

$$\{b_2, b_3\}, \dots, \{b_{98}, b_{99}\}, \{b_{100}\}$$

共 50 个抽屉. 由抽屉原理, 必存在  $b_{2k} = b_{2k+1} = p$ , 因而  $a_{2k} = p = a_1$ .

**例题 2.1.2** [1] 证明:

(1) 平面上任作 8 条互不平行的直线, 其中必有两条直线的夹角小于 23 度.

(2) 给定一个由 10 个互不相等的两位十进制正整数组成的集合, 则这个集合必有两个无公共元素的非空子集, 它们的元素和相等.

(3) 100 个孩子围成一圈, 其中 41 个男孩, 59 个女孩. 则一定有 2 个男孩, 他们中间的孩子个数恰为 19 的整数倍.

**解** (1) 由于平面上两直线的夹角不会随平移而改变, 不妨平移这 8 条线使得它们交于同一点. 由平均值原理, 必有两条直线的夹角小于等于 22.5 度, 即小于 23 度.

(2) 由于所有可能的非空子集个数为  $2^{10} - 1$ , 而子集和的所有可能情况只有在  $[10, 945]$  中 (共 936 种), 由抽屉原理, 必有两个子集的和相同.

若这两个子集交集为空, 则符合题意; 若交集不空, 则分别去掉交集的元素, 构成两个新的元素和相等且交集为空的集合.

(3) 假设这 100 个孩子的编号分别为  $1, \dots, 100$ , 则构造

$$\{1, 21, 41, 61, 81\}, \{2, 22, 42, 62, 82\}, \dots, \{20, 40, 60, 80, 100\}$$

共 20 个集合. 由抽屉原理, 至少有一个集合中同时有三个男孩, 即满足题意.

**例题 2.1.3** [1] 证明:

(1) 已知  $a_1, \dots, a_{21}$  是区间  $(0, 400)$  内的 21 个实数, 总可以找到两个数  $a_i, a_j (1 \leq i < j \leq 21)$ , 满足  $a_i + a_j < 1 + 2\sqrt{a_i a_j}$ .

(2) 已知实数  $0 < a_1 < \dots < a_{2011}$ , 则存在两个数  $a_i, a_j (1 \leq i < j \leq 2011)$ , 满足  $a_j - a_i < \frac{(1+a_i)(1+a_j)}{2010}$ .

**解** (1) 只需证明  $\sqrt{a_i} - \sqrt{a_j} < \sqrt{2}$  即可. 实际上, 不妨设  $a_1 < \dots < a_{21}$ , 那么在  $\sqrt{a_{21}} - \sqrt{a_{20}}, \dots, \sqrt{a_2} - \sqrt{a_1}$  中, 由于它们的和为  $\sqrt{a_{21}} - \sqrt{a_1} < 20$ , 由平均值原理可知其中必有一个  $< 1 < \sqrt{2}$ .

(2) 只需证明  $\frac{1}{1+a_i} - \frac{1}{1+a_j} < \frac{1}{2010}$ . 与 (1) 同理可知.

**例题 2.1.4** [1] 从 4 个同心圆的圆心出发的 100 条射线等分各圆周, 分别与 4 个圆各有 100 个交点. 任意给每个圆上的点染上黑、白两色之一, 使每个圆上都恰有 50 个黑点和 50 个白点. 证明: 可将此 4 个圆适当旋转, 使这 100 条射线中至少存在 13 条射线, 它们中的每一条穿过的 4 个点颜色都相同.

**提示** 算两次.

**解** 对于给定的两个同心圆, 设所有的组合方法为  $P_1, \dots, P_{100}$ , 设第  $i$  种方法产生同色对个数  $S(P_i)$ .

对于一条固定的射线, 它经过一个同色对的方法数为 50. 由于共 100 条射线, 可知

$$S(P_1) + \dots + S(P_{100}) = 100 \times 50 = 5000$$

故由抽屉原理, 存在一个  $n$  使得  $S(P_n) \geq 50$ . 第一、二圈选择这样的方法, 考虑新增的第三圈, 设它与前两圈的

组合方法为  $Q_1, \dots, Q_{100}$ , 第  $i$  种方法产生同色组个数为  $S(Q_i)$ .

对于一条穿过第一圈、第二圈上某个同色对的射线, 它经过一个同色组的方法数为 50. 由于共 50 条这样的射线, 可知

$$S(Q_1) + \dots + S(Q_{100}) = 50 \times 50 = 2500$$

由抽屉原理, 存在一个  $m$  使得  $S(P_n) \geq 25$ . 同理, 增加第四圈时至少有  $\lceil 12.5 \rceil = 13$  条射线穿过同色组, 此即得证.

**例题 2.1.5** [1] (1) 设  $S$  为  $\{1, 2, \dots, n\}$  的一个非空子集, 满足其中任两个元素之和不为  $n$ , 试求  $|S|$  的最大值. (2) 从数  $1, 2, 3, \dots, 2017$  中删去一些数, 使得剩下的数中任何一个数都不等于其余任意两个不同的数的积, 问最少要删去多少个数才能做到这一点?

**解** (1) 构造:

$$\{1, n-1\}, \{2, n-2\}, \dots, \left\{\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right\}, \{n\}$$

共  $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$  个抽屉. 由抽屉原理,  $|S| \leq \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor + 1$ . 例如, 在  $S = \{1, 2, \dots, \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor, n\}$  时可以取到等号.

(2) 保留  $1, 45 \sim 2017$  可满足题意, 即要构造 43 个抽屉.

构造:

$$\{44, 45, 44 \times 45\}, \{43, 46, 43 \times 46\}, \dots, \{2, 87, 2 \times 87\}$$

共 43 个抽屉. 由抽屉原理, 至少要去掉 43 个数才能保证不存在一个抽屉的所有元素都保留. 例如, 去掉  $2 \sim 44$  即可符合题意.

**例题 2.1.6** [2] 若正整数集  $S$  中存在两个元素 (可以相同) 的和为 2 的幂, 则称集  $S$  为优集; 否则称为劣集. 求正整数  $n$ , 使得  $\{1, 2, \dots, n\}$  有一个含 99 个元素的劣集, 而所有含 100 个元素的子集为优集.

**提示** 不妨换个方向: 考虑对于给定的集合  $\{1, 2, \dots, n\}$ , 求它最大劣集的元素个数.

**解** 先考虑一个“基准”, 即  $n = 2^k$  时的情况. 构造

$$\{1, 2^k - 1\}, \dots, \{2^{k-1} - 1, 2^{k-1} + 1\}$$

共  $2^{k-1} - 1$  个抽屉. 若取原集合其中的  $2^{k-1}$  个数, 要么每个抽屉取一个之后取到  $2^{k-1}$  或  $2^k$ , 要么 (由抽屉原理) 存在一个抽屉中有两个数. 这显然是不符合要求的, 因此最大劣集的元素个数为  $2^{k-1} - 1$ , 例如,  $\{2^k - 1, \dots, 2^{k-1} + 1\}$  就是一个这样的劣集.

注意到, 若  $n = 2^k - 1$ , 所有情况与  $n = 2^k$  是一样的. 若设最大劣集的元素个数为  $f(n)$ , 则有

$$f(2^k - 1) = f(2^k) = 2^{k-1} - 1 \quad (k \geq 1) \quad (2.1)$$

接着考虑一般情况, 即  $n = 2^k + l$  ( $1 \leq l \leq 2^{k+1} - 2$ ) 时. 构造

$$\{2^k - l, 2^k + l\}, \dots, \{2^k - 1, 2^k + 1\}$$

共  $l$  个抽屉. 由抽屉原理, 对于这  $l$  个抽屉, 每个抽屉至多取一个元素. 另外, 若已取  $2^k + 1, \dots, 2^k + l$ , 对于  $1, \dots, 2^k - l - 1$ , 可以取其中能构成劣集的元素. 综上,

$$f(2^k + l) = f(2^k - l - 1) + l \quad (1 \leq l \leq 2^{k+1} - 2) \quad (2.2)$$

综合式 2.1 与 2.2, 可知

$$f(2^k + l) = f(2^k - l - 1) + l \quad (0 \leq l \leq 2^k - 1)$$

作以下估计:

$$f(128) = 65 \quad f(256) = 129$$

$$f(200) = f(2^7 + 72) = f(55) + 72 = f(2^5 + 23) + 72 = f(8) + 95 = f(2^3) + 95 = 97$$

$$f(201) = f(2^7 + 73) = f(54) + 73 = f(2^5 + 22) + 73 = f(9) + 95 = f(2^3 + 1) + 95 = f(6) + 96 = f(2^2 + 2) + 96 = f(2) + 98 = 98$$

$$f(202) = f(2^7 + 74) = f(53) + 74 = f(2^5 + 21) + 74 = f(10) + 95 = f(2^3 + 2) + 95 = f(5) + 97 = f(2^2 + 1) + 97 = f(2) + 98 = 98$$

$$f(203) = f(2^7 + 75) = f(52) + 75 = f(2^5 + 20) + 75 = f(11) + 95 = f(2^3 + 3) + 95 = f(4) + 98 = 99$$

$$f(204) = f(2^7 + 76) = f(51) + 76 = f(2^5 + 19) + 76 = f(12) + 95 = f(2^3 + 4) + 95 = f(3) + 99 = 100$$

于是  $n = 203$  是满足题意的一个数. 另一方面, 容易证明  $f(x)$  是单调不减的函数 (由劣集的定义), 于是  $n = 203$  是满足题意的唯一的一个数.

**例题 2.1.7** [1] (1) 任选 6 人, 试证: 其中必有 3 人, 他们互相认识或都不认识.

(2) 17 名科学家中每两名科学家都进行了通信, 而且任意两名科学家通信时只讨论三道题目中的一道题目. 证明: 至少有三名科学家, 他们相互通信时讨论的是同一个题目.

**解** (1) 设这 6 个人  $A_1, \dots, A_6$ . 考虑  $A_1$  与其他人的关系: 把与  $A_1$  认识/不认识两种状态分别视作抽屉, 由抽屉原理, 至少存在一种状态有三个人满足. 不妨设  $A_1$  与  $A_2, A_3, A_4$  互相认识.

若  $A_2, A_3, A_4$  中有两人互相认识, 则这两个人与  $A_1$  互相认识, 符合题意; 若  $A_2, A_3, A_4$  互不认识, 也符合题意. 综上, 原命题得证.

(2) 考虑其中选定的一个人  $A$ . 将三道题目分别视作抽屉, 由抽屉原理, 存在一道题被  $A$  与其他至少 6 人讨论, 记此题为 1 号题,  $A$  与  $A_1, \dots, A_6$  讨论这道题.

若  $A_1, \dots, A_6$  中有两人之间也讨论 1 号题, 符合题意; 若他们之中全不讨论 1 号题, 不妨考虑  $A_1$ . 将其余两道题目分别视作抽屉, 由抽屉原理, 存在一道题被  $A_1$  与其他至少 3 人讨论. 记此题为 2 号题, 不妨设这 3 人是  $A_2, A_3, A_4$ .

若  $A_2, A_3, A_4$  中有两人讨论 2 号题, 则符合题意; 若他们之间全不讨论 2 号题, 则他们之间必定互相讨论 3 号题, 也符合题意.

综上, 原命题得证.

**例题 2.1.8** [1] 300 名选手参加一次比赛, 每两名选手或互相认识, 或互不认识. 已知没有三名选手两两认识, 且每名选手至多认识其他  $n$  名选手. 对于每个正整数  $m$  ( $1 \leq m \leq n$ ), 至少存在一名选手恰认识  $m$  名选手. 求  $n$  的最大值.

**解** 1° 证明有上界: 考虑恰认识  $n$  个人的  $A$ . 记所有  $A$  认识的人构成集合  $S$ ,  $A$  不认识的人构成集合  $T$ , 那么  $|S| = n$ ,  $|T| = 299 - n$ .


由于没有三名选手两两认识, 故  $S$  中没有两个互相认识的人, 即  $S$  中的人只能认识  $A$  与  $T$  中的人, 那么  $S$  中认识人最多的那个人最多只能认识  $300 - n$  个人. 假设  $n$  足够大, 则恰认识  $301 - n, \dots, n - 1$  个人的人只能在  $T$  中, 所以有

$$299 - n \geq (n - 1) - (301 - n) + 1$$

这意味着  $n \leq 200$ .

2° 证明上界可取: 取  $n = 200$ , 设  $S$  中的人分别为  $B_1, \dots, B_{100}$ ,  $T$  中的人分别为  $A_1, \dots, A_{99}$ .

按如下规则构造即可:  $A$  认识所有  $B_i$ ,  $A_j$  认识除  $B_1 \sim B_j$  之外的所有  $B_i$ , 如下图所示:



## 2.2 极端原理与无穷递降法

**示例** 证明  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

**解** 设  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ , 则  $q^2 = 2p^2 \xrightarrow{\text{令 } q=2q_1} 2q_1^2 = p^2 \xrightarrow{\text{令 } p=2p_1} 2p_1^2 = q_1^2 \cdots$  然而不能像这样无穷递降下去.

假设  $(p, q)$  是满足  $q^2 = 2p^2$  且使得  $p + q$  最小的一组数, 若令  $q = 2q_1$ , 则  $p^2 = 2q_1^2$ , 故  $(q_1, p)$  也满足要求, 然而  $q_1 + p < p + q$ , 这与假设矛盾, 故不存在满足要求的一组数.

**例题 2.2.1** [1] 已知对于任意  $n$  个互不相同的实数两两求和有  $\frac{n(n-1)}{2}$  种不同的求法. 求正整数  $n$ , 满足存在  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个互不相同的整数, 使得这些数两两求和恰可构成  $\frac{n(n-1)}{2}$  个连续的正整数.

**解** 1° 证明有上界: 不妨设这  $n$  个数满足  $a_1 < \cdots < a_n$ , 于是  $a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < \text{something} < a_{n-2} + a_n < a_{n-1} + a_n$ . 这意味着  $a_3 - a_2 = 1$ ,  $a_{n-1} - a_{n-2} = 1$ . 若  $n - 2 > 3$ , 则必有  $a_2 + a_{n-1} = a_3 + a_{n-2}$ , 因此  $n \leq 5$ .

2° 证明上界内部分可取: 当  $n = 5$  时, 有  $a_3 - a_2 = 1$ ,  $a_4 - a_3 = 1$ , 因而

$$a_1 + a_2 < a_1 + a_3 < a_1 + a_4 < \text{something} < a_1 + a_5 < \text{something} < a_2 + a_5 < a_3 + a_5 < a_4 + a_5$$

其中两个 *something* 的位置可以选择其一放置  $a_2 + a_3 < a_2 + a_4 < a_3 + a_4$ . 于是可知  $(a_4 + a_5) - (a_1 + a_4) = 7$ , 即  $a_5 - a_1 = 7$ .

若放在第一个位置, 可得  $a_2 + a_3 = a_1 + a_4 + 1$ ,  $a_1 + a_5 = a_3 + a_4 + 1$ , 解得  $a_5 = a_1 + 8$ , 矛盾;

若放在第二个位置, 可得  $a_2 + a_3 = a_1 + a_5 + 1$ ,  $a_2 + a_5 = a_3 + a_4 + 1$ , 解得  $a_5 = a_1 + 8$ , 矛盾.

因此,  $n = 5$  时不合题意.

另一方面, 容易验证, 当  $n = 3, 4$  时分别取


$$(a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_1 + 1, a_1 + 2)$$

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) = (a_1, a_1 + 1, a_1 + 2, a_1 + 4)$$

可符合题意. 综上,  $n = 3$  或  $4$ .

**例题 2.2.2** [1] 平面上有  $n$  个点, 其中任三个点都可组成三角形, 且面积均不超过 1. 证明: 存在一个面积不超过 4 的三角形, 它能覆盖住所有  $n$  个点.

**解** 设  $\triangle ABC$  是最大面积的三角形, 分别过其中一个顶点作对边的平行线, 记三条平行线交出三角形  $\triangle A'B'C'$ . 任取新的一点. 对于点  $A, B$ , 由于所产生的三角形面积不超过  $\triangle ABC$ , 故新的点一定在直线  $A'B'$  以上. 同理该点在  $B'C'$  以下、 $A'C'$  以上, 即其一定在三角形  $\triangle A'B'C'$  内. 又  $S_{\triangle A'B'C'} = 4S_{\triangle ABC} \leq 4$ , 故该三角形就是题目所求.



**例题 2.2.3** [1] 有  $n$  名 ( $n \geq 3$ ) 选手参加的一次乒乓球循环赛中, 没有一个全胜的. 问: 能否找到三名选手  $A, B, C$ , 使得  $A$  胜  $B$ ,  $B$  胜  $C$ ,  $C$  胜  $A$ ?

**解** 设  $A$  是胜场最多的人. 设所有败于  $A$  的人构成集合  $X$ , 所有胜于  $A$  的人构成集合  $Y$ . 若  $Y$  中的人全部胜于  $X$  中的人, 则  $Y$  中任意一个人的胜场都比  $A$  多, 这产生了矛盾. 故存在  $X$  中的一个人胜于  $Y$  中的一个人, 即符合题意.

**例题 2.2.4** [1] 已知  $n$  ( $n \geq 3$ ) 名选手参加到一个循环赛. 每名选手均有一个由数字 1 到  $n$  的等级, 任意两名选手等级不一样. 当  $i < j$  时, 等级为  $i$  的选手总能打赢等级为  $j$  的选手. 为了让比赛更有观赏性, 组委会决定任意两名选手的比赛均由剩下的其他选手作为裁判来判决, 每名裁判判决获胜者得 1 分, 失败者得 0 分. 最终, 把所有裁判的加分相加即为每名选手的得分. 当一名选手作为裁判时, 他可以欺骗得分, 即输者给 1 分, 赢者 0 分. 但他欺骗的次数不能超过其等级数. 求  $n$  的最大值, 使得有可能让最弱的选手获得第一.

**解** 容易发现, 当完全不发生欺骗时, 1 号选手分数为  $(n-1)(n-2)$ ,  $n$  号选手分数为 0. 为了让  $n$  号的分数超过 1 号, 需要

$$2(n-2) + \left\lceil \frac{n(n+1)}{2} - (n-2) \right\rceil \geq (n-1)(n-2) + 1$$

由此解得  $\frac{9-\sqrt{41}}{2} \leq n \leq \frac{9+\sqrt{41}}{2}$ . 故  $n \leq 7$ .

例如, 在  $n=7$  时, 如下欺骗可以达到效果: (其中黑体表示实行欺骗的选手, 红体表示最终得分)

	1	2	3	4	5	6	7	$\Sigma$
1	/	7 <b>4</b>	7 <b>4</b>	7 <b>4</b>	7 <b>4</b>	6, 7 <b>3</b>	2, 3, 4, 5, 6 <b>0</b>	<b>19</b>
2	7 <b>1</b>	/	<b>5</b>	<b>5</b>	7 <b>4</b>	7 <b>4</b>	1, 3, 4, 5, 6 <b>0</b>	<b>19</b>
3	7 <b>1</b>	<b>0</b>	/	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	2, 4, 5, 6 <b>1</b>	<b>17</b>
4	7 <b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/	<b>5</b>	<b>5</b>	3, 5, 6 <b>2</b>	<b>13</b>
5	7 <b>1</b>	7 <b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/	<b>5</b>	4, 6 <b>3</b>	<b>10</b>
6	6, 7 <b>2</b>	7 <b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	/	5 <b>4</b>	<b>8</b>
7	2, 3, 4, 5, 6 <b>5</b>	1, 3, 4, 5, 6 <b>5</b>	2, 4, 5, 6 <b>4</b>	3, 5, 6 <b>3</b>	4, 6 <b>2</b>	5 <b>1</b>	/	<b>20</b>

**例题 2.2.5** [2] 对于五元整数组, 若其元素可以按某种顺序标记为  $a, b, c, d, e$ , 使得  $a - b + c - d + e = 29$ , 则称此整数组为可安置的. 确定所有 2017 元整数组  $(n_1, n_2, \dots, n_{2017})$ , 满足: 若将这 2017 个数依次按顺时针方向放在圆周上 ( $n_{2017}$  与  $n_1$  相邻), 则处于圆周上连续相邻位置的任一五元数组是可安置的.



**解** 在  $n_i$  全为 29 时明显符合题意, 于是考虑证明这是唯一的情况. 以下先乱写一通找找规律:

对于  $n_i$ , 由于  $a - b + c - d + e = 29$ , 可知

$$a + b + c + d + e = 29 - 2(b + d) \equiv 1 \pmod{2}$$

故连续 5 个数之和是奇数. 由于  $n_i + \cdots + n_{i+4}$  与  $n_{i+1} + \cdots + n_{i+5}$  都是奇数, 知  $n_i$  与  $n_{i+5}$  同奇偶. 注意到  $(5, 2017) = 1$ , 由 Bézout 定理, 所有  $n_j$  都与  $n_i$  同奇偶, 又  $a + b + c + d + e$  为奇数, 可知

$$n_1 \equiv \cdots \equiv n_{2017} \equiv 1 \pmod{2}$$

这里的条件与奇偶性相关, 可以尝试构造一直除以二的操作, 说明最后总会除成奇数与一直是偶数矛盾.

作变换  $m_i = n_i - 29$ . 于是  $m_i$  是偶数, 并且对于  $m_i$ , 条件转化为

$$a' - b' + c' - d' + e' = \frac{a-29}{2} - \frac{b-29}{2} + \frac{c-29}{2} - \frac{d-29}{2} + \frac{e-29}{2} = 0$$


注意到, 将所有  $m_i$  除以二得到的新数组也满足  $m_i$  的性质, 并且由这个性质可以推出任意  $m_i$  为偶数. 然而, 若  $m_i \neq 0$ , 最后总会得到某个奇数, 这是矛盾的. 故  $m_i = 0$ , 即只有  $n_1 = \cdots = n_{2017} = 29$  符合题意.

**例题 2.2.6** [1]  $E$  是平面上  $2n$  个点构成的集合, 其中任意三点不共线. 现将其中  $n$  个点涂成红色,  $n$  个涂成蓝色. 试证: 总可找到两两没有公共点的  $n$  条线段, 使其中每条线段的两个端点不同色.

**解** 对于任意两条两端点不同色的线段, 若它们有交点, 则依照下列方式拆开. 注意到这样拆开后两条线段的总长度严格变小, 肯定会有一个停止的点.

对于一种由红蓝点构成“两端点不同色”的线段的方法  $p$ , 记所有这样线段的总长度为  $s(p)$ .

考虑最小的  $s(p)$  及其对应的配对方式  $p$ . 假设存在两条有交点的这样的线段, 进行如下图所示操作, 得到一种新的配对方式  $p'$ . 因为三角形任两边之和大于第三边, 可知  $s(p') < s(p)$ . 这与条件矛盾, 故由  $p$  配对得到的  $n$  条线段两两不相交.



**例题 2.2.7** [1] 一次聚会中, 每四个人中均存在三个人要么认识, 要么不认识, 认识是相互的. 证明: 将参加聚会的所有人分在两个房间内, 使得一个房间中的人均互相认识, 在另一个房间中没有一个人认识其他人.

**解** 设  $A$  是满足内部互相认识的最大房间, 其中有  $a_1, \cdots, a_m$  这些人; 剩下的人  $b_1, \cdots, b_n$  组成  $B$ .

1° 若  $B$  中只有一个人, 自然原命题成立.

2° 若  $B$  中有多于一个人, 不失一般性, 假设  $b_1$  认识  $b_2$ . 由于  $A$  是最大的满足条件的房间, 在  $A$  中必有人不认识  $b_1$  与  $b_2$ , 分两种情况讨论 (不失一般性地):

设  $a_1$  不认识  $b_1$ ,  $a_2$  不认识  $b_2$ , 如图 1 所示. 这四个人的关系与题目条件矛盾;

设  $a_1$  不认识  $b_1$  与  $b_2$ , 任取  $a_i \in A$  考虑, 如图 2 所示. 若要满足题目条件, 必有  $a_i$  认识  $b_1$  与  $b_2$ , 这意味着任意的  $a_i \in A$  都认识  $b_1$  与  $b_2$ , 故  $b_1$  与  $b_2$  也在  $A$  中, 与  $A$  的性质矛盾.

综上, 假设不成立, 即  $B$  中所有人都互不认识.




图1




图2

**例题 2.2.8** [1] 某届象棋比赛共有 64 名选手参赛. 每两名选手赛一场 (允许平局). 所有比赛结束后, 已知对所有以平局结束的比赛双方, 剩余的 62 名选手均至少战胜过这两名选手之一, 且至少有两场比赛以平局结束. 证明: 可将所有的选手排成一列, 使得每名选手战胜过他后面的那一位选手.

**解** 我们希望找到一个最长的链条  $A_1 \rightarrow \cdots \rightarrow A_n$ , 当  $n = 64$  时, 题目结论即成立.

假设存在最长的一个链条  $A_1 \rightarrow \cdots \rightarrow A_n$  ( $n < 64$ ). 设在此链条之外还有元素  $B$ .

1° 若  $A_1, \cdots, A_n$  与  $B$  之间没有平局, 如图 1 所示. 由于  $A_1$  必战胜  $B$  (否则  $B$  就在链条的第一个), 可知  $B$  不能战胜  $A_2, \cdots, A_n$  (否则就会产生一个更长的链条), 于是  $B$  可以被排在最后一位, 这与假设矛盾.

2° 第 1 步: 若只有  $A_1$  与  $B$  平局, 如图 2 所示. 由题目条件知  $A_2, \cdots, A_n$  均战胜  $B$ , 于是  $B$  可以被排在最后一位, 这与假设矛盾.

假如有另一个  $A_k$  ( $k \neq 1$ ) 也与  $B$  平局, 如图 3 所示, 那么对于  $A_1 - B$  的平局,  $A_k$  应战胜  $A_1$ , 而对于  $A_k - B$  的平局,  $A_1$  应战胜  $A_k$ , 它们是矛盾的, 故不存在一个人有两场平局的情况.

第  $k$  步: 若只有  $A_k$  ( $k < n$ ) 与  $B$  平局, 如图 4 所示, 与第 1 步同理, 可知必有  $A_1, \cdots, A_{k-1}, A_{k+1}, \cdots, A_n$  战胜  $B$ , 于是  $B$  可以被排在最后一位, 这与假设矛盾.

第  $n$  步: 若只有  $A_n$  与  $B$  平局, 如图 5 所示. 由题可知, 此时还有一个平局, 由于  $A_1, \cdots, A_{n-1}, B$  之间无法发生平局, 一定存在链条之外的另一个元素  $C$  使得  $C$  与  $A_i$  ( $i < n$ ) 发生平局, 这回到了第  $k$  步.

综上, 假设不成立, 即最长的链条一定包括全部 64 名选手, 这就是题目要求的链条.




图1




图2




图3




图4




图5

## 第四部分

## 数论部分