



## Pintando la pared

Para pintar una pared de su habitación, Jorge ha decidido seguir el siguiente procedimiento: Moja el rodillo en pintura, lo coloca horizontalmente en un punto arbitrario de la pared, y lo hace rodar hasta llegar al suelo. Después de un rato pintando de este modo, la zona pintada de la pared es un conjunto de rectángulos solapados que llegan hasta el suelo de la habitación, y Jorge se pregunta cuál será su área total.

### Entrada

La entrada está formada por distintos casos de prueba, y cada caso de prueba consiste en una única línea con varios números. El primer número de cada línea es un entero  $A$ , ( $1 \leq A \leq 5000$ ) que indica la anchura del rodillo. El siguiente número es un entero  $N$  ( $1 \leq N \leq 1000$ ) que indica el número de veces que se pasa el rodillo por la pared. A continuación aparecen  $N$  parejas de números enteros  $(x_i, y_i)$ ,  $i = 1, \dots, N$ . Cada pareja indica las coordenadas en la pared en las que se sitúa el lado izquierdo del rodillo en cada una de las pasadas. Las coordenadas  $x = 0$ ,  $y = 0$  corresponden a la esquina inferior izquierda de la pared. Se cumplen las condiciones  $0 \leq x_i \leq 20000$  y  $1 \leq y_i \leq 1000$ .

El final de la entrada se indica con una línea con un único 0 que no se debe procesar.

### Salida

Para cada caso de prueba, se escribirá una línea con un número entero igual al área de la región pintada de la pared.

### Entrada de ejemplo

```
10 2 10 20 15 10
10 3 10 5 12 20 13 10
0
```

### Salida de ejemplo

```
250
220
```