

**Instrucciones:** La duración del ejercicio es de 50 minutos. Entrega tu solución en moodle, en un único archivo en formato pdf. Al elaborar tu solución, ten en cuenta lo siguiente:

- Durante el ejercicio puedes preguntar dudas en Teams, tanto a los profesores como al resto de tus compañeros. Lo que escribas tienes que hacerlo individualmente.
- Presta atención, si puedes, a los aspectos formales de lo que escribes y no solo a su contenido. Vamos a leer el ejercicio en detalle y a darte *feedback* sobre lo que escribes, pero también sobre cómo lo escribes.
- Aunque debes entregar el ejercicio antes de que termine el tiempo asignado, si decides pensar un poco más y se te ocurren ideas nuevas puedes enviar una nueva versión después.

**Objetivo del ejercicio:** Entender la estructura de la familia de factores integrantes de una ecuación de primer orden. Y practicar la regla de la cadena.

**Definición:** Una ecuación de la forma

$$M(x, y) + N(x, y)y'(x) = 0$$

es exacta si existe una función  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$\nabla F(x, y) = (M(x, y), N(x, y)).$$

**Enunciado:** Supongamos que la función  $\mu : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  es un factor integrante de la ecuación

$$(1) \quad M(x, y) + N(x, y)y'(x) = 0,$$

y sea  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$$\nabla F(x, y) = (\mu(x, y)M(x, y), \mu(x, y)N(x, y)).$$

- (a) Demostrar que  $c\mu$  es un factor integrante de (1) para toda constante no nula  $c$ .
- (b) Demostrar que  $F\mu$  es un factor integrante de (1).
- (c) Sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función de clase  $C^1$ . Demostrar que  $g(F)\mu$  es un factor integrante de (1).
- (d) Sea  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función integrable. Demostrar que  $g(F)\mu$  es un factor integrante de (1).