家庭血压监测·患教单

编号 P7 | 核对日期 2026-10-30 | 核对状态：教学来源核对

教学草稿 —— 医生签署：未签署。仅供教学演示，不可直接发给患者使用。

一、在家测血压，不能代替看医生

- 家庭监测**不能替代**医生随访，请按医生安排定期复诊。（F01）

二、测量前 30 分钟

- 不吸烟、不喝含咖啡因的饮料（如咖啡、浓茶）、不运动。（F04）
- 测前排空膀胱，坐下来安静休息**至少 5 分钟**再测。（F05）

三、怎么测

- 用**经验证的上臂式**自动血压计，袖带大小要合适。（F03）
- 袖带直接贴在上臂皮肤上，**不要隔着衣服**测。（F06）
- 手臂要有支撑（如放在桌上），袖带中部与心脏**同一高度**。（F07）
- 测量时保持安静：**不说话、不用手机**。（F08）
- **每次测量取两次读数，两次之间隔 1 分钟**，并把结果记下来。（F09）

四、记下来，带去复诊

- 把测量记录带上（最好连血压计一起），和医疗人员一起核对。（F10）
- **不要仅因家里测的读数变化，就自行停药**；任何用药调整，先和医疗人员商量。（F02）

五、请医生填写（我还没有医嘱，请勿自行填写）

我的随访日期	_ _ _ _ _ _ 年 _ _ 月 _ _ 日
科室电话	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
我一天测几次、什么时间测 （具体频次由医疗人员确定）	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
医生签名 / 盖章	_ _ _ _ _ _ _ _（未签署）

来源：美国心脏协会（AHA）“Monitoring your blood pressure at home”（home monitoring / how to use a home blood pressure monitor），教学来源核对 2026-10-30。本单只包含该来源中的内容：不含急诊/就医阈值，不含停药建议；个体情况（包括一天测几次）请遵医嘱。修订说明：原稿“测两次”经患者回述发现易被误解为“一天测两次”，已改为“每次测量取两次读数，间隔 1 分钟；一天测几次按医生安排”。