家庭血压测量指导

患者与照护者用 · 请把这张纸放在血压计旁边

一、测量前准备

1. 用经过验证的上臂式电子血压计，袖带大小要合适；特殊人群先问医生这台血压计是否适合。
2. 测量前 30 分钟内：不吸烟、不喝含咖啡因的饮料、不运动。
3. 先去厕所排空小便，再坐下安静休息至少 5 分钟。

二、测量时注意

4. 按设备说明放好袖带，直接贴在上臂皮肤上，不隔着衣服量。
5. 手臂放桌上放稳，袖带中间和心脏同样高。
6. 测量时保持安静：不说话，不看手机。

三、读数和记录

7. 量 1 次血压＝连着量 2 遍，两遍中间隔 1 分钟，把 2 遍的数都记在记录本上。
   这里的两遍不代表每天的测量次数；每天几次、什么时间测按医生安排，请医生帮您写在下面的空格里。

四、复诊时

8. 带上血压记录本和血压计，和医生一起核对。不要只凭一次读数自己下诊断。
9. 在家量血压不能代替去医院随访。
10. 不要自己改药或停药；用药调整先和医生商量。

出现以下情况，请立即就医或拨打 120（由医生填写并签字）：

_____

_____

下次随访日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日 _____

科室联系电话：_____

每天测量几次、什么时间测：_____

来源：美国心脏协会（AHA）家庭血压监测页面（2026-10-30核对）；以医生意见为准。