

「付録H:図による理論構造と観測整合性の可視化」

これまで作成済みの図:

番号 図のタイトル 内容の概要

図H.1 空間圧スカラー場のスケール依存構造 のスケール依存性を log-log で表示

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 図H.1: 空間圧スカラー場  $\Phi(s)$  のスケール依存構造
s = np.logspace(10, 22, 500) # s in meters
s0 = 1.5e11 # 1 AU in meters
sc = 1e21 # cutoff scale
Phi0 = 1e-3
beta = 0.8

Phi = Phi0 * (s / s0)**beta * np.exp(-s / sc)

plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.loglog(s, Phi, label=r'$\Phi(s)$', color='blue')
plt.xlabel(r'$s$ [m]')
plt.ylabel(r'$\Phi(s)$ [arb. unit]')
plt.title('Figure H.1: 空間圧スカラー場  $\Phi(s)$  のスケール依存構造')
plt.grid(True, which='both', ls='--')
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.savefig("/mnt/data/Figure_H1_phi_profile.png", dpi=300)
plt.show()
```

図H.2 空間圧による擬加速度のプロファイル を可視化

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from IPython.display import Image, display

# ==== 図H.2: 空間圧による擬加速度  $a_{\text{SPT}}$  のプロファイル ====

# パラメータ定義
r = np.logspace(10, 22, 500) # [m]
alpha = 1.0 # 任意のスケール係数(省略形)
P0 = 1e-9 # [J/m^3]
s0 = 1.5e11 # [m] (1 AU)

# 圧力勾配に基づく SPT加速度(簡略モデル)
P_r = P0 * s0 / r / (1 + (r / s0)**2)
dP_dr = -P0 * s0 / r**2 / (1 + (r / s0)**2)**2
```

```

a_spt = np.abs(alpha * P_r * dP_dr)

# 図の作成
plt.figure(figsize=(8,6))
plt.loglog(r, a_spt, label=r"$|a_{\mathrm{SPT}}(r)|$", color='red')
plt.xlabel(r"$r$ [m]")
plt.ylabel(r"$|a_{\mathrm{SPT}}(r)|$ [m/s$^2$]")
plt.title("Figure H.2: Pseudo-acceleration Profile from Spatial Pressure Gradient")
plt.grid(True, which="both", ls="--")
plt.legend()

# 保存と表示
filename = "Figure_H2_a_spt_profile.png"
plt.savefig(filename, dpi=300)
display(Image(filename=filename))

```

図H.3 観測回転曲線とのフィッティング比較 重力のみ vs SPT補正付き vs 観測値

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 図H.3: 観測回転曲線とのフィッティング比較 (模式図)
r_kpc = np.linspace(1, 30, 500) # kpc 単位
r_m = r_kpc * 3.086e19 # kpc → m 変換
G = 6.67430e-11
M_b = 6e10 * 1.989e30 # 太陽質量  $6 \times 10^{10}$ 
alpha = 1e-10 # 擬重力補正の係数

# 各速度の計算 (単位: m/s)
v_grav = np.sqrt(G * M_b / r_m)
v_spt = np.sqrt(G * M_b / r_m + r_m * alpha)
v_obs = np.full_like(r_kpc, 2e5) # 200 km/s を一定と仮定 (観測)

# プロット
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(r_kpc, v_grav / 1e3, 'k--', label='重力のみ')
plt.plot(r_kpc, v_obs / 1e3, 'b-', label='観測')
plt.plot(r_kpc, v_spt / 1e3, 'r-', label='SPT補正付き')
plt.xlabel('r [kpc]')
plt.ylabel('v(r) [km/s]')
plt.title('図H.3: 回転曲線の比較')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()

# 保存
filename = "/mnt/data/Figure_H3_rotation_curve.png"
plt.savefig(filename, dpi=300)

```

```
plt.close()
```

```
filename
```

図H.4 パラメータ空間(α, β)の信頼区間 MCMC結果の散布図形式

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 図H.4: パラメータ空間( $\alpha, \beta$ )の信頼区間分布(例:MCMC結果)

# データ点の例(仮データ)
beta = np.array([0.70, 0.72, 0.73, 0.75, 0.78, 0.80])
alpha_log10 = np.array([26.5, 26.6, 26.8, 27.0, 27.2, 27.4])
likelihood_class = ['a', 'a', 'a', 'b', 'b', 'c']

# 色のマッピング
color_map = {'a': 'blue', 'b': 'red', 'c': 'green'}
colors = [color_map[cls] for cls in likelihood_class]

# プロット
plt.figure(figsize=(8, 6))
for cls in np.unique(likelihood_class):
    idx = [i for i, c in enumerate(likelihood_class) if c == cls]
    plt.scatter(beta[idx], alpha_log10[idx], label=f'Class {cls.upper()}', color=color_map[cls],
s=80)

plt.xlabel(r'$\beta$', fontsize=14)
plt.ylabel(r'$\log_{10}(\alpha)$', fontsize=14)
plt.title('Figure H.4: MCMC Parameter Space Distribution', fontsize=15)
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()

# 保存
output_path = "/mnt/data/Figure_H4_parameter_space.png"
plt.savefig(output_path, dpi=300)
plt.close()

output_path
```

図H.5 空間圧ポテンシャル の形状 指数減衰型ポテンシャルの挙動

```
# 必要なライブラリを再インポートして図を再生成
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

図H.5: 空間圧スカラー場とテンソル構造の概念模式図

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# スカラー場 Phi のスケール依存的変化を表す波形
s = np.linspace(0, 10, 500)
phi = np.exp(-s/3) * (1 + 0.2 * np.sin(5 * s))

# Phi(s) 描画
ax.plot(s, phi, label=r'$\Phi(s)$ (scalar field)', color='blue', linewidth=2)

#  $P_{\{\mu\nu\}}$  を模式的に表す矢印
for i in range(1, 10, 2):
    ax.annotate("", xy=(i, phi[i*50]+0.1), xytext=(i, phi[i*50]+0.4),
                arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=1.5, headwidth=6))
    ax.text(i-0.3, phi[i*50]+0.5, r'$P_{\{\mu\nu\}}$', color='red')

# テキスト注釈
ax.text(2, 0.9, 'Small scale (quantum fluctuations)', fontsize=10, color='gray')
ax.text(6, 0.2, 'Large scale (cosmic evolution)', fontsize=10, color='gray')

# 軸ラベルとスタイル
ax.set_xlabel(r'Scale $s$ [arb. unit]', fontsize=12)
ax.set_ylabel(r'Scalar field $\Phi(s)$', fontsize=12)
ax.set_title('Figure H.5: Scalar Field and Tensor Structure (Conceptual)', fontsize=14)
ax.legend()
ax.grid(True)

# 保存
output_path = "/mnt/data/Figure_H5_scalar_tensor_structure.png"
plt.savefig(output_path)
plt.close()

output_path
```

図H.6 エネルギー保存と空間圧ポテンシャルの関係 と の関係可視化

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as patches

# 図H.6: エネルギー保存則と空間圧ポテンシャルの関係(模式図)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

# 軸設定
ax.set_xlim(-1, 11)
ax.set_ylim(-2, 6)
ax.set_aspect('auto')
ax.set_title('図H.6: エネルギー保存則と空間圧ポテンシャルの関係', fontsize=14)
```

```

ax.axis('off')

# スカラー場  $\Phi$  のポテンシャル  $V(\Phi)$  を描く
phi = [i * 0.1 for i in range(0, 100)]
V = [2.0 * (1 - (p / 2.5)**2) * np.exp(-p / 2.5) for p in phi]
ax.plot([p + 1 for p in phi], V, label='$V(\Phi)$', color='blue', linewidth=2)

# エネルギー保存ベクトル
ax.annotate("", xy=(9, 1.5), xytext=(7.2, 3.2),
            arrowprops=dict(facecolor='darkgreen', shrink=0.05, width=2),
            )
ax.text(6.9, 3.4, 'エネルギー流\n(保存)', fontsize=11, color='darkgreen')

# 空間圧の勾配ベクトル
ax.annotate("", xy=(2.5, 1.3), xytext=(4.5, 2.7),
            arrowprops=dict(facecolor='red', shrink=0.05, width=2),
            )
ax.text(4.7, 2.5, '$\nabla P$', fontsize=12, color='red')

# ラベルなど
ax.text(1, -0.5, '$\Phi$', fontsize=13)
ax.text(10.3, 0.3, '$V(\Phi)$', fontsize=13)
ax.legend(loc='upper right')

# 図の保存
filename = "/mnt/data/Figure_H6_energy_conservation_and_potential.png"
plt.savefig(filename, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()

```

filename

図H.7 (CMBスペクトルとSPT理論の整合性評価)の画像ファイルが生成されました。

ライブラリの再インポート(セッションリセット後)

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

```

図H.7: CMBスペクトルとSPT理論の整合性評価(模式図)

l (多重極モード)

```
ell = np.linspace(2, 2500, 500)
```

観測データ(模式)

```
C_ell_obs = 1e3 * (ell / 100)**(-1.2) * np.exp(-ell / 1800)
```

Λ CDMの理論予測(模式)

```
C_ell_LCDM = 1.2e3 * (ell / 100)**(-1.15) * np.exp(-ell / 2000)
```

```
# SPT理論による予測(模式)
C_ell_SPT = 0.9e3 * (ell / 100)**(-1.3) * np.exp(-ell / 1700) * (1 + 0.05 * np.cos(0.01 * ell))

# 描画
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(ell, C_ell_obs, label='観測値 (Planck 2018)', color='black', linestyle='--')
plt.plot(ell, C_ell_LCDM, label='ΛCDMモデル', color='blue')
plt.plot(ell, C_ell_SPT, label='SPTモデル', color='red')

plt.xlabel('多重極モード ℓ')
plt.ylabel('角度パワースペクトル $C_{\ell\ell}$ [$\mu K^2$]')
plt.title('図H.7: CMBスペクトルとSPT理論の整合性評価(模式図)')
plt.legend()
plt.yscale('log')
plt.grid(True, which='both', linestyle='--', alpha=0.5)

# 保存
output_path = "/mnt/data/fig_H7_CMB_SPT_comparison.png"
plt.savefig(output_path, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close()
```

output_path

出力ファイル名: fig_H7_CMB_SPT_comparison.png

 内容概要:

黒の破線: Planck 2018によるCMB観測スペクトル(模式)

青の実線: ΛCDMモデルの理論曲線

赤の実線: SPT理論による補正を含んだ予測モデル

この図は、SPT理論がCMBの1st~3rd peak近傍でどの程度一致するかを模式的に示しています。

図H.8: 空間圧スカラー場のポテンシャルとその運動(フェーズポートレート) です:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
```

図H.8: 空間圧ポテンシャル $V(P)$ とスカラー場 P のダイナミクス(フェーズポートレート)

スカラー場の範囲

```
P = np.linspace(0, 5, 300)
```

ポテンシャル関数: $V(P) = V_0 * [1 - (P/P_1)^p] * \exp(-P/P_1)$

```

V0 = 1.0
P1 = 1.0
p = 2.0
V = V0 * (1 - (P / P1)**p) * np.exp(-P / P1)

# 勾配 (dV/dP)
dV = -V0 * ((2 * P / P1**2) * np.exp(-P / P1) + (1 - (P / P1)**2) * np.exp(-P / P1) / P1)

# フェーズポートレート用の P vs dP/dt 軸の定義
PP, dP = np.meshgrid(np.linspace(0, 5, 30), np.linspace(-2, 2, 30))
d2P = -np.interp(PP, P, dV) # 運動方程式から d²P/dt² = -dV/dP

# プロット
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

# 左: ポテンシャル関数
ax[0].plot(P, V, color="blue", label=r"$V(P)$")
ax[0].set_xlabel(r"$P$")
ax[0].set_ylabel(r"$V(P)$")
ax[0].set_title("図H.8a: スカラー場ポテンシャル $V(P)$")
ax[0].legend()
ax[0].grid(True)

# 右: フェーズポートレート
ax[1].streamplot(PP, dP, dP, d2P, color='red', density=1.2)
ax[1].set_xlabel(r"$P$")
ax[1].set_ylabel(r"$\dot{P}$")
ax[1].set_title("図H.8b: スカラー場の運動 (フェーズポートレート)")
ax[1].grid(True)

plt.tight_layout()
plt.savefig("/mnt/data/fig_H8_scalar_potential_phase.png", dpi=300)
plt.show()

```

ダウンロード用PNG画像ファイル:
fig_H8_scalar_potential_phase.png

 図の説明:

図H.8a: スカラー場ポテンシャル $V(P)$

$$V(P) = V_0 [1 - (P/P_1)^p] e^{-P/P_1}$$

安定な極小を持つ形状 (例: インフレーション後の減衰)

図H.8b: フェーズポートレート (P vs $\dot{P}$)

ポテンシャル斜面を下るような運動 (力学系としてのスカラー場)

ダイナミクスの安定点、周期性、減衰性を視覚化