

三维大尺度结构中的宇宙学与基础物理

Cosmology and Fundamental Physics from the Three Dimensional Large Scale Structure

01	ORIGINAL AUTHORS / 原作者 S. Ferraro et al.
02	ARXIV / 文献编号 2203.07506
03	DOI 未提供 / Not Provided
04	ORIGINAL SOURCE / 原文链接 https://arxiv.org/abs/2203.07506
05	CHINESE CONTRIBUTOR / 中文翻译贡献者 WangTheoPhys*
06	TRANSLATION PAGE / 本论文译文页 snowmass-physics-cn.netlify.app/paper/2203.07506/
07	EDITION / 翻译版本 试译版 v0.1 · 2026-08-12
08	SOURCE LICENSE / 原文许可证 CC BY 4.0 · 署名 / Attribution · 注明修改 / Indicate Changes

本论文译文页 / TRANSLATION PAGE
snowmass-physics-cn.netlify.app/paper/2203.07506/
扫码访问 · SCAN TO OPEN



本译文由中文翻译协作项目制作，不代表原作者审定或认可；如有歧义，以英文原文为准。

This translation has not been reviewed or endorsed by the original authors. In case of ambiguity, the English original prevails.

Snowmass 2021 宇宙学前沿白皮书：基于三维大尺度结构的宇宙学与基础物理

Simone Ferraro^{1,2}, Noah Sailer^{2,1}, Anže Slosar³, Martin White

^{2,1}代表 Snowmass 2021 宇宙学前沿第4专题组

¹劳伦斯伯克利国家实验室，回旋加速器路一号，伯克利，加利福尼亚州94720，美国²加利福尼亚大学伯克利分校物理系，伯克利宇宙学物理中心，伯克利，加利福尼亚州94720，美国³布鲁克海文国家实验室物理系，厄普顿，纽约州11973，美国

2022年9月13日

摘要

实验技术的进步使得在不久的将来能够以高保真度在三维空间中绘制高红移（redshift）宇宙成为可能。这将使观测体积增加数倍，同时提供前所未有的超大尺度探测能力，而这些尺度蕴含着关于原初物理的关键信息。最近发展的理论技术，加上高红移处非线性效应的规模较小，使得能够重建数量级更多的“原初模式”，并应通过测量原初非高斯性和原初功率谱中的特征来增进我们对早期宇宙的理解。除了探测第一次加速膨胀时期外，此类测量还可以探测暗物质（dark matter）主导纪元中的暗能量（dark energy）密度，从而严格约束多类动力学暗能量模型。物质功率谱本身的形状有可能探测到亚百分比级别的早期暗能量份额，直至 $z \sim 10^5$ ，从而将暗能量探测延伸至宇宙年龄仅为数年的时期。这些测量的精度，结合宇宙微波背景观测，也有望大幅提高我们对有效相对论性粒子种类数、中微子质量、空间曲率大小以及引力滑移的约束。利用红移巡天和宇宙微波背景对线性或准线性大尺度结构的研究，目前为我们提供了对宇宙学和基础物理最严格的约束。推进红移和体积的前沿，将以易于预测和优化的方式，保证在最先进水平上取得显著改进。

1 引言

非均匀宇宙，通过宇宙微波背景（CMB）辐射中的涨落或大尺度结构（LSS）巡天来探测，为我们提供了

超高能下基础物理的窗口。对暗能量最严格的约束、轻暗物质粒子的质量上限、暴胀模型、中微子 (neutrino) 质量以及轻遗迹粒子的约束，均来自这两项测量中的一项或两项。探测器 (detector) 技术和实验技术的持续进步正推动我们进入一个新的领域，使得在红移窗口内能够利用相对论性和非相对论性示踪天体绘制大尺度结构。 $2 < z < 6$ 这将使我们能够以高精度探测度规、粒子含量以及两个加速膨胀纪元（暴胀和暗能量主导），且该领域不受理论限制。

来自宇宙微波背景和大尺度结构的宇宙学约束已发展成熟，并能对处于线性或准线性区域内的模作出准确预测。它们包括对膨胀历史和曲率的约束 [1], 原初非高斯性 [2, 3], 功率谱中的特征（原初 [3, 4] 或诱导的 [5, 6]）或谱指数的运行 [7, 8], 暗能量在趋近物质主导时期的表现 [9], 暗物质相互作用 [10, 11], 轻遗迹粒子与中微子质量 [12, 13] 以及修正引力[14, 15]理论界已强调，我们可通过多种途径观测到标准模型 (standard model) 之外的物理证据，但目前尚无任何一条途径显得更具说服力。尽管我们尚不清楚这些众多探针中哪一个最有可能发现新物理，但已被充分理解的唯象学使我们能够预测灵敏度将在何处达到最高、推断在何处最为清晰。这相当于最大化我们 S/N 对新物理的探索，不是试图寻找 S 最大的位置，而是确定 N 最小的位置。为在推断最清晰、噪声最低之处开展工作，我们应推进至高红移的新前沿。

向更高红移推进使我们能够利用四个同时出现的趋势。（1）红移方向上更宽的杠杆臂使简并方向旋转，从而收紧约束。（2）过去光锥上的体积急剧增加，对样本方差受限模的约束更紧，并在尺度上提供更长的杠杆臂。（3）非线性程度更小，场与早期宇宙的相关性更好，受天体物理过程的影响也更小。（4）基于高能粒子物理学中熟悉原理构建的极高精度微扰模型越来越适用。事实上，在高红移下，通过大体积巡天，我们越来越多地探测到线性或准线性的长波长模，这些模携带着来自早期宇宙的相位信息，而这些信息尚未被非线性演化永久抹去。

量化未来大型巡天可能带来的原初物理信息是 N_{mode} 本白皮书的关键目标。由于非线性演化、天体物理过程和噪声导致与初始条件的去相关，从而在小尺度上丢失信息，与初始条件相关的有效模式数随红移增加而增加。我们使用附录10中引入的“原初物理品质因数” (Primordial FoM) 来量化这一点，该品质因数与可测量且与初始条件相关的模式数成正比，并适当考虑了测量中的噪声和非线性导致的去相关。

在§2中简要介绍能够实施大N计划的探测手段和设施之后，我们在§3中阐述我们的预测假设。本白皮书的其余部分探讨了利用高红移大尺度结构（原则上）可获得的数十亿线性或准线性模来约束早期宇宙物理的后果。

结构巡天。我们在§4中讨论了对密度涨落的约束能力。我们在§5中讨论对暴胀的约束，并在§6中讨论对膨胀历史的约束。在§7中，我们展示了观测高 z 红移宇宙如何能够变革我们对暗能量的研究。对中微子质量、轻遗迹粒子以及标准模型其他扩展的限制在§8中讨论。高红移星系巡天与未来大天区、低噪声CMB巡天（如CMB-S4 [10], 或更具雄心的提议如CMB-HD[16] 或PICO [17]）之间的协同作用在第§9节中进行了探讨。

2高红移宇宙学探针

2.1 机遇

我们预计，将首先通过深度成像巡天和宇宙微波背景透镜效应来绘制高红移处的大尺度结构，充分利用社区在Rubin LSST上的投资 [18],CMB-S4 [10]以及其他设施。即将开展的实验将能够对高于 $z \approx 2$ 的结构增长提供百分级水平的约束，利用互相关方法[19]。有限的光谱后续观测将能够约束 dN/dz ，以解释互相关结果。然而，最终目标将是利用光谱红移释放3D巡天的全部潜力。虽然我们的目标并非倡导某种特定的观测方法，但我们将提及三种技术，它们可用于追踪大尺度结构，并可通过下一代设施进行光谱观测。首先，基于LSST的深度成像 [18]和Euclid [20], 我们可以瞄准¹ 莱曼断裂星系 [19]。这些星系数量丰富，研究充分且理解透彻，代表了质量巨大、活跃的恒星形成星系，其光度（luminosity）近似与其恒星质量成正比。相当一部分星系具有明亮的发射线，这有助于获取红移 [19]。早期恒星形成星系也可能受到尘埃遮蔽，吸收大量恒星光学光并在红外波段重新辐射。静止系远红外谱线，如CO转动跃迁和 [CII] 精细结构谱线，同样可用于通过毫米波段光谱学确定红移 [21, 22]。这些谱线很亮，已在单个星系中探测到，直至 $z \sim 7$ ，但谱线混淆的可能性令人担忧。最后，宇宙中大部分重子物质以氢的形式存在。中性氢主要存在于星系中，通过21 cm超精细磁偶极跃迁发射（另见专门的Snowmass2021白皮书 [23]）。这条谱线很弱且波长较长，需要大的集光面积才能探测到它，但一旦能够探测到该谱线，吸收或混淆效应就很小。[8, 9]。

2.2大尺度结构实验

未来的实验将建立在DESI光谱学的强大遗产之上， [24],Euclid [20] 和SPHEREx [25] 将测量发射线星系的红移，覆盖

¹LSST和Euclid“扩展”的后续成像在多大程度上会增强这一科学案例，仍是一个悬而未决的问题。

至少10,000平方度，直至 $z \simeq 2.7$ 。这些实验的组合，探测光学和近红外波段，将测量在红移介于1和2之间可及的绝大多数线性模，其精度接近样本方差受限水平。

未来的星系红移巡天可显著拓展红移前沿。虽然DESI-II [26] 将启动这一计划，但未来的设施，包括MegaMapper [27], 莫纳克亚光谱巡天望远镜（MSE; [28]）和SpecTel [29], 将是真正利用这一潜力的必要条件。为实现本文所述科学目标而制定的光谱学路线图最近已被提出 [30]。MegaMapper是一种拟议中的高多路复用光谱仪器，旨在覆盖 $2 < z < 5$ 。它结合了6.5 m望远镜孔径与 $\sim 20\text{K}$ 根光纤。MegaMapper在拉斯坎帕纳斯观测台（observatory）的位置将确保与鲁宾观测台完全重叠，覆盖约14,000平方度。MSE配备有 11.25 m 镜面和一个 1.5 平方度的视场，能够同时观测数千个天体，使用多达 $\sim 16,000$ 根光纤（取决于设计）。MSE将测量从360到950纳米的光谱，探测星系至 $z = 3$ 覆盖10,000平方度。SpecTel 是一项拟议中的南半球光谱巡天，它将把11.4 m的碟形天线（视场为5平方度）与15,000根光纤耦合。它将在360至1330纳米范围内获取光谱。

毫米波谱线强度映射（LIM）从 $80 - 300\text{GHz}$ 能够探测 $0 < z < 10$ 利用多条CO谱线和 [CII]（参见专门的Snowmass白皮书[22]）。虽然探路者仪器仍在部署之中，宇宙微波背景领域在扩大探测器数量和观测策略方面的深厚传承，将使得在10-15年的时间尺度上部署更加强化的巡天成为可能。此外，现有的5 - 10位于优秀毫米波观测站点（南极、阿塔卡马沙漠）的米级宇宙微波背景设施，能够巡天覆盖 $\sim 70\%$ 的天空，可以被重新利用，从而以适中的成本进行部署。例如，一个完全填充南极望远镜视场的接收器可以容纳2800密集排列的 $R \sim 300$ 片上光谱仪，而CMB-S4大孔径望远镜可以容纳34000。

密集超宽带测绘阵列（PUMA）是一套21厘米干涉仪，能够将大尺度结构测绘到 $z \approx 6$ [8, 9]。完整仪器（PUMA-32K）由32,000个六米抛物面天线组成，可在赤纬方向转向，配备0.2 - 1.1GHz带宽接收机，这些接收机位于六方密排晶格的格点上，50%填充率。一个更小的、5,000-碟版本的实验（PUMA-5K），其科学覆盖范围有所缩减，也在设想之中。在其完整配置下，经过五年的巡天，PUMA的总噪声将等效于对2.9十亿个星系进行光谱巡天至 $z = 6$ 。

接下来，我们将对星系巡天和21 cm强度映射做出明确的预测，以比较不同技术的优势。由于对这些技术以及LIM的预测并非使用相同的预测机制进行的 [31, 32], 我们不直接报告LIM的预测结果。我们注意到，LIM将与21 cm共享许多源于前景滤波需求的共同特征。然而，在细节上，LIM有不同的分析问题：虽然21 cm最可能受限于我们校准仪器的能力，但微波LIM的主要挑战是干扰谱线和有限的光谱分辨率。

我们将使用第2节中的数密度、偏置假设和噪声水平[33]。虽然这些是我们目前的最佳估计，但星系种群的性质

在高红移处，相关观测存在相当大的不确定性，而得益于DESI、HSC、HETDEX及其他巡天的观测，我们预计在不远的将来对此的理解将显著提升。我们对HI在高红移处如何示踪宇宙网的方式所持有的不确定性甚至更大，因此来自探路者仪器的约束将更为重要。

3 预测假设

我们遵循 [33] 的预测形式体系来获得宇宙学预测，使用公开代码 FishLSS²。我们用 $P_{gg,i}(z) = P_{gg}(k_i, \mu_i, z)$ 。我们将实验划分为红移区间 $\{B_\alpha; \alpha = 1, 2, \dots\}$ ，然后针对每一组参数 $\{p_a\}$ 计算每个区间的 Fisher 矩阵：

$$F_{ab}(B_\alpha) = \sum_{ij} \frac{\partial P_{gg,i}(z)}{\partial p_a} C_{ij}^{-1}(z) \frac{\partial P_{gg,j}(z)}{\partial p_b} \Big|_{z=z_\alpha} \quad \text{where} \quad C_{ij}(z) = \delta_{ij}^K \frac{4\pi^2}{k_i^2 V_\alpha dk_i d\mu_i} [P_{gg,i}(z) + N_i(z)]^2. \quad (1)$$

其中 V_α 是红移 B_α 处区间的共动体积， z_α 是红移， $N_i(z)$ 是噪声，假设其在区间内为常数 B_α 。

最终的费雪信息矩阵通过对红移区间求和得到：

$$F_{ab} = \sum_{\alpha} F_{ab}(B_\alpha). \quad (2)$$

我们假设这些分箱足够大，使得不同红移分箱之间的协方差可以忽略不计。对于所有实验，我们假设 $k_{\min} = \max(0.003 h \text{ Mpc}^{-1}, \pi/V_\alpha^{1/3})$ 。除非另有明确说明，对于所有实验，我们假设 $k_{\max}(z) = k_{\text{nl}}(z)$ ，其中 $k_{\text{nl}}(z) = 1/\Sigma(z)$ 是泽尔多维奇近似中由均方根位移设定的非线性尺度。在预测HI巡天时，我们还加入了一个前景楔形区域 [34]，它进一步限制了积分的范围：

$$k_{\parallel} > \max \left[k_{\perp} \frac{\chi(z)H(z)}{c(1+z)} \sin(\theta_w(z)), k_{\parallel}^{\min} \right] \quad \text{where} \quad \theta_w(z) = N_w \frac{1.22}{2\sqrt{0.7}} \frac{\lambda_{\text{obs}}}{D_{\text{phys}}}. \quad (3)$$

$\lambda_{\text{obs}} = (1+z) 21 \text{ cm}$ 是观测波长， $D_{\text{phys}} = 6 \text{ m}$ 是天线物理直径。对于每个HI巡天，我们考虑“乐观”和“悲观”前景情形，其中 $N_w = 1$ ， $k_{\parallel}^{\min} = 0.01 h \text{ Mpc}^{-1}$ 以及 $N_w = 3$ ， $k_{\parallel}^{\min} = 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 分别。这与文献中的定义一致。 [33, 34]。

线性功率谱由代码 CLASS³计算，而非线性修正则通过 velocileptors⁴ 实现的一圈拉格朗日微扰理论 (LPT) [35]获得，其中包含有效场论 (effective field theory, EFT) 项 [36–40]。具体而言，我们考虑一个包含线性、二次和剪切偏置的模型，以及3抵消项

²<https://github.com/NoahSailer/FishLSS>³

https://github.com/lesgourg/class_公开代码⁴

<https://github.com/sfschen/velocileptors>

	Experiment type	Concept	Redshift Range	Primordial FoM	Time-scale	Technical Maturity	Comments
DESI	spectro	5000 robotic fiber fed spectrograph on 4m Mayall telescope	$0.7 < z < 2.0$	0.88	now	operating	
Rubin LSST	photo	<i>ugrizy wide FoV</i> imaging on a 6.5m effective diameter dedicated telescope	$0 < z < 3$	-	2025-2035	on schedule	Targeting survey for next generation spectroscopic instruments
SPHEREx	narrow-band	Variable Linear Filter imaging on 0.25m aperture from space	$0 < z < 4$	-	2024	on schedule	Focus on primordial non-Gaussianity
MSE+ [†]	spectro	up to 16,000 robotic fiber fed spectrograph on 11.25 m telescope	$1.6 < z < 4$ (ELG+LBG samples)	< 6.1	2029-	high	
MegaMapper	spectro	20,000 robotic fiber fed spectrograph on 6m Magellan clone	$2 < z < 5$	9.4	2029-	high	Builds upon existing hardware and know-how
SpecTel [†]	spectro	20,000-60,000 robotic fiber fed spectrograph on a dedicated 10m+ class telescope	$1 < z < 6$	< 23	2035-	medium	Potentially very versatile next generation survey instruments
PUMA	21 cm	5000-32000 dish array focused on intensity 21 cm intensity mapping	$0.3 < z < 6$	85 / 26 (32K / 5K optimistic)	2035-	to be demonstrated	Very high effective number density, but $k_{\parallel}$ modes lost to foregrounds
mm-wave LIM concept	microwave LIM	500-30000 on-chip spectrometers on existing 5-10m telescopes, 80-300 GHz with R~300-1000	$0 < z < 10$	up to 170	2035 -	to be demonstrated	CMB heritage, can deploy on existing telescopes, signal uncertain, $k_{\parallel}$ modes lost to foregrounds & resolution

表1：比较当前和下一代能够进行3D宇宙映射的实验。表的上半部分显示了现有和已获资助的实验，而下半部分则聚焦于拟议中的未来设施。详见 [33]以获取更多细节。[†] 我们计算了MSE和SpecTel的FoM，假设它们进行了全天LBG/LAE巡天——这样的巡天并非其提案的一部分，这些合作组也未承诺进行任何此类巡天。对于其拟议的巡天，FoM显著较低。

α_0 , 2, 4 和 3 随机贡献 N_0 , 2, 4 这些参数被边缘化（详见 [33]）。对于 21cm, 我们进一步边缘化 $\Omega_{\text{HI}}(z) \equiv \rho_{\text{HI}}(z)/\rho_c(z)$, 即中性氢的宇宙密度。

4 功率谱测量

得益于高红移处可用的巨大体积以及足够数量的示踪体数密度, 下一代宇宙学巡天将以极高精度测量物质功率谱。图2展示了当前和未来对三维功率谱的约束, 使用线性理论外推到 $z = 0$ 。当作为红移的函数进行测量时, 这一测量使我们能够约束高红移和低红移宇宙中的大量效应, 我们将在接下来的几节中讨论。

我们注意到, 通过未来的星系透镜效应（例如鲁宾观测台[18]）或大视场宇宙微波背景透镜效应（例如CMB-S4 [10], CMB-HD [16] 或PICO [17]），可以获得沿视线方向积分的投影功率谱的极佳约束。这些测量具有潜在优势, 可能更容易在稍小尺度上进行建模（因为它们对非线性偏置效应不敏感且噪声较低），并且非常适合测量小尺度功率的振幅。另一方面, 投影限制了可测量的模数（从而限制了精度），并且会抹平功率谱中的精细特征, 使得提取关于膨胀或暴胀印记的信息更加困难。因此, 投影功率谱和三维功率谱的测量具有高度互补性。此外, 两者之间的互相关解锁了§9中所探讨的协同效应, 从而提供更大的统计功效并减少系统误差, 进一步增强了并行推进两者的理由。

宽度为 Δk 的功率谱区间中的不确定性由 $P_t(k)\sqrt{2/N(k)\Delta k}$, 其中 $N(k)$ 是介于 k 和 $k + \Delta k$ 以及 $P_t(k)$ 是总功率（包括任何噪声贡献）。然而, 并非所有模式在约束原初物理方面都同样有用, 我们接下来将讨论这一点。

5 原初物理学

由于在重组时光与物质退耦之前, 光子自由程是微观尺度的, 因此宇宙微波背景（cosmic microwave background, CMB）是我们能直接观测到的宇宙最早时期。其他一切信息都必须间接推断。在本文中, 我们将原初物理理解为关于早期宇宙状态的任何信息, 这些信息编码在晚期宇宙涨落的统计中。关于可通过大尺度结构实验探测的原初物理及其理论动机的综述, 我们请读者参阅关于暴胀的Snowmass论文。[3]。

通过观测大尺度结构所能重建的大量原初模 $z > 2$ 将使未来的大尺度结构实验在约束原初物理方面超越宇宙微波背景测量。如图2所示, （线性演化的）物质功率谱




图 1: 原初品质因数 $\equiv 10^{-6} N_{\text{modes}}$ 作为 z_{max} 的函数, 针对DESI、PUMA (-5K和-32K)、MegaMapper和SpecTel。对于DESI, 我们仅包括发射线星系。对于PUMA, 我们考虑了乐观和悲观的前景模型, 它们对应阴影区域的边界。阴影橙色区域的边界是全天空巡天的宇宙方差极限, 假设 $b(z) = 1_0$ 。




图2: 在 $z = 0$ 处对线性物质功率谱的测量。对于MegaMapper和PUMA-32K, 我们展示了15在 k 之间线性间隔的 0.1 hMpc 分箱的约束 $^{-1} \lesssim k \lesssim 1 \text{ hMpc}^{-1}$ 。此图改编自参考文献 [33, 41, 42]。

可以以前所未有的精度进行测量, 进而揭示出与最简单模型所预言的近标度不变原初功率谱的任何偏离。

对于所有巡天，我们设定 M_{pc} 和 M_{pc} 。

对于其他“形状”的非高斯性，如等边型或正交型，其对功率谱的影响在很大程度上与偏袒参数简并，因此需要测量双谱。PUMA和MegaMapper都应能将当前对等边型和正交型非高斯性的约束提高一个因子 $\approx 2 - 3$ 通过测量大尺度结构的双谱 [9, 46]。

9

6膨胀约束

弗里德曼度规的基本自由度、几何以及膨胀历史，可以通过对距离-红移关系的测量得到严格约束，从而为我们提供关于宇宙组成的信息。重子（baryon）声学振荡（BAO）的测量约束了膨胀参数 $D_A(z)/r_d$ 和 $H(z)r_d$ 其中 $D_A(z)$ 是到红移的角直径距离 z 、 $H(z)$ 是哈勃参数， r_d 是拖曳时期的声视界。这些反过来可用于约束膨胀历史和速率，从而为我们提供关于宇宙组成、各种能量源的时间依赖性以及曲率的信息。图4为我们提供关于 $D_A(z)/r_d$ 的分数误差，以及 $H(z)r_d$ （作为Alcock-Paczynski参数 $\alpha_\perp$ 和 $\alpha_\parallel$ respectively）。值得注意的是，未来的大尺度结构（LSS）实验将能够以亚百分比精度测量膨胀参数，直至 $z \gtrsim 5$ ，从而完全覆盖暗能量主导时代并延伸至物质主导时期。正如我们在下一节中解释的，这正是约束多类动力学暗能量模型所需要的，并且也能揭示其他能量成分，如曲率或对广义相对论的修正。值得注意的是，仅曲率约束的精度就将通过未来的高红移巡天提高两倍以上（见图7）。




图4：来自重建功率谱的参数 $\alpha_\perp$ 、 $\alpha_\parallel$ 上的误差，可解释为 $D_A(z)$ 的相对误差/ r_d 和 $r_d H(z)$ 分别。DESI的线专门针对ELG样本。阴影区域的边界表示21厘米巡天的乐观/悲观前景假设。在顶部面板中，我们展示了乐观情况下的误差棒。

7（早期）暗能量

通过大尺度结构的测量来观测高 z 红移宇宙，可以对我们研究暗能量产生变革性的影响。这主要有三个原因：

1。如前一节所述，它可以直接测量观测红移范围内的膨胀历史。广泛的动力学暗能量模型类别在给定红移下相对于主导能量密度表现出“追踪行为”[49]，使得在物质主导转变期间对暗能量密度的测量在 $z \gtrsim 2$ 尤为引人注目。结合重子声学振荡（BAO）和红移空间畸变（RSD）可以直接获得观测红移范围内的暗能量密度 [7]，从而严格约束了在后期模仿宇宙学常数的广泛模型类别。特别是，图5 表明星系和21cm 实验都能将暗能量占比的约束精度提高到优于2%，直至 $z \approx 5$ ，完全覆盖向物质主导的过渡。

2。它利用了强大的简并破除能力：参数灵敏度随红移变化显著，将宽红移范围内的测量结果结合起来，可以非常有效地在内部破除简并 [50]。这包括区分动力学暗能量与中微子质量或其他粒子的效应。

3。它也是在高红移下探测早期暗能量（EDE）的极佳间接手段：高红移处膨胀速率的变化 z 会暂时改变结构的生长，并在测得的功率谱中表现为特征 [5, 6, 51, 52]。通过观测非常大的体积，我们可以以前所未有的精度测量功率谱的形状（由于宇宙方差的减小），从而显著提高我们对EDE（以及轻遗迹粒子，如 N_{eff} [53]所探测的）的灵敏度。相当令人兴奋的是，如图6，下一代大尺度结构巡天可以将早期暗能量的占比约束到低于1%，一直到 $z \sim 10^5$ ，使其在整个宇宙历史的大部分时期成为高精度的暗能量探针[33]。




图5：当前和未来的大尺度结构巡天通过直接膨胀测量所能达到的暗能量占比（ Ω_{DE} ）的绝对误差。引自 [33]。




图6: 对早期暗能量最大振幅的约束 (f_{EDE}) 作为EDE峰值时间的函数, 假设 $z_{c0} = 2.83$ 。我们为所有实验纳入一个Planck+SO先验于 ΛCDM 。左图展示仅使用全形状 (FS) 测量的约束, 而右图则纳入来自SO透镜效应及其与相应星系巡天互相关的 ΛCDM 及干扰参数的先验。




图7: 对 ΛCDM 及其扩展模型的约束, 来自四种不同的实验组合 (从Planck开始+Simons+DESI=PSD或LiteBird+S4+DESI=LSD), 仅使用原初CMB和成团性数据。我们纳入一个 $\sigma(\tau) = 0.002$ 先验用于绿色柱状图。左图: 阴影/宽度表示在拟合 ΛCDM 时允许变化的参数 (例如, 对于基准 $\Lambda\text{CDM} + M_\nu$ 我们保持 N_{eff} 和 Ω_k 固定)。右图: 阴影表示在我们的拟合中同时允许变化的参数扩展 (N 参数扩展 ($N\text{PE}$) 的数量, 从 x 轴上的相关参数开始, 并沿循环继续 (M_ν , N_{eff} , Ω_k); 例如, 对于 Ω_k , 2PE等价于 Ω_k , M_ν 。

8中微子与标准模型的其他扩展

8.1大质量中微子

大质量中微子在宇宙微波背景和大尺度结构上留下诸多印记, 使得通过宇宙学观测能够测量其总质量。其中最重要的效应是

尺度依赖性地抑制中微子自由流尺度以下的小尺度功率。这种抑制与质量成正比，并且依赖于红移，使我们能够将大质量中微子的效应与大多数动力学暗能量模型区分开来。在高红移处探测更大的体积可以更好地确定大尺度功率，从而确定抑制量，通常使未来的实验将中微子质量总和约束到 $\sigma(M_\nu) \approx 20 \text{ meV}$ ，或 $\approx 3\sigma$ 在最小质量、正常质量等级情形下实现“探测”（如果实际质量更大，则更多）。图7展示了多种情景下的预测。

8.2轻相对论性粒子

早期额外相对论性粒子的存在会改变辐射密度（从而影响小尺度上功率谱的阻尼），并移动重子声学振荡峰的位置。因此，未来高红移巡天对功率谱的高精度测量是探测额外轻粒子的理想途径。这种对轻子遗迹密度的观测约束预计将对基础物理学产生广泛影响

[13, 54]。当用 N_{eff} [10]参数化额外物种数量时，粒子物理标准模型预测

$N_{\text{eff}} = 3.046$ [55]，并且对于广泛类别的粒子，变化 ΔN_{eff} 存在下限： $\Delta N_{\text{eff}} > 0.027$ 对于单个标量， 0.047 对于Weyl费米子，以及 0.054 对于矢量玻色子，即使热退耦发生在标准模型其余部分之前⁶。正如我们从图7, 未来高 z 巡天可以约束 $\sigma(N_{\text{eff}}) \approx 0.03$, 以及 0.02 当与拟议的CMB实验相结合时，达到与 ΔN_{eff} 单粒子最小允许值相当的灵敏度。虽然来自LSS和第四代CMB实验的约束相当，但我们注意到，由于 N_{eff} 导致的CMB阻尼量与原始氦丰度 Y_p 相当简并，如果没有严格的外部先验，约束可能会退化多达2倍。[56, 57]。LSS 测量不受 Y_p 影响，LSS 与 CMB 的结合将提供最严格且最稳健的约束。

8.3暗物质

虽然我们在此不针对任何特定巡天提供具体预测，但若不提及我们所讨论的这类巡天将能够对一系列假设的暗物质候选体提供极其严格的约束，那将是疏忽的[11]。其中一些约束源于与上述 N_{eff} 约束类似的考虑（例如参考文献 [58, 59]），而另一些则会对可观测量带来更为显著的变化。可被高精度功率谱测量约束的非标准模型示例包括具有暗物质-重子散射的模型 [60],暗物质相互作用 [61–63] 或超轻轴子 [64] 以及可通过结构形成有效场论（ETHOS）框架描述的非常广泛的暗物质模型类别 [65]。更多关于宇宙巡天中暗物质约束的信息

⁶以及更大的贡献 如果退耦发生在某些标准模型相变之后，贡献会更大。

可在提交给Snowmass暗物质：宇宙学探针专题组的系列白皮书中找到 [66–70]。

9与宇宙微波背景的协同效应及互相关

虽然高红移光谱巡天本身提供了引人注目的科学覆盖范围，但同样值得注意的是，来自未来大视场实验（如西蒙斯观测台（SO））的宇宙微波背景透镜效应图的噪声 [71]，CMB-S4 [10]，CMB-HD [16] 或PICO[17]，将比现有测量降低一个数量级以上。与宇宙切变不同，宇宙微波背景透镜效应可以测量到非常高的红移，使我们无需对星系偏置进行建模即可获取物质场的信息。不幸的是，单独的宇宙微波背景透镜效应主要提供沿视线方向投影的信息（且具有宽红移核函数）。宇宙微波背景透镜效应与多个红移区间内的大尺度结构的互相关（宇宙微波背景透镜效应层析成像； [72, 73]），可以打破仅由大尺度结构本身固有的星系偏置简并，并提供作为红移函数的扰动振幅测量，这是无法直接从宇宙微波背景获得的。这导致对中微子质量和暗能量的约束更紧，同时减轻了一些可能的系统效应[10, 19, 72]。此外，将非相对论性物质通过红移空间畸变的运动与宇宙微波背景光子的偏折进行比较，将对修正引力理论给出一些最具信息量的约束 [14]。与此同时，大尺度结构与宇宙微波背景透镜效应的互相关有可能提高依赖于超大尺度约束的稳健性，例如对局部非高斯性的测量 [74]。




图8：左图：关于 $\sigma_8(z)$ 的误差，当由 Λ CDM 推导时，假设一个 $\sigma(\omega_b) = 0.0005$ 来自大爆炸核合成（BBN）的先验。右图： $\sigma_8(z)$ 来自全形状数据，采用固定形状程序计算，且没有任何外部先验。误差棒（较小端帽者）包含了与CMB-S4透镜效应的互相关，但不包含来自会聚度自谱的任何信息。所有21-cm测量均假设乐观的前景。灰色带从 1 ± 0.01 。

除了宇宙微波背景透镜效应之外，宇宙微波背景的其他次级各向异性⁷ 将CMB与大尺度结构巡天图关联起来，揭示了宇宙网中气体的性质（通过热

⁷也就是说，涨落 由宇宙微波背景光子与视线方向上的物质相互作用引起的涨落

以及运动学苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应，即tSZ和kSZ [75–77]），并提供通过kSZ测量大尺度晕速度的工具 [78] 以及“运动透镜” [79, 80]效应。这些速度测量可以触及最大的尺度，而这些尺度往往受原初物理影响最为显著。结合大尺度结构，它们可用于降低宇宙方差，从而可能提供对局部原初非高斯性的独立测量，其精度达到 $\sigma(f_{\text{NL}}^{\text{loc}}) \lesssim 1$ [81]。为了充分利用这些机遇，未来地面宇宙微波背景实验的角分或亚角分分辨率将至关重要。

10品质因数

本白皮书中推导出的所有约束本质上都与从线性（或弱非线性）模中提取信息相关。这些模与其他模的耦合可以假定为次主导，并且它们从宇宙早期阶段起基本保持不变（除线性增长外）。非线性耦合会混合不同模的信息，通常会抹去原本存在的原始特征。因此，建立一个统计这些模的原初物理品质因数是合理的。数学细节在附录A中讨论，但有效模数本质上是通过计算巡天可及的模总数，并用波数依赖的核函数加权来计算的，该核函数衡量由于i) 非线性演化和ii) 巡天的噪声特性（星系巡天以泊松噪声为主，强度映射巡天以接收机热噪声为主）而损失的信息量。所得结果在没有外部施加的尺度截断的情况下收敛到有限值，例如 k_{maxo} 。因此，它是一个依赖于巡天的量，但除此之外没有可调参数。

这里讨论的一些物理问题，例如对原初功率谱特征的灵敏度、对早期暗能量的约束以及对原初非高斯性的约束（带有一些重要的注意事项），几乎随该量线性变化（即误差随品质因数成比例变化）， $^{-1/2}$ 并使我们能够直接比较巡天方案。其他科学目标，如重子声学振荡和中微子质量约束，仍近似按这种方式变化。[33]因此，我们认为它是取代暗能量品质因数的良好候选者，后者在2020年代已失去其效用。

与任何品质因数一样，将信息压缩为单一数字存在局限性。其中一些是已知的未知。例如，我们知道21 cm必须滤除缓慢变化的视线方向模。这限制了它在与2D示踪体（最重要的是宇宙微波背景次级效应，但也包括星系切变图——但见[82]）的互相关中的效用，并限制了它单独探测局部非高斯性的能力，而这种限制并未通过简单地从计数中省略这些模来体现。此外还有未知的未知。我们知道星系巡天光谱学是一种经过充分检验的方法，在实现预测科学目标方面有着长期的记录。强度映射技术在技术上要落后得多，尽管前景广阔，但其高品质因数必须与光谱星系巡天预测的较低但更稳健的品质因数进行权衡。

在表1中，我们列举了与本白皮书相关的一些当前实验及其品质因数。以DESI的发射线星系（ELG）样本作为

作为参考，我们发现所有未来的实验（除MSE外）都允许其值至少提高一个数量级。正如预期，更激进的设计会带来更大的改进：如果SpecTel完全专注于大 N 尺度科学，其性能将优于MegaMapper两倍以上。PUMA在其最终配置中比DESI好两个半数量级，并且比MegaMapper好40倍。这当然取决于21 cm提供与其统计灵敏度相称的系统性干净的结果，而当前一代的21 cm实验并非如此。[83]。

11结论

利用宇宙微波背景和大尺度结构对非均匀宇宙的测量，目前为我们提供了对暴胀、中微子质量、轻遗迹粒子、暗能量和暗物质的最严格约束。新的实验技术使我们能够大幅拓展红移前沿。通过探测直至 $z \approx 5.5$ 的大尺度结构，我们将使观测体积增加四倍以上，大幅增加观测到的模数，从而显著提升我们对原初宇宙的理解。这些观测将建立在社区即将投入运行的光学与亚毫米设施投资之上，并使我们能够高精度地探测度规、粒子含量以及两次加速膨胀时期。

高红移宇宙使我们能够精确测量长波长模，为上述约束提供了理论上稳健的途径。基于围绕高能粒子物理学中熟悉原理构建的微扰模型，我们预测和优化这些大 N 巡天的能力已十分成熟且在理论上可靠。此类巡天瞄准推断最清晰、噪声最低的位置，以理论无关的方式最大化超出标准模型物理的发现潜力。这也是我们预测最为可靠的区域，从而能够进行更深入的巡天优化。

对大尺度结构的精确研究有助于宇宙学前沿的所有课题，包括对膨胀历史和曲率的约束、对暴胀的多重探针、对整个宇宙历史中暗能量的限制、对暗物质及其相互作用的性质、对轻遗迹粒子和中微子质量的限制，并为修正引力提供约束。未来的实验将把膨胀历史的测量精度提高到亚百分比精度，一直延伸到 $z \simeq 5$ ，完全覆盖暗能量主导纪元，并深入物质主导时期。通过利用功率谱的形状，未来的巡天可以将早期暗能量的比例约束到 $< 1\%$ 一直延伸到 $z \simeq 10^5$ 。大尺度结构与宇宙微波背景实验的结合应能在 $\approx 3\sigma$ 处探测到最小质量、正常质量等级的中微子。它们将轻遗迹粒子密度约束到与任何单粒子（无论自旋如何）所允许的最小值相当的水平。预计将测量到局部型原初非高斯性 $\sigma(f_{\text{NL}}^{\text{loc}}) < 1$ ，从而能够区分单场与多场暴胀模型，跨越一个重要的理论阈值，并达到即使原则上也无法通过宇宙微波背景实现的范围。

高红移宇宙中大尺度结构光谱测量与

深度宇宙微波背景观测的结合尤为有力。预测表明，这种结合可对中微子、轻遗迹粒子、暗能量、暴胀和修正引力给出更严格的约束，同时减轻某些潜在的系统误差。

12致谢

我们感谢Kyle Dawson、Alex Drlica-Wagner、Mustapha Ishak、Kirit Karkare、Juna Kollmeier、Azadeh Moradinezhad Dizgah、David Schlegel、Neelima Sehgal以及宇宙学前沿4小组对草稿的非常有帮助的讨论和评论。

“原初物理学”品质因数

受重建原初功率谱的Fisher矩阵标度行为的启发，我们遵循 [33]并定义与初始条件相关的有效模数如下：虽然低 k 处的“线性”模100%与初始条件相关，因为线性演化保留了相位信息，但非线性演化和测量噪声在较小尺度上造成去相关，导致信息损失。我们用如下高斯传播子来模拟这种去相关：

$$G(k, \mu) \equiv \frac{\langle \delta_F \delta_L \rangle}{\langle \delta_L \delta_L \rangle} \simeq \exp \left[-\frac{1}{2} (k_\perp^2 + k_\parallel^2 \{1 + f\}^2) \Sigma^2 \right], \quad (4)$$

其中 Σ 由泽尔多维奇近似中的均方根位移设定，而 f 是线性增长因子。

我们可以将非线性 overdensity $\delta_F(\mathbf{k}) = G(\mathbf{k})\delta_L(\mathbf{k}) + d(\mathbf{k})$ 分成两部分：一个与线性 overdensity 相关，另一个则与之无关 $\langle \delta_L(\mathbf{k})d(\mathbf{k}') \rangle = 0$ 在样本方差极限下，线性功率谱振幅的相对不确定性 A 由下式给出 $\sqrt{2/N_{\text{modes}}}$ 。我们可以从费雪信息矩阵计算这一不确定性：

$$F_{ii} = \frac{f_{\text{sky}}}{2} \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} dz \frac{dV}{dz} \int_{k-\text{wedge}(z)}^{\infty} \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \left(\frac{\partial_{p_i} P_F(\mathbf{k}, z)}{P_F(\mathbf{k}, z) + N(z)} \right)^2, \quad (5)$$

其中 k -楔形函数 (z) 定义了积分的下限。振幅的不确定性为 $\delta A/A = \delta P_L(\mathbf{k})/P_L(\mathbf{k}) = 1/\sqrt{F_{AA}}$ ，因此 $N_{\text{modes}} = 2F_{AA}$ 。这定义了品质因数 N_{modes} 。简短计算给出：

$$N_{\text{modes}} = f_{\text{sky}} \int_{z_{\min}}^{z_{\max}} dz \frac{dV}{dz} \int_{k-\text{wedge}(z)}^{\infty} \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \left(\frac{G^2(\mathbf{k}, z) P_L(\mathbf{k}, z)}{P_F(\mathbf{k}, z) + N(z)} \right)^2. \quad (6)$$

为了定义量级为一的原初物理品质因数（Primordial FoM），本文中我们取：

$$\text{Primordial FoM} \equiv 10^{-6} N_{\text{modes}} \quad (7)$$

请注意，由于上述定义未包含功率谱对目标参数的灵敏度，它也是比较不同“类似”实验对原初物理灵敏度的有用量。然而，例如，它不应被用于比较宇宙微波背景（CMB）与大尺度结构（LSS）实验对“低红移”参数（如暗能量或中微子）的灵敏度。

在数值评估 N_{modes} 时，文献 [33] 发现，高 z 大尺度结构实验可以超越宇宙微波背景，但要做到这一点，在 $z > 3.5$ 处的观测是必要的。

参考文献

- [1] Anze Slosar, Rachel Mandelbaum, and Daniel Eisenstein. Dark Energy and Modified Gravity. *Bulletin of the AAS*, 51(3):97, May 2019. arXiv:1903.12016.
- [2] Pieter Daniel Meerburg, Daniel Green, Raphael Flauger, Benjamin Wallisch, M. C. David Marsh, Enrico Pajer, et al. Primordial Non-Gaussianity. *Bulletin of the AAS*, 51(3):107, May 2019. arXiv:1903.04409.
- [3] G. L. Pimentel, B. Wallisch, W. L. K. Wu, et al. Snowmass2021 Theory Frontier White Paper: Inflation: Theory and Observations. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [4] Anze Slosar, Xingang Chen, Cora Dvorkin, Daan Meerburg, Benjamin Wallisch, Daniel Green, et al. Scratches from the Past: Inflationary Archaeology through Features in the Power Spectrum of Primordial Fluctuations. *Bulletin of the AAS*, 51(3):98, May 2019. arXiv:1903.09883.
- [5] J. Colin Hill, Evan McDonough, Michael W. Toomey, and Stephon Alexander. Early dark energy does not restore cosmological concordance. *Physical Review D*, 102(4):043507, August 2020. arXiv:2003.07355, doi:10.1103/PhysRevD.102.043507.
- [6] Shi-Fan Chen, Zvonimir Vlah, and Martin White. Modeling features in the redshift-space halo power spectrum with perturbation theory. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2020(11):035, November 2020. arXiv:2007.00704, doi:10.1088/1475-7516/2020/11/035.
- [7] Simone Ferraro, Michael J. Wilson, and et al. Inflation and Dark Energy from spectroscopy at $z > 2$. *Bulletin of the AAS*, 51(3):72, May 2019. arXiv:1903.09208.
- [8] Emanuele Castorina, Simon Foreman, Dionysios Karagiannis, Adrian Liu, Kiyoshi W. Masui, Pieter D. Meerburg, et al. Packed Ultra-wideband Mapping Array (PUMA): Astro2020 RFI Response. *arXiv e-prints*, page arXiv:2002.05072, February 2020. arXiv:2002.05072.
- [9] Anze Slosar, Zeeshan Ahmed, David Alonso, Mustafa A. Amin, Evan J. Arena, Kevin Bandura, et al. Packed Ultra-wideband Mapping Array (PUMA): A Radio Telescope for Cosmology and Transients. In *Bulletin of the AAS*, volume 51, page 53, Sep 2019. arXiv:1907.12559.
- [10] K. N. Abazajian, P. Adshead, Z. Ahmed, S. W. Allen, D. Alonso, K. S. Arnold, et al. CMB-S4 Science Book, First Edition. *ArXiv e-prints*, October 2016. arXiv:1610.02743.
- [11] Vera Gluscevic, Yacine Ali-Haïmoud, Keith Bechtol, Kimberly K. Boddy, Celine Boehm, Jens Chluba, et al. Cosmological Probes of Dark Matter Interactions: The Next Decade. *Bulletin of the AAS*, 51(3):134, May 2019. arXiv:1903.05140.

- [12] Cora Dvorkin, Martina Gerbino, David Alonso, Nicholas Battaglia, Simeon Bird, Ana Diaz Rivero, et al. Neutrino Mass from Cosmology: Probing Physics Beyond the Standard Model. *Bulletin of the AAS*, 51(3):64, May 2019. arXiv:1903.03689.
- [13] Daniel Green, Mustafa A. Amin, Joel Meyers, Benjamin Wallisch, Kevork N. Abazajian, Muntazir Abidi, et al. Messengers from the Early Universe: Cosmic Neutrinos and Other Light Relics. *Bulletin of the AAS*, 51(3):159, May 2019. arXiv:1903.04763.
- [14] Bhuvnesh Jain and Justin Khoury. Cosmological tests of gravity. *Annals of Physics*, 325(7):1479–1516, Jul 2010. arXiv:1004.3294, doi:10.1016/j.aop.2010.04.002.
- [15] Austin Joyce, Bhuvnesh Jain, Justin Khoury, and Mark Trodden. Beyond the cosmological standard model. *Physics Reports*, 568:1–98, Mar 2015. arXiv:1407.0059, doi:10.1016/j.physrep.2014.12.002.
- [16] Neelima Sehgal et al. CMB-HD: An Ultra-Deep, High-Resolution Millimeter-Wave Survey Over Half the Sky. 6 2019. arXiv:1906.10134.
- [17] Shaul Hanany et al. PICO: Probe of Inflation and Cosmic Origins. 3 2019. arXiv:1902.10541.
- [18] LSST Science Collaboration, P. A. Abell, J. Allison, S. F. Anderson, J. R. Andrew, J. R. P. Angel, et al. LSST Science Book, Version 2.0. *ArXiv e-prints*, December 2009. arXiv:0912.0201.
- [19] M. J. Wilson and Martin White. Cosmology with dropout selection: straw-man surveys & CMB lensing. *JCAP*, 10(10):015, October 2019. arXiv:1904.13378, doi:10.1088/1475-7516/2019/10/015.
- [20] L. Amendola, S. Appleby, A. Avgoustidis, D. Bacon, T. Baker, M. Baldi, et al. Cosmology and fundamental physics with the Euclid satellite. *Living Reviews in Relativity*, 21:2, April 2018. arXiv:1606.00180, doi:10.1007/s41114-017-0010-3.
- [21] E. D. Kovetz, M. P. Viero, A. Lidz, L. Newburgh, M. Rahman, E. Switzer, et al. Line-Intensity Mapping: 2017 Status Report. *ArXiv e-prints*, September 2017. arXiv:1709.09066.
- [22] Kirit S. Karkare, Azadeh Moradinezhad Dizgah, Garret K. Keating, Patrick Breysse, and Dongwoo T. Chung. Cosmology with Millimeter-Wave Line Intensity Mapping. March 2022.
- [23] Adrian Liu et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: 21 cm radiation: Probe of Physics Across Cosmic Ages. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [24] DESI Collaboration, A. Aghamousa, J. Aguilar, S. Ahlen, S. Alam, L. E. Allen, et al. The DESI Experiment Part I: Science, Targeting, and Survey Design. *ArXiv e-prints*, October 2016. arXiv:1611.00036.

- [25] Olivier Doré, Jamie Bock, Matthew Ashby, Peter Capak, Asantha Cooray, Roland de Putter, et al. Cosmology with the SPHEREX All-Sky Spectral Survey. *arXiv e-prints*, page arXiv:1412.4872, December 2014. arXiv:1412.4872.
- [26] K. Dawson. Next-generation Spectroscopic Surveys with DESI. *Snowmass LOI*, 2020.
- [27] David Schlegel, Juna A. Kollmeier, and Simone Ferraro. The MegaMapper: a $z > 2$ spectroscopic instrument for the study of Inflation and Dark Energy. In *Bulletin of the AAS*, volume 51, page 229, September 2019. arXiv:1907.11171.
- [28] The MSE Science Team, Carine Babusiaux, Maria Bergemann, Adam Burgasser, Sara Ellison, Daryl Haggard, et al. The Detailed Science Case for the Maunakea Spectroscopic Explorer, 2019 edition. *arXiv e-prints*, page arXiv:1904.04907, April 2019. arXiv:1904.04907.
- [29] Richard Ellis and Kyle Dawson. SpecTel: A 10-12 meter class Spectroscopic Survey Telescope. In *Bulletin of the AAS*, volume 51, page 45, September 2019. arXiv:1907.06797.
- [30] David J. Schlegel, Simone Ferraro, et al. A Spectroscopic Road Map for Cosmic Frontier: DESI, DESI-II, Stage-5. In *2022 Snowmass Summer Study*, 9 2022. arXiv:2209.03585.
- [31] Azadeh Moradinezhad Dizgah and Garrett K. Keating. Line Intensity Mapping with [C II] and CO(1-0) as Probes of Primordial Non-Gaussianity. *Astrophysical Journal*, 872(2):126, February 2019. arXiv:1810.02850, doi:10.3847/1538-4357/aafd36.
- [32] Azadeh Moradinezhad Dizgah, Garrett K. Keating, Kirit S. Karkare, Abigail Crites, and Shouvik Roy Choudhury. Neutrino Properties with Ground-Based Millimeter-Wavelength Line Intensity Mapping. *arXiv e-prints*, page arXiv:2110.00014, September 2021. arXiv:2110.00014.
- [33] Noah Sailer, Emanuele Castorina, Simone Ferraro, and Martin White. Cosmology at high redshift – a probe of fundamental physics. *arXiv e-prints*, page arXiv:2106.09713, June 2021. arXiv:2106.09713.
- [34] Cosmic Visions 21 cm Collaboration, R. Ansari, E. J. Arena, K. Bandura, P. Bull, E. Castorina, et al. Inflation and Early Dark Energy with a Stage II Hydrogen Intensity Mapping experiment. *ArXiv e-prints*, October 2018. arXiv:1810.09572.
- [35] Shi-Fan Chen, Emanuele Castorina, Martin White, and Anže Slosar. Synergies between radio, optical and microwave observations at high redshift. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2019(7):023, July 2019. arXiv:1810.00911, doi:10.1088/1475-7516/2019/07/023.
- [36] John Joseph M. Carrasco, Mark P. Hertzberg, and Leonardo Senatore. The effective field theory of cosmological large scale structures. *Journal of High Energy Physics*, 2012:82, September 2012. arXiv:1206.2926, doi:10.1007/JHEP09(2012)082.

- [37] D. Baumann, A. Nicolis, L. Senatore, and M. Zaldarriaga. Cosmological nonlinearities as an effective fluid. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 7:51, July 2012. arXiv:1004.2488, doi:10.1088/1475-7516/2012/07/051.
- [38] L. Senatore. Bias in the effective field theory of large scale structures. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 11:007, November 2015. arXiv:1406.7843, doi:10.1088/1475-7516/2015/11/007.
- [39] Rafael A. Porto, Leonardo Senatore, and Matias Zaldarriaga. The Lagrangian-space Effective Field Theory of large scale structures. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2014(5):022, May 2014. arXiv:1311.2168, doi:10.1088/1475-7516/2014/05/022.
- [40] Z. Vlah, M. White, and A. Aviles. A Lagrangian effective field theory. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 9:014, September 2015. arXiv:1506.05264, doi:10.1088/1475-7516/2015/09/014.
- [41] Planck Collaboration, N. Aghanim, Y. Akrami, F. Arroja, M. Ashdown, J. Aumont, et al. Planck 2018 results. I. Overview and the cosmological legacy of Planck. *Astronomy and Astrophysics*, 641:A1, September 2020. arXiv:1807.06205, doi:10.1051/0004-6361/201833880.
- [42] Solène Chabanier, Marius Millea, and Nathalie Palanque-Delabrouille. Matter power spectrum: from Ly α forest to CMB scales. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 489(2):2247–2253, October 2019. arXiv:1905.08103, doi:10.1093/mnras/stz2310.
- [43] Neal Dalal, Olivier Dore, Dragan Huterer, and Alexander Shirokov. The imprints of primordial non-gaussianities on large-scale structure: scale dependent bias and abundance of virialized objects. *Phys. Rev.*, D77:123514, 2008. arXiv:0710.4560, doi:10.1103/PhysRevD.77.123514.
- [44] Simone Ferraro and Kendrick M. Smith. Using large scale structure to measure f_{NL} , g_{NL} and τ_{NL} . *Phys. Rev.*, D91(4):043506, 2015. arXiv:1408.3126, doi:10.1103/PhysRevD.91.043506.
- [45] Alexandre Barreira. Can we actually constrain f_{NL} using the scale-dependent bias effect? An illustration of the impact of galaxy bias uncertainties using the BOSS DR12 galaxy power spectrum. 5 2022. arXiv:2205.05673.
- [46] Simone Ferraro and Michael J. Wilson. Inflation and Dark Energy from spectroscopy at $z > 2$. *Bulletin of the AAS*, 51(3):72, May 2019. arXiv:1903.09208.
- [47] Dionysios Karagiannis, Andrei Lazanu, Michele Liguori, Alvis Raccanelli, Nicola Bartolo, and Licia Verde. Constraining primordial non-Gaussianity with bispectrum and power spectrum from upcoming optical and radio surveys. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 478(1):1341–1376, July 2018. arXiv:1801.09280, doi:10.1093/mnras/sty1029.

- [48] Dionysios Karagiannis, Anže Slosar, and Michele Liguori. Forecasts on primordial non-Gaussianity from 21 cm intensity mapping experiments. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2020(11):052, November 2020. arXiv:1911.03964, doi:10.1088/1475-7516/2020/11/052.
- [49] Philip Bull, Martin White, and Anže Slosar. Searching for dark energy in the matter-dominated era. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 505(2):2285–2299, August 2021. arXiv:2007.02865, doi:10.1093/mnras/stab1338.
- [50] Shadab Alam, Marie Aubert, Santiago Avila, Christophe Balland, Julian E. Bautista, Matthew A. Bershad, et al. Completed SDSS-IV extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: Cosmological implications from two decades of spectroscopic surveys at the Apache Point Observatory. *Physical Review D*, 103(8):083533, April 2021. arXiv:2007.08991, doi:10.1103/PhysRevD.103.083533.
- [51] Vivian Poulin, Tristan L. Smith, Tanvi Karwal, and Marc Kamionkowski. Early Dark Energy can Resolve the Hubble Tension. *Physical Review Letters*, 122(22):221301, June 2019. arXiv:1811.04083, doi:10.1103/PhysRevLett.122.221301.
- [52] Mikhail M. Ivanov, Evan McDonough, J. Colin Hill, Marko Simonović, Michael W. Toomey, Stephon Alexander, et al. Constraining early dark energy with large-scale structure. *Physical Review D*, 102(10):103502, November 2020. arXiv:2006.11235, doi:10.1103/PhysRevD.102.103502.
- [53] Daniel Baumann, Daniel Green, and Benjamin Wallisch. Searching for light relics with large-scale structure. *JCAP*, 08:029, 2018. arXiv:1712.08067, doi:10.1088/1475-7516/2018/08/029.
- [54] Jim Alexander, Marco Battaglieri, Bertrand Echenard, Rouven Essig, Matthew Graham, Eder Izaguirre, et al. Dark Sectors 2016 Workshop: Community Report. *arXiv e-prints*, page arXiv:1608.08632, August 2016. arXiv:1608.08632.
- [55] Gianpiero Mangano, Gennaro Miele, Sergio Pastor, Teguhayco Pinto, Ofelia Pisanti, and Pasquale D. Serpico. Relic neutrino decoupling including flavour oscillations. *Nuclear Physics B*, 729(1-2):221–234, November 2005. arXiv:hep-ph/0506164, doi:10.1016/j.nuclphysb.2005.09.041.
- [56] Daniel Baumann, Daniel Green, and Matias Zaldarriaga. Phases of New Physics in the BAO Spectrum. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2017(11):007, November 2017. arXiv:1703.00894, doi:10.1088/1475-7516/2017/11/007.
- [57] Daniel Baumann, Daniel Green, and Benjamin Wallisch. Searching for light relics with large-scale structure. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2018(8):029, August 2018. arXiv:1712.08067, doi:10.1088/1475-7516/2018/08/029.
- [58] Daniel Green and Surjeet Rajendran. The cosmology of sub-MeV dark matter. *Journal of High Energy Physics*, 2017(10):13, October 2017. arXiv:1701.08750, doi:10.1007/JHEP10(2017)013.

- [59] Daniel Green, Yi Guo, and Benjamin Wallisch. Cosmological Implications of Axion-Matter Couplings. *arXiv e-prints*, page arXiv:2109.12088, September 2021. arXiv: 2109.12088.
- [60] Cora Dvorkin, Kfir Blum, and Marc Kamionkowski. Constraining dark matter-baryon scattering with linear cosmology. *Physical Review D*, 89(2):023519, January 2014. arXiv:1311.2937, doi:10.1103/PhysRevD.89.023519.
- [61] Julien Lesgourgues, Gustavo Marques-Tavares, and Martin Schmaltz. Evidence for dark matter interactions in cosmological precision data? *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2016(2):037, February 2016. arXiv:1507.04351, doi:10.1088/1475-7516/2016/02/037.
- [62] Zhen Pan, Manoj Kaplinghat, and Lloyd Knox. Searching for signatures of dark matter-dark radiation interaction in observations of large-scale structure. *Phys. Rev. D*, 97:103531, May 2018. URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.97.103531>, doi:10.1103/PhysRevD.97.103531.
- [63] Maria Archidiacono, Deanna C. Hooper, Riccardo Murgia, Sebastian Bohr, Julien Lesgourgues, and Matteo Viel. Constraining dark matter-dark radiation interactions with CMB, BAO, and lyman- α . *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2019(10):055–055, oct 2019. URL: <https://doi.org/10.1088/1475-7516/2019/10/055>, doi:10.1088/1475-7516/2019/10/055.
- [64] Renée Hlozek, Daniel Grin, David J. E. Marsh, and Pedro G. Ferreira. A search for ultralight axions using precision cosmological data. *Physical Review D*, 91(10):103512, May 2015. arXiv:1410.2896, doi:10.1103/PhysRevD.91.103512.
- [65] Francis-Yan Cyr-Racine, Kris Sigurdson, Jesús Zavala, Torsten Bringmann, Mark Vogelsberger, and Christoph Pfrommer. ETHOS—an effective theory of structure formation: From dark particle physics to the matter distribution of the Universe. *Physical Review D*, 93(12):123527, June 2016. arXiv:1512.05344, doi:10.1103/PhysRevD.93.123527.
- [66] Arka Banerjee et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: Dark Matter Numerical Simulations. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [67] Keith Bechtol et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: Dark matter physics from halo measurements. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [68] Andrea Albert et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: Primordial Black Hole Dark Matter and the Early Universe. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [69] Masha Baryakhtar et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: Dark Matter In Extreme Astrophysical Environments. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.
- [70] Sukanya Chakrabarti et al. Snowmass2021 Cosmic Frontier White Paper: Observational Facilities to Study Dark Matter. In *Contribution to Snowmass 2021*, 2022.

- [71] N. Galitzki, A. Ali, K. S. Arnold, P. C. Ashton, J. E. Austerlmann, C. Baccigalupi, et al. The Simons Observatory: instrument overview. In *Millimeter, Submillimeter, and Far-Infrared Detectors and Instrumentation for Astronomy IX*, volume 10708 of *Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Conference Series*, page 1070804, July 2018. arXiv:1808.04493, doi:10.1117/12.2312985.
- [72] Byeonghee Yu, Robert Z Knight, Blake D. Sherwin, Simone Ferraro, Lloyd Knox, and Marcel Schmittfull. Towards Neutrino Mass from Cosmology without Optical Depth Information. *arXiv e-prints*, page arXiv:1809.02120, September 2018. arXiv:1809.02120.
- [73] Byeonghee Yu, Simone Ferraro, Z. Robert Knight, Lloyd Knox, and Blake D. Sherwin. The Physical Origin of Dark Energy Constraints from Rubin Observatory and CMB-S4 Lensing Tomography. 8 2021. arXiv:2108.02801.
- [74] Marcel Schmittfull and Uroš Seljak. Parameter constraints from cross-correlation of CMB lensing with galaxy clustering. *Physical Review D*, 97(12):123540, June 2018. arXiv:1710.09465, doi:10.1103/PhysRevD.97.123540.
- [75] R. A. Sunyaev and Ya. B. Zeldovich. The Observations of Relic Radiation as a Test of the Nature of X-Ray Radiation from the Clusters of Galaxies. *Comments on Astrophysics and Space Physics*, 4:173, Nov 1972.
- [76] R. A. Sunyaev and I. B. Zeldovich. The velocity of clusters of galaxies relative to the microwave background - The possibility of its measurement. *MNRAS*, 190:413–420, February 1980.
- [77] Nicholas Battaglia, Simone Ferraro, Emmanuel Schaan, and David Spergel. Future constraints on halo thermodynamics from combined Sunyaev-Zel’dovich measurements. *JCAP*, 11:040, 2017. arXiv:1705.05881, doi:10.1088/1475-7516/2017/11/040.
- [78] Kendrick M. Smith, Mathew S. Madhavacheril, Moritz Münchmeyer, Simone Ferraro, Utkarsh Giri, and Matthew C. Johnson. KSZ tomography and the bispectrum. 10 2018. arXiv:1810.13423.
- [79] M. Birkinshaw and S. F. Gull. A test for transverse motions of clusters of galaxies. *Nature*, 302(5906):315–317, March 1983. doi:10.1038/302315a0.
- [80] Selim C. Hotinli, Joel Meyers, Neal Dalal, Andrew H. Jaffe, Matthew C. Johnson, James B. Mertens, et al. Transverse Velocities with the Moving Lens Effect. *Phys. Rev. Lett.*, 123(6):061301, 2019. arXiv:1812.03167, doi:10.1103/PhysRevLett.123.061301.
- [81] Moritz Münchmeyer, Mathew S. Madhavacheril, Simone Ferraro, Matthew C. Johnson, and Kendrick M. Smith. Constraining local non-Gaussianities with kSZ tomography. 2018. arXiv:1810.13424.

- [82] Chirag Modi, Martin White, Anže Slosar, and Emanuele Castorina. Reconstructing large-scale structure with neutral hydrogen surveys. *Journal of Cosmology and Astrophysics*, 2019(11):023, November 2019. arXiv:1907.02330, doi:10.1088/1475-7516/2019/11/023.
- [83] CHIME Collaboration, Mandana Amiri, Kevin Bandura, Tianyue Chen, Meiling Deng, Matt Dobbs, et al. Detection of Cosmological 21 cm Emission with the Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. *arXiv e-prints*, page arXiv:2202.01242, February 2022. arXiv:2202.01242.