

오로라 전리권의 극단적·일시적 에너지 폭발

I. 예측적 레이더 추적

(Extreme, transient bursts of energy in the auroral ionosphere. I. Predictive radar tracking)

저자: Magnus F. Ivarsen, Saif Marei, Jordan Cho, Glenn C. Hussey, Jean-Pierre St-Maurice

소속: 서스캐처원 대학교 물리·공학물리학과 (Department of Physics and Engineering Physics, University of Saskatchewan), 캐나다 새스커툰

투고처: Journal of Geophysical Research: Space Physics (JGR: Space Physics)

출처: arXiv:2605.31046v3 [physics.space-ph], 2026 년 6 월 10 일·교신저자: Magnus F. Ivarsen (magnus.fagernes@gmail.com)

번역 안내. 본 문서는 위 논문 PDF 원문을 한국어로 완전 번역한 것이다. 수식은 원문 그대로 조판하였고, 그림은 원문에서 추출·크롭하여 번역 캡션과 함께 실었다. 각 그림에 대한 상세 시각 분석은 별도 문서 06_figure_analysis.md 에 수록되어 있다. 참고문헌은 원문 그대로 보존하였다 (번역하지 않음).

핵심 포인트 (Key Points)

- 전리권 추적 레이더 (ionospheric tracking radar) 는 레이더 시야 (field-of-view) 내에서 발생하는 전기장 증강 (electric field enhancement) 의 세기와 방향을 측정할 수 있다.
- 사례 연구 및 통계적 집계 결과는 궤도 위성의 현장 (in-situ) 관측 결과와 잘 일치한다.
- 2024 년 5 월 초강력 자기폭풍 (superstorm) 동안, 우리는 첨점 (cusp) 적도 방향에서 전기장의 극단적인 스파이크 (> 500 mV/m) 를 관측했다.

초록 (Abstract)

강한 전기장이 존재하는 환경에서, E-영역 (E-region) 의 3 m 불규칙 구조 (irregularity) 는 팔리-부네만 불안정성 (Farley-Buneman instability) 에 의해 생성된다. ICEBEAR VHF 레이더를 이용한 이전 관측에서는, 이 불규칙 구조들이 수 km^2 이상의 규모에서 군집 (cluster) 또는 소용돌이 (swirl) 로 묘사될 수 있는 형태로 조직됨을 밝혔다. 이 군집들은 난류 하천의 소용돌이 (eddy) 처럼 자기력선관 (magnetic field tube) 의 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 운동에 의해 구동되는 속도로 이동한다.

초기 방식들을 통해 군집의 진화를 자동으로 감지·처리하는 경험을 쌓은 결과, 우리는 오로라 지역의 전기장 구조에 대한 새로운 관측 창 (window) 을 열어준 더욱 정교한 방식을 발전시켰다. 우선, 각 군집은 해당 군집을 둘러싸는 다각형 개념 (α -형태, α -shapes) 으로 표현된다. 새로운 형태들은 매 시간 단계 (time step) 마다 모니터링된다. 군집의 형태는 한 시간 프레임에서 다음 프레임으로 진화하며 (변형되고 레이더 시야를 가로질러 이동한다), 높은 시간 분해능 덕분에 변형이 심하지 않은 경우가 많고, 새로운 위치가 이전 위치에서 극단적으로 멀지 않다. 이런 경우, 개별 군집의 시공간적 진화는 다중 목표물 추적 (multi-target tracking) 에서 응용한 최적 할당 알고리즘 (optimal assignment algorithm) 을 통해 인식할 수 있다. 이 추적은 비용 행렬 (cost-matrix) 을 구성하여 '비용 (cost)' 을 최소화하는 방식에 기반한다. 비용은 연속된 시간 프레임 간 군집들의 겹침 정도를 기반으로 하며, 군집의 이전 변위를 바탕으로 한 위치 예측을 활용

한다. 비용 행렬 방식 덕분에 알고리즘은 여러 군집을 동시에 처리할 수도 있다. 군집이 인식되고 중심점 (centroid) 이 산출되면, '온라인 (online)' 방식의 구간별 선형 회귀 (piecewise linear regression) 를 통해 목표 속도를 추출하고, 군집의 생성 (birth), 소멸 (death), 분리 (split), 합병 (merger) 을 추적한다. 추출된 속도는 현장 위성 관측과의 비교를 통해 검증되었다. 2024 년 5 월 10 일 G5 자기폭풍 (G5 storm) 동안에는, 낮 시간대 전리권 첨점 (ionospheric cusp) 인근의 닫힌 자기력선 (closed magnetic field-line) 을 모니터링하면서 놀랍도록 큰 속도들이 추출되었다. 특히, $11,240 \pm 660$ m/s 로 이동하는 5 초짜리 군집을 포착하였는데, 이는 약 560 mV/m 의 전기장 세기를 의미한다. 이 값은 E-영역 상부 전리권에서 통상적으로 나타나는 열속도 (thermal speed) 를 초과하며, 빠른 아오로라 하부 표류 (sub-auroral drift) 로 알려진 영역에서 보고된 가장 극단적인 값들마저 능가한다. 여기서 한 가지 중요한 특징은, 감지된 극단적 전기장 구조가 단수명 폭발 (short-lived burst) 의 형태로 나타난다는 점이다. 이는 예상치 못한 강한 전기장 변동성을 대표하며, 우주 기상 (space weather) 모델링에 활용하기 위해 전기장에 의한 에너지 침적률 (energy deposition rate) 의 관점에서 분석할 필요가 있다.

일반어 요약 (Plain Language Summary)

지구의 오로라 (aurora), 즉 북극광과 남극광은 태양풍 (solar wind) 이 지구의 광범위한 자기장을 강하게 밀어붙일 때 상층 대기에 흐르는 전기 전류의 위치를 나타낸다. 이러한 전류 중 가장 강한 것—지표면에서 약 105 km 상공에 위치하는 오로라 전기제트류 (auroral electrojet)—는 측정하기 어려운 전기장에 의해 구동된다. 위성은 너무 빠르게 통과하여 그 구조를 지도화하기 어렵고, 지상 레이더는 해석하기 까다로운 플라스마 운동 자료를 반환하는 경향이 있기 때문이다. 우리는 레이더 에코 (radar echo) 의 조밀한 군집들을 자동으로 추적하는 기계 학습 (machine learning) 방법을 제시한다. 이 군집들은 강한 전기장에 의해 여기 (excite) 된 플라스마 난류 (plasma turbulence) 에 직접 대응한다. 이는 캐나다 서스캐처원 주에 위치한 첨단 과학 이미징 레이더 ICEBEAR 덕분에 가능해졌다. 추적된 각 레이더 에코 군집은 연속 프레임에 걸쳐 자동으로 추적되며, 그 운동은 국소 전기장 측정값으로 변환되어 4 년간 (2020–2024) 의 극궤도 위성 (polar-orbiting satellite) 측정 자료와 비교·검증되었다. 2024 년 5 월 지자기 초강력 폭풍 (geomagnetic superstorm)—20 년 만에 가장 강력한 폭풍—동안, 이 방법은 전기 구조가 초속 11,000 m 를 넘는 속도로 이동한 일시적 (transient)(빠르게 나타나고 빠르게 사라지는) 현상을 감지했으며, 이는 이 우주 공간 영역에서 이전까지 기록된 어떤 값보다도 빠른 속도이다.

1. 서론 (Introduction)

지구 상층 대기의 부분 전리 층인 전리권 (ionosphere) 의 하부 경계 근처에서는, 지자기 폭풍 (geomagnetic storm) 중에 강렬하고 미세한 규모의 플라스마 난류 (plasma turbulence) 가 관측된다. 이 난류는 오로라 일렉트로젯 (auroral electrojet) 에 속하는 전류 내부에서 나타나는 붕괴파 (crashing wave) 의 형태를 띤다. 오로라나 자기권-전리권 (MI) 결합 (magnetosphere-ionosphere coupling) 과 같은 대규모 현상에 비하면, 이 난류파는 크기가 수 미터에 불과한 미시적 구조물이다. 오로라 주변에서 생성되는 이 고도로 구조화된 난류 플라스마는 이후 전리권을 통한 전파 전파 (radio propagation) 를 교란하며 (Bahcivan et al., 2006), 이 신호의 특성 파장은 수백 미터에 불과하다.

팔리-부네만 (FB) 파 (Farley-Buneman wave, Farley, 1963; Buneman, 1963) 에 의해 생성되는 일렉트로젯 난류 (electrojet turbulence) 는 외부에서 인가된 전기장 (Ivarsen et al., 2025a) 에 의해 여기 (excitation) 되며, 이 전기장은 고도 90 km 에서 120 km 사이에서 이온과 전자 사이에 상대 속도를 유발한다. 이 고도에서 이온은 충돌을 경험하여 운동이 제한되는 반면, 전자는 훨씬 작은

크기 덕분에 영향을 받지 않는다. 그 결과 발생하는 분극 (polarization) 은 드리프트 속도가 약 400 m/s(약 20 mV/m) 를 초과할 때 불안정성 (instability) 을 유발한다 (St.-Maurice and Hamza, 2001).

팔리-부네만 파를 촉발하는 전기장은 줄 가열 (Joule heating) 에 비례하며, 이 전기장의 변동성, 즉 시공간적 분산 (spatio-temporal variance) 은 우주 기상 (space weather) 모델링에서 핵심적인 물리량이다 (Codrescu et al., 1995; Rosenqvist et al., 2006; Deng and Ridley, 2007; Knipp et al., 2004). 그러나 이 물리량을 신뢰성 있게 측정하는 것은 매우 어렵다. 궤도 위성은 플라스마를 정적인 1 차원 단면으로만 관측하고, 종래의 SuperDARN 레이더 (Thomas and Shepherd, 2018) 를 이용한 통상적인 전기장 측정 방법은 크기 45 km 미만, 지속 시간 1 분 미만의 규모를 분해할 수 없기 때문이다. 반면 초고주파 (VHF) 레이더 ICEBEAR 는 1 km 및 1 초 수준까지 분해할 수 있으며, 최근 레이더 추적 기술의 발전으로 난류 물리학의 기존 한계를 우회하여 전리권 전기장을 정량화하는 방법이 개발되었다.

그 방법을 설명하기 위해, 우선 팔리-부네만 파의 붕괴가 빠르고 빈번하게 발생하는 오로라 전리권 (auroral ionosphere) 에 대한 설명부터 시작한다. 이들 붕괴파의 전체 합산은, 시간과 공간 속에서, 자기권이 부과하는 구동 전기장 (driving electric field) 의 구조를 윤곽 짓는다 (Ivarsen et al., 2025a). 파동의 단명성 (短命性), 즉 소멸성 (ephemeral quality) 으로 인해 오로라 주변의 팔리-부네만 난류 발생은 추적자 (tracer) 로 기능하며, 이동하는 전기장 구조체의 형태와 궤적을 추적한다 (Ivarsen et al., 2024c). 이를 처음 활용한 것은 Ivarsen et al. (2024b) 의 추적 연구로, 오로라 호 (auroral arc) 주변의 전기장 측정값을 제공했다. 이것이 가능한 이유는, 고도 약 150 km 이상에서 플라스마가 자기장에 “동결 (frozen into)” 되어 있어, 하부 전리권에서의 전기장 구조체 운동이 대류 전기장 (convection electric field) 을 추적하기 때문이다 (Ivarsen et al., 2024b,c).

이를 바탕으로, 본 논문에서는 캐나다 서스캐처원 (Saskatchewan) 주 래빗 레이크 (Rabbit Lake) 관측소 상공에서 레이더 에코 (radar echo) 클러스터가 나타나고 소멸하는 과정을 체계적으로 식별하고 추적하는 포괄적인 방법론을 제시한다. 이는 Ivarsen et al. (2024b) 이 제시한 추적 방법에, 항공 및 방위 분야에서 흔히 적용되는 현대적 추적 기술과 영상 피드 모니터링에 적용되는 기법을 결합함으로써 구현된다. 본 논문은 해당 방법이 오로라 전리권에서의 극단적 ($> 10,000$ m/s) 사건을 검출할 수 있음을 결론으로 제시한다.

2. 방법 (Methods)

본 연구에서 구현한 처리 체계는 ICEBEAR 레벨-2 에코 데이터 (Huyghebaert et al., 2019, 2021) 를 입력으로 하는 세 단계 연쇄 파이프라인이다. 최근 Ivarsen et al. (2024b) 은 레이더 후방산란 표적의 클러터 (clutter), 즉 클러스터 (cluster) 를 시공간적으로 자동 추적하는 알고리즘을 구현한 바 있다. 본 논문은 그 절차를 개선한다.

과거에도 두드러진 특징 (salient feature) 을 식별하고 그 질량 중심 (center-of-mass) 의 운동을 추적할 수 있었지만, 우리는 더 많은 클러스터를 식별·추적하고 난류 (turbulent) 집합체의 진화를 보다 용이하게 추적할 수 있는 알고리즘으로 기계학습 능력을 향상시켰다. 우리는 알파-형상 (α -shape) 을 이용하여 프레임에서 프레임으로 이어지는 형상 진화를 추적하는데, 이때 이전 시간 프레임에 기반한 예측을 부분적으로 활용한다. 그런 다음 클러스터의 중심 위치를 추적하고, 최종적으로 추적된 소용돌이 (swirl) 의 속도를 추론한다. 이 과정에는 여러 기술적 세부사항이 수반되지만, 본질적으로는 빠르게 흐르는 강의 난류 소용돌이를 눈으로 볼 때 뇌가 하는 것과 동일한 작업임을 기억해야 한다. 즉, 뇌는 공간 또는 시간상에서 소용돌이의 탄생을 감지하고, 여러 소용돌이를 동시에 추적하며, 그 형태의 진화를 관찰하고 소멸까지 목격할 수 있다. 우리의 기계학습 알고리즘은 이 과정을 모사하여, 연속된 시간 프레임 사이에서 소용돌이의 질량 중심 (중

심, centroid) 의 위치 변화로부터 흐름 속도를 추출한다. 이 소용돌이 속도는 강의 소규모 난류 와류 (eddy) 의 운동을 통해 강의 흐름을 파악하는 방식과 유사하게, 전체 흐름을 잘 기술한다.

알고리즘은 아래에서 더 자세히 설명되는 네 가지 핵심 단계로 구성된다.

1. 점군 발자국 (point-cloud footprint) 의 식별
2. 소용돌이의 형태 변화를 " 합리적인 범위 내 " 에서 허용하는 프레임 간 연관 (frame-to-frame association)
3. 클러스터의 탄생, 소멸, 분열, 병합 처리 및 개별 운동 추적—필요시 짧은 데이터 공백도 허용
4. 추적된 각 중심 궤적을 구간별 속도로 변환

2.1 점군 발자국의 식별 (Identification of point-cloud footprints)

점군 발자국 (point-cloud footprint) 은 이른바 알파-형상 (α -shape; Edelsbrunner and Mücke, 1994) 으로 표현된다. 알파-형상은 레이더 에코가 완전히 채운 개별 영역의 경계를 다각형으로 기술한다. 에코 영역 사이에 공백이 있을 때 개별 알파-형상이 각각 추출된다. 한 영역이 알파-형상으로 인정되려면 연결된 산란체 (scatterer) 의 수가 최소 기준을 충족해야 한다. 알파-형상을 출발점으로 사용하는 예시가 그림 1a 의 색상 음영 영역으로 제시되어 있다. 클러스터는 넓이가 수 km^2 에 달하며, 3 m 크기의 팔리-부네만 (FB) 불안정파 (unstable wave) 로 가득 차 있음을 상기하라. 이 FB 파의 위치가 곧 불안정 클러스터를 정의하며, 이들이 존재하려면 강한 전기장 영역이어야 한다. 이러한 미시-난류 (micro-turbulence) 영역은 그 자체로 수 km^2 를 훨씬 초과하는 규모에서 난류적이며, 우리가 알파-형상을 통해 관측하는 '소용돌이 (swirl)' 를 구성한다.

다음 단계를 위해, 연속된 시간 프레임에서 감지되는 알파-형상의 진행을 정량화해야 한다. 이를 위해 교집합 대 합집합 비 (Intersection over Union, IoU) 로 정의되는 중첩 추적기 (overlap tracker) 를 사용한다. 분자 (교집합) 는 연속된 두 시간 프레임의 형상이 겹치는 면적이다. 분모는 두 형상이 합쳐 덮는 전체 면적으로, 두 연속 알파-형상의 면적의 합에서 겹치는 면적을 뺀 값이다. 알파-형상이 이동하지도 않고 형태도 변하지 않을 때에만 이 비율이 최댓값 1 이 되며, 겹치는 부분이 전혀 없으면 최솟값 0 이 된다.

2.2 프레임 간 연관 (Frame-to-frame association)

개별 또는 복수의 클러스터 집합이 식별된 후, 알고리즘은 각 클러스터의 직전 위치를 파악하고, 이전 위치 변화로부터 선형 외삽 (linear extrapolation) 하여 다음에 나타날 위치를 예측한다. 알파-형상은 시간 프레임에서 프레임으로 넘어가며 변형을 겪기 때문에, 단순히 중심 (centroid, 질량 중심) 만을 추적하는 것은 불가능하다. 먼저 IoU 를 확인한다. IoU 가 0 에 비해 충분히 크다면, 알고리즘은 이전 감지 후 한 시간 프레임이 지난 시점에서 클러스터의 위치가 예측 위치에 가깝다면, 이는 변형 및 실제 위치와 예측 위치 간의 일부 차이에도 불구하고 하나의 특정 소용돌이의 진화를 기술하는 것이라고 결론짓는다. 아래에서 더 자세히 설명하듯, 클러스터의 진화가 위 기준에 부합하는지 여부는 중심 간 거리 (예측 거리와 비교) 와 형태 중첩 정도 (즉, IoU) 를 포함하는 '비용 분석 (cost-analysis)' 을 통해 판단한다.




Figure 1. α -shape association in two tracking situations (rows). Clusters are shown with their current α -shape (solid outline, shaded area) compared to the previous, with gating radii indicated (36 km $\rightarrow$ 15 km). The cost matrix (panels b, d) allows targets to be tracked even in highly cluttered regions [the cluster of clusters around position (0, 0)].

-5-

그림 1. α -형상 연관 (α -shape association) 을 두 가지 추적 상황 (행) 에서 보여준다. 클러스터는 현재의 α -형상 (실선 윤곽, 음영 면적) 과 이전 형상을 비교하는 형태로 표시되며, 게이팅 반경 (gating radius)(36 km, 15 km) 이 표시되어 있다. 비용행렬 (cost matrix)(패널 b, d) 은 위치 (0, 0) 부근의 클러스터 밀집 지역과 같이 극도로 혼잡한 영역에서도 표적 추적을 가능하게 한다.

알고리즘은 '연관기 (associator)' 를 통해 시간 프레임 t 에서의 N_i 개 클러스터와, 9 프레임 소급 탐색 창 (nine-frame look-back window) 내에서 가장 최근의 비어 있지 않은 프레임의 N_j 개 클러스터를 처리한다 (즉, 추적기는 짧은 감지 공백을 허용한다). 연관기는 식별된 각 소용돌이를 구분하기 위해 레이블 (label) 을 사용한다. 시스템은 최종적으로 측정된 레이블된 각 소용돌이

의 진화를 보고한다.

소용돌이 또는 클러스터가 추적되었는지 여부를 결정하기 전에 비용 분석을 수행해야 한다. 이 비용 분석은 $N_i \times N_j$ 비용행렬 (cost matrix) 을 사용하는 선형배정문제 (linear assignment problem) 에 기반한다. 앞서 언급한 바와 같이, 이전 프레임의 각 클러스터 j 에 대해, 해당 클러스터의 순간 속도를 이용한 선형 외삽으로 다음 시간 프레임 t 에서의 위치를 예측한다. 게이팅 반경 (gating radius) 은 중심-예측 간 최대 허용 거리 (km) 이다. 현재 클러스터가 j 의 가능한 매칭 후보로 고려되려면, 먼저 중심 거리가 $D_{\text{gate}} = 10\text{--}40$ km 범위에서 시작하지만, 추적 중에는 이 값이 $D_{\text{predict}} = 5\text{--}15$ km 범위로 더 엄격하게 적용된다. 게이팅 반경보다 더 멀리 떨어진 쌍은 배정 문제에서 완전히 제외된다 (즉, 이 경우 '비용' 은 무한대가 된다).

게이팅 반경 내에 있는 나머지 모든 쌍 (i, j) 에 대해, 예측된 변위만큼 이동시킨 이전 클러스터의 다각형 형상 (polyshape 또는 알파-형상) 과 현재 클러스터의 다각형 형상을 비교한다 (산업 응용 분야의 광학적 구현 예시는 Bewley et al., 2016; Wojke et al., 2017 참조). 중심-예측 간 거리 (km) 를 $d = D_{\text{mat}}(i, j)$ 로 표기하면, 쌍에 대한 비용은 다음 방정식으로 정의된다.

$$\text{Cost}(i, j) = d \cdot [1 + \lambda(1 - \text{IoU})] \quad (1)$$

여기서 무차원 가중치 λ 는 형태 불일치와 중심 거리의 상대적 기여도를 조절한다. 우리는 보정 데이터셋이 없는 상황에서 최대 엔트로피 (maximum-entropy) 선택이자 SORT 알고리즘 (Simple Online and Realtime Tracking; Bewley et al., 2016) 이 암묵적으로 채택한 균형값인 $\lambda = 1$ 로 설정한다. 이 선택에서, 형상이 완벽하게 연속될 때 ($\text{IoU} = 1$) 는 비용이 운동학적 거리 d 로 줄어 들고, 중첩이 전혀 없을 때 ($\text{IoU} = 0$) 는 비용이 $2d$ 로 두 배가 된다. 이로써 공간적으로 가까이 있지만 실제로는 서로 다른 객체인 에코 클러스터가 임의의 클러스터의 예측 진화를 방해하지 않도록 보장한다. 이 구조는 연속 데이터 스트림에서 실시간 솔버로 구현하기에 용이하며, 본 연구에서는 MATLAB 의 `matchpairs(Cost, Dgate)` 함수를 이용하여 역사적 데이터에 적용하였다. 이 함수는 헝가리안/뮈크레스 알고리즘 (Hungarian/Munkres algorithm; Kuhn, 1955) 으로 배정 문제를 해결한다. 간단히 말해, 이 알고리즘은 N_j 개의 관측 클러스터에 대한 점수표 조합 전체를 고려하여, 시간 t 에서 관측된 전체 소용돌이 집합에 대해 절댓값 기준으로 최적 (즉, 최소 비용) 인 단일 전역 (global) 매칭 조합을 찾아낸다.

그림 1a, b) 는 연관기가 만든 스냅샷 예시로, 각 관측 궤적이 자연스럽게 이전 궤적에 배정되는 깔끔하고 추적이 용이한 상황을 보여준다. 많은 소규모 클러스터들이 서로의 게이팅 반경 안에 들어오는 '혼잡한' 추적 상황에 대해서는 그림 1c, d) 를 참조하라. 예상할 수 있듯이, 소규모 클러스터는 크기에 비해 너무 빠르게 이동할 경우 IoU 가 높아지는 경향이 있어 비용이 높아지는 경향이 있다.

2.3 탄생, 소멸, 병합, 분할 (Births, deaths, mergers, and splits)

앞서 설명한 할당 문제 (assignment problem) 를 처리하고 나서도, 클러스터가 1-대-1 대응으로 명확히 식별되지 못하여 추적이 중단되는 추가적인 상황들이 남아 있다. 우선, 새로운 형상 (shape) 이 나타날 때, 그 형상과 이전 시간 스텝에서 확인된 클러스터의 교집합 영역이 해당 클러스터 면적의 5% 를 초과하면, 새 클러스터는 대응된 부모 (parent) 의 분할 산물 (split product) 로 해석된다. 그리하여 다음에 등장하는 새 표적 (target) 에는 기존의 속도 추정치와 게이팅 (gating) 이 부여된다.




Figure 2. The three distinct lineages, or series of co-evolving clusters of radar echoes, recorded between 04:45 and 04:51 UT on 1 March 2021. Panel a) shows the lineages themselves; panel b) details ‘Lineage 3’ in 24 snapshots. Clusters are plotted as α -shapes overlaid on auroral images from the TREX RGB system (Gillies et al., 2020).

-7-

그림 2. 2021 년 3 월 1 일 04:45~04:51 UT 사이에 기록된 세 개의 뚜렷한 계통 (lineage), 즉 레이더 에코 클러스터들이 함께 진화하는 연속 계열. 패널 a) 는 계통 자체를 보여주며, 패널 b) 는 ‘계통 3(Lineage 3)’ 을 24 개의 스냅샷으로 상세히 나타낸다. 클러스터는 trex rgb 시스템 (Gillies et al., 2020) 의 오로라 이미 지 위에 겹쳐진 형상으로 표시된다.

이렇게 함으로써, 서로 다른 시간과 공간의 여러 지점에서 속도를 연속적으로 감시할 수 있으며, 자기장 강도 사건들이 나타나거나 빠르게 소멸하는 확률론적 앙상블 (stochastic ensemble) 의 긴 꼬리 (long tail) 와 일관된 흐름장 (flow field) 을 얻을 수 있다. 이러한 장부 관리 (bookkeeping) 방식은 확장표적추적 (extended-target tracking; Granström et al., 2017, 및 그 참고문헌) 에서 차

용한 것으로, 단일 레이블만으로는 일-대-다 (one-to-many) 사건과 부모/자식 계보 (parent/child provenance) 를 명시적으로 처리하지 않고서는 표현할 수 없다.

2.4 추적된 각 중심 궤적을 분할 속도로 변환 (Converting each tracked centroid trajectory into segmented velocities)

각 클러스터의 탄생부터 소멸까지 전체 진화 과정을 문서화한 후, 클러스터 중심 (centroid) 의 궤적 (클러스터 에코 질량 중심의 중앙값 위치) 을 지자기 변위 (geomagnetic displacement) 기준 두 개의 스칼라 시계열로 취급한다. 하나는 동쪽 방향, 다른 하나는 북쪽 방향이며, 단위는 km 이고, 각 궤적의 첫 번째 지점을 기준으로 한다. 각 성분은 구간별 (piecewise) 방식으로 모형화되며, 시간에 대해 선형으로 처리된다. 알고리즘은 등속도 모형 (constant-velocity model) 이 적합한 구간으로 궤적을 분할한다. 이를 위해 슬라이딩 윈도우 (sliding window) 를 한 샘플씩 앞으로 확장하는데, 활성 변위 성분 (즉, 범위가 최소 변위 임계값을 초과하는 성분) 마다, 시간과의 선형 상관관계가 고정된 임계값 아래로 떨어지면 비선형 구간에서 추적이 중단된다 (Keogh et al., 2001 의 온라인 구간별 선형근사 (piecewise-linear approximation) 방식과 유사).

이 방법의 핵심 출력값인 클러스터 전체의 속력 (speed) 은 $|v| = \sqrt{v_e^2 + v_n^2}$ 로 표현되며, 여기서 아래 첨자 e, n 은 각각 동쪽 (eastward) 및 북쪽 (northward) 속도 성분을 나타낸다. 이 속도는 국지적인 자기장 벡터를 알고 있거나 (혹은 전지구 모형으로 추정할 경우) 전기장으로 간편하게 변환할 수 있다. 속력 오차는 표준 오차 전파 (quadrature) 로 산출한다.

$$\sigma_{|v|} = \frac{1}{|v|} \sqrt{(v_e \sigma_e)^2 + (v_n \sigma_n)^2} \quad (2)$$

또한, 클러스터 운동의 방위각 (bearing, 또는 azimuth) 은 $\theta = \text{atan2}(v_e, v_n)$ 으로부터 구하며, $[0^\circ, 360^\circ)$ 범위로 변환 (wrap) 된다.

그림 2a) 는 전체 과정에 대한 실용적인 예시를 제공한다. 이 예시는 2021 년 3 월 1 일 04:45 UT~04:51 UT 사이에 “슈퍼 클러스터 (super-cluster)”, 즉 계통 (lineage) 들이 나타났던 시간대에서 가져온 것이다. 그림 2b) 는 오로라 호 (auroral arc) 의 극향 (poleward) 경계를 3 분 이상 밀접하게 따라가는 일련의 구조가 관찰된 특히 흥미로운 부분 집합의 상세한 진화를 보여준다. 이 시간 간격 동안, 두 클러스터가 병합되었고 (약 47 초 시점), 이어서 대규모 병합 (약 57 초), 분할 (약 85 초), 그리고 최종적인 소멸이 일어났다.

3. 데이터 (Data)

2 장의 방법론은 각 레이더-오로라 클러스터를 레이블이 붙은 궤적 (trajectory), 즉 트랙 (track) 으로 변환하고, 2.2 절의 자기장 투영 (magnetic-field projection) 을 통해 지역 전기장 (local electric-field) 추정값으로 전환한다 (Ivarsen et al., 2024c). 이 절에서는 앞서 제시한 해석을 뒷받침하는 네 건의 지상-위성 동시관측 (space-ground conjunction) 을 다룬다. 그림 3(2021 년 5 월 20 일) 과 그림 4(2021 년 5 월 12 일) 는 추적된 운동을 DMSP F16 이 측정한 현장 이온 드리프트 (in-situ ion drift) 에 고정함으로써, 표준 오로라 구동 (standard auroral driving) 조건 아래서 대리 관계 (proxy relation) 를 검증한다. 그림 6 과 7(2024 년 5 월 10 일) 은 최근 G5 슈퍼폭풍 (G5 superstorm) 기간에 동일한 대리 관계를 적용한 것으로, 첨점 (cusp) 의 적도측 가장자리 (equatorward edge) 폐쇄 자기력선 (closed field-lines) 위에서 이루어진 관측이다 (이 동시관측은 Ivarsen et al., 2025b 에서 처음 보고되었다). 두 슈퍼폭풍 동시관측 동안, 6,000 m/s 를 초과하는 속도로 이동하는 클러스터 10 개를 검출했으며, 그 중 가장 빠른 것은 5 초 지속 이벤트로 피팅 속도가 $11,240 \pm 660$ m/s 였다.

2021 년 5 월 20 일 11:59:48 UT 에서 12:15:44 UT 사이에, ICEBEAR 는 분할 속도 (segmented-velocity) 분석에 진입할 만큼 충분한 지속 시간을 가진 클러스터 94 개를 분해했다 (그림 3f). 가중 중앙값 (weighted-median) 분할 속도는 770 m/s 였으며, 속도-분할 분포는 $\sigma = 965$ m/s 인 가우시안 (Gaussian) 으로 잘 기술된다. 같은 시간 구간에 수집된 DMSP F16 수평 이온 드리프트 (horizontal ion-drift) 모멘트의 평균은 851 m/s 였으며, 1σ 산포는 209 m/s 였다.




Figure 3. Conjunction between DMSP F16 and icebear on 20 May 2021. Panel a) shows DMSP F16 orbit (blue), superposed on a vector-field of SuperDARN global convection (black arrows) and ICEBEAR echo locations (gray dots). Panel b) shows the ICEBEAR tracked motions (black arrows) and the DMSP F16 horizontal ion drifts (red arrows). Panel c) shows the DMSP F16 horizontal ion drifts (red line), while panels d) and e) show the precipitating electron and ion differential energy flux, respectively, represented with a colorscale. In panels c–e), the latitudinal distribution of ICEBEAR echoes is superposed with a blue line. Panel f) shows, on the left y -axis, the distribution of tracked ICEBEAR clusters (black circles), taking the eastward component only, with a dashed black line giving the weighted median speed (770 m/s). On the right y -axis, the distributions in ICEBEAR per-frame displacements is shown in a solid red line, with a Gaussian fit displayed with a dashed red line ($\sigma = 965$ m/s). The distribution in DMSP F16 ion drifts is shown with a green line, with a mean of 851 m/s and a standard deviation of 209 m/s.

그림 3. 2021 년 5 월 20 일 DMSP F16 과 ICEBEAR 간의 동시관측 (conjunction). 패널 a) 는 SuperDARN 전지구 대류 (global convection) 벡터장 (흑색 화살표) 및 ICEBEAR 에코 위치 (회색 점) 에 중첩된 DMSP F16 의 궤도 (파란색) 를 보여준다. 패널 b) 는 ICEBEAR 추적 운동 (흑색 화살표) 과 DMSP F16 수평 이온 드리프트 (적색 화살표) 를 보여준다. 패널 c) 는 DMSP F16 수평 이온 드리프트 (적색 선) 를 보여주며, 패널 d) 와 e) 는 각각 강하 전자 (precipitating electron) 와 이온 (ion) 의 미분 에너지 플럭스 (differential energy flux) 를 컬러스케일로 나타낸다. 패널 c)~e) 에는 ICEBEAR 에코의 위도 분포가 파란색 선으로 중첩되어 있다. 패널 f) 는 왼쪽 y 축에 동쪽 성분만 취한 추적 ICEBEAR 클러스터의 분포 (흑색 원, 가중 중앙값 속도 770 m/s 를 점선 흑색으로 표시) 를 보여준다. 오른쪽 y 축에는 ICEBEAR 프레임별 변위 분포가 실선 적색으로, 가우시안 피팅이 점선 적색 ($\sigma = 965$ m/s) 으로 표시된다. DMSP F16 이온 드리프트 분포는 녹색 선으로, 평균 851 m/s, 표준편차 209 m/s 로 나타난다.

두 분포는 분포의 최빈값 (mode) 에서 일치하지만, ICEBEAR 분포는 클러스터 내 변위 (in-cluster displacement) 의 수가 많아 훨씬 넓게 퍼져 있다 (그 속도 분포는 그림 3f) 의 실선 적색으로 표현된다). 이 변위들은 정량화된 트랙에서 평균화되는데, 1,400 m/s 를 초과하는 트랙이 5 개에 불과하고 나머지 트랙의 속도는 녹색 히스토그램 (F 영역 이온 드리프트) 에 완전히 포함된다는 점이 이를 증명한다. 그림 3f) 의 분할 속도 (segment speed) 긴 꼬리 (long tail) 는 ICEBEAR 의 탁월한 시공간 분해능이 포착한 소규모 변동성을 나타낸다.

94 개의 추적된 표적 운동 전체가 그림 3b) 에 표시되어 있으며, 이는 추적 분할의 시공간 평균 결과인 화살표로 나타난다. 위성의 1 차원 단면이 안정적인 동향 (eastward) '흐름' 의 인상을 주는 반면, ICEBEAR 는 이 흐름 안에서 '역방향 스트리밍 (counter-streaming)' 거동을 관측할 수 있으며, 이는 경우에 따라 어느 방향으로든 주변 장 (ambient field) 을 압도하지만, 동향에 대한 약한 선호성이 관찰된다. 그림 3c)~e) 에서 레이더 에코는 저에너지 강하의 경계면이자 주변 장 최대 세기의 위도와 일치하는, 확산적 (diffuse) 이고 고에너지를 가진 오로라 패치 (auroral patch) 의 극측 (poleward) 경계에서 관측되었음을 확인할 수 있다.

그림 3f) 의 평균값과 분포를 살펴보면, 녹색 분포와 흑색 원의 일치가 Ivarsen et al.(2024b,c, 2025c) 의 검증을 확장함을 알 수 있다. 이 선행 연구들은 추적된 레이더 운동을 동시 Swarm, DMSP, SuperDARN 관측으로 추론한 이온 드리프트와 비교하여 좋은 일치를 얻었다. 약 8 일 앞선 2021 년 5 월 12 일에 ICEBEAR 와 DMSP F16 사이에서 발생한 유사한 동시관측도 이 일관된 그림에 부합한다 (그림 4).




Figure 4. A similar conjunction to Figure 3, with panels a–c) showing the ion drift and particle precipitation data from DMSP F16 (echo distributions overlaid in blue), and panel d) showing the window variability in tracked speeds (black circles), individual per-frame displacement speeds (red line), and DMSP F16 ion drifts (green line).

–10–

그림 4. 그림 3 과 유사한 동시관측으로, 패널 a)~c) 는 DMSP F16 의 이온 드리프트 및 입자강하 (particle precipitation) 데이터 (에코 분포를 파란색으로 중첩) 를 보여주고, 패널 d) 는 추적 속도의 윈도우 변동성 (흑색 원), 프레임별 개별 변위 속도 (적색 선), DMSP F16 이온 드리프트 (녹색 선) 를 나타낸다.

다음으로, 2024 년 5 월 10 일 약 18:00 UT 와 18:40 UT 에 발생한 두 건의 지상-위성 동시관측 을 분석한다. 그림 5 는 Rabbit Lake 관측소에서 고위도 홀 전류 (Hall current) 를 통해 관측된 이 폭풍의 국지적 전개를 적색 선으로 보여준다. 에코 검출률 (echo detection rate) 과 두 건의 우연한 동시관측 시각이 함께 중첩되어 있다.




Figure 5. The rate of received ICEBEAR echoes (in number of echoes per second), shown in black line and on the left y -axis, compared with the northward magnetic field component observed by the Rabbit Lake SuperMAG (Newell and Gjerloev, 2011) magnetotometer, with the values inverted, and plotted on the right y -axis, with a red line. The timing of the two conjunctions, between ICEBEAR and METOP-1 and NOAA-18 respectively, are indicated, and the magnetic local time (MLT) of the radar bisector is indicated on the bottom x -axis.

그림 5. ICEBEAR 의 초당 수신 에코 수 (흑색 선, 왼쪽 y 축) 를 Rabbit Lake SuperMAG(Newell and Gjerloev, 2011) 자력계가 관측한 북향 자기장 성분 (값을 반전하여 적색 선, 오른쪽 y 축으로 표시) 과 비교한 그림. ICEBEAR 와 METOP-1, NOAA-18 각각의 두 동시관측 시각이 표시되어 있으며, 레이더 이등분선의 자기지방시 (magnetic local time, MLT) 가 아래쪽 x 축에 나타나 있다.




Figure 6. Conjunction between metop-1 and icebear at 18:00 UT on 10 May 2024. **Panel a)** shows METOP-1's orbit (blue), superposed on a vector-field of SuperDARN global convection (black arrows) and ICEBEAR echo locations (gray dots). **Panels b) and c)** show the electron and ion fluxes measured by METOP-1 (medium-energy, 0° telescopes), while **panel d)** shows the trapped particle fluxes. In panels b-d), the latitudinal distribution of ICEBEAR echoes is superposed with a green line. **Panel e)** shows, on the left y -axis, the distribution of tracked ICEBEAR clusters (black circles) that were tracked during a 20-minute interval centred on the conjunction, with a dashed black line giving the weighted median speed (1388 m/s). On the right y -axis, the distributions in ICEBEAR velocity segments is shown in a solid red line, with a Gaussian fit displayed with a dashed red line ($\sigma = 2056$ m/s). Cluster 3624, whose speed was determined to $11,240 \pm 660$ m/s, is indicated, and its evolution is shown in detail in **panel f)**, showing the displacement of the identified α -shape (see Section 2).

-12-

그림 6. 2024 년 5 월 10 일 18:00 UT 에 이루어진 MetOp-1 과 ICEBEAR 의 동시관측 (conjunction). 패널 a) 는 SuperDARN 전지구 대류 벡터장 (흑색 화살표) 및 ICEBEAR 에코 위치 (회색 점) 에 중첩된 MetOp-1 의 궤도 (파란색) 를 보여준다. 패널 b) 와 c) 는 MetOp-1(중간 에너지, 0 번 망원경) 이 측정한 전자 및 이온 플럭스를 보여주고, 패널 d) 는 포획 입자 (trapped particle) 플럭스를 나타낸다. 패널 b)~d) 에는 ICEBEAR 에코의 위도 분포가 녹색 선으로 중첩되어 있다. 패널 e) 는 왼쪽 y 축에 동시관측을 중심으로 한 20 분 구간 동안 추적된 ICEBEAR 클러스터의 분포 (흑색 원, 가중 중앙값 속도 1,388 m/s 를 점선 흑색으로 표시) 를 보여준다. 오른쪽 y 축에는 ICEBEAR 속도 분할 분포가 실선 적색 ($\sigma = 2,056$ m/s 인 가우시안 피팅을 점선 적색으로 표시) 으로 나타난다. 속도가 $11,240 \pm 660$ m/s 로 결정된 Cluster 3624 가 표시되어 있으며, 그 진화 과정이 패널 f) 에 상세히 나타나 있다. 패널 f) 는 식별된 $\wedge$ 형상 (2 절 참조) 의 변위를 보여준다.




Figure 7. The evolution of Cluster 3706, whose speed was determined to $10,406 \pm 900$ m/s, in four snapshots, showing the displacement of the identified α -shape (see Section 2 and Figure 6f).

그림 7. 속도가 $10,406 \pm 900$ m/s 로 결정된 Cluster 3706 의 진화 과정을 네 스냅샷으로 보여주며, 식별된 α 형상의 변위를 나타낸다 (2 절 및 그림 6f 참조).

그림 6 은 2024 년 5 월 10 일 당일 G5 슈퍼폭풍의 주상 (main phase) 동안 18:00 UT 에 발생한 MetOp-1 동시관측을 상세히 보여준다. 이 관측은 주간 측 첨점 (dayside cusp) 의 적도측 가장자리 (equatorward edge) 또는 그 부근에서 이루어졌다. MetOp-1 은 EUMETSAT 이 운용하는 기상 위성으로, 여러 망원경을 통해 강하 입자 (precipitating particle) 를 측정할 수 있는 미국 NOAA 위성과 사실상 동일한 관측 장비를 갖추고 있다. ICEBEAR 는 동시관측을 중심으로 한 12 분 구간에서 클러스터 59 개를 분해했다. 클러스터 속도 분포 (그림 6e) 는 가중 중앙값 $1,388$ m/s, 분할 피팅 $\sigma = 2,056$ m/s 로, 두 값 모두 그림 3 의 2021 년 동시관측에서 측정된 값과 비교해 약 2 배 크다. 그림 6b), c) 의 MEP(중간 에너지 입자, medium-energy particle) 강하 입자 채널은 50 eV~ 1 keV 전자 및 이온 플럭스 모두에서 강하 신호를 보여주며, 이는 ICEBEAR 에코 분포의 대부분과 자기 위도 (mlat) 가 일치한다. 패널 d) 의 TED(총 에너지 검출기, total energy detector) 채널은 동일한 mlat 구간에서 $40, 130, 287$ keV 의 상당한 포획 전자 플럭스를 보여준다. 이 조합은 관측된 레이더 오로라가 주간 오로라 오벌 (dayside auroral oval) 의 개방-폐쇄 경계 (open-closed boundary) 바로 안쪽 폐쇄 자기력선 (closed field-lines) 위에 위치함을 시사하며, 이는 (Ivarsen et al., 2025b) 에서 이 이벤트에 대해 기술된 구성 및 2023 년 4 월 23 일 폭풍 때 관측된 유사 조건 (Ivarsen et al., 2025c) 과 일치한다.

이 구간 내 특정 클러스터로, 추적 알고리즘이 Cluster 3624 로 레이블을 붙인 것 (그림 6f) 은 자기 북쪽으로부터 시계 방향으로 72° 방위각에서 5 초의 추적 지속 시간 동안 피팅 속도 $11,240 \pm 660$ m/s 를 보였다. 무게 중심 (centroid) 은 해당 구간 동안 동쪽으로 $x = 52.6$ km, 북쪽으로 $y = 16.6$ km 이동했다. 무게 중심 위치에서 IGRF-13 으로 구한 $|B|$ 를 이용해 $|E| = |v||B|$ 로 환산하면 전기장 크기는 약 560 mV/m 이 된다 (이 값은 클러스터의 다섯 샘플에 걸친 슬라이딩 윈도우 구간별 선형 회귀의 기울기로 얻어짐을 상기하라). 그림 6f) 의 α 형상 시퀀스는 짧은 진화 과정 전반에 걸쳐 클러스터의 전체적인 형태를 유지하며, 무게 중심 경로는 직선이고, 각 단계의 운동학적 예측이 다음 관측된 α 형상 내에 정확히 도달한다. 이를 통해 극단적인 궤적이 추적 알고리즘으로 정확하게 측정됨을 확인할 수 있다 (이 이벤트 동안 관측된 또 다른 극단적으로 빠른 클러스터에 대해서는 그림 7 도 참조).

약 40 분 뒤, 미국 기상 위성 NOAA-18 이 동일 지역을 통과했는데, 이번에는 전리권 첨점 (ionospheric cusp) 을 가로질렀다 (Ivarsen et al., 2025b). 그림 8a)~d) 는 활성 에코 영역이 첨점의 적도측 가장자리 (equatorward edge) 위 또는 그 근방의 폐쇄 자기력선 위에 발생했음을 보여준다. 두 번째 슈퍼폭풍 동시관측 동안 추적 속도 변동성이 이전보다 약간 낮아졌지만 ($\sigma = 1,643$

m/s 대 이전 $\sigma = 2,056$ m/s), 6,000 m/s 를 초과하는 클러스터 4 개를 관측했으며, 그중 하나의 진화 과정을 그림 8f) 에 상세히 나타냈다.




Figure 8. Conjunction between NOAA-18 and icebear at 18:30 UT on 10 May 2024. **Panel a)** shows NOAA-18's orbit (blue), superposed on a vector-field of SuperDARN global convection (black arrows) and ICEBEAR echo locations (gray dots). **Panels b) and c)** show the electron and ion fluxes measured by NOAA-18 (medium-energy, 0° telescopes), while **panel d)** shows the trapped particle fluxes. In panels b-d), the latitudinal distribution of ICEBEAR echoes is superposed with a green line. **Panel e)** shows the distribution of tracked ICEBEAR clusters (black circles) around the time of the conjunction. On the right y -axis, the distributions in ICEBEAR velocity segments is shown in a solid red line, with a Gaussian fit displayed with a dashed red line ($\sigma = 1643$ m/s). Cluster 10142 is indicated, whose evolution is shown in detail in **panel f)**, akin to Figure 6.

-14-

그림 8. 2024 년 5 월 10 일 18:30 UT 에 이루어진 NOAA-18 과 ICEBEAR 의 동시관측 (conjunction). 패널 a) 는 SuperDARN 전지구 대류 벡터장 (흑색 화살표) 및 ICEBEAR 에코 위치 (회색 점) 에 중첩된 NOAA-18 의 궤도 (파란색) 를 보여준다. 패널 b) 와 c) 는 NOAA-18(중간 에너지, 0 번 망원경) 이 측정된 전자 및 이온 플럭스를 보여주고, 패널 d) 는 포획 입자 플럭스를 나타낸다. 패널 b)~d) 에는 ICEBEAR 에코의 위도 분포가 녹색 선으로 중첩되어 있다. 패널 e) 는 동시관측 시각 전후의 추적 ICEBEAR 클러스터 분포 (흑색 원) 를 보여준다. 오른쪽 y 축에는 ICEBEAR 속도 분할 분포가 실선 적색 ($\sigma = 1,643$ m/s 인 가우시안 피팅을 점선 적색으로 표시) 으로 나타난다. Cluster 10142 가 표시되어 있으며, 그 진화 과정이 그림 6 과 유사한 방식으로 패널 f) 에 상세히 나타나 있다.

2024 년 5 월의 두 동시관측은 모두 폐쇄 자기력선 위에서 발생했으며 (그림 6d 및 8d; Ivarsen et al., 2025b 참조), 에코 분포 주변에 광범위한 입자강하 (particle precipitation) 가 동반되었다 (Themens et al., 2024; Madhanakumar et al., 2025 참조). 이는 폐쇄 자기력선 위 주간 동향 과도 현상 (dayside, eastward transients on closed field-lines) 에 대해 기술된 구성과 일치하며 (Ivarsen et al., 2025b,c), 이에 따라 측정된 장 변동성을 확산적 주간 입자강하 (diffuse, dayside particle precipitation; Spasojevic and Inan, 2010; Ni et al., 2014) 에 귀인하며, 이는 그림 6b), c) 에서 해당 지역에 존재함이 확인된다.

앞서 제시된 내용은 그림 6f) 에 기록된 560 mV/m 값을 주목할 만한 것으로 만든다. 이 값은 100~200 mV/m 에 위치하는 STEVE(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement) 분포 (Gillies et al., 2020; Mishin and Streltsov, 2023) 를 초과하며, 약 400 mV/m 로 보고된 가장 극단적인 이벤트 (Anderson et al., 2001) 에 필적하거나 이를 넘어선다. Cluster 3624 의 5 초 추적 지속 시간은 우리가 검출하는 극단적으로 빠른 운동에서 전형적으로 나타나며 (Ivarsen et al., 2024c, 2025b), 이는 극단적인 전기장 구조가 어떠한 대량 드리프트 (bulk drift) 의 지속적인 특징이 아니라 공간적으로 고도로 간헐적이고 국소적임을 지지한다.

4 년치 ICEBEAR 클러스터 속도 분포는 그림 9 에서 같은 기간 동안의 Swarm A 전기장 계기 (EFI, Knudsen et al., 2017) 수직 이온 드리프트 (cross-track ion-drift) 모멘트의 분포와 비교하여 나타낸다. Swarm A 는 고도 약 450 km 의 극궤도 위성이다 (Friis-Christensen et al., 2006). 약 700 m/s 에서 약 4,000 m/s 사이에서 두 분포는 PDF 기준으로 2 배 이내에서 일치하며, 이는 레이더-오로라 추적이 현장 수직 이온 드리프트 측정과 동일한 물리적 드리프트 집단 (drift population) 을 샘플링하고 있음을 강력히 시사한다 (이 점은 알고리즘의 이전 버전에서 Ivarsen et al., 2024b,c 에 의해 확립되었다). 약 5,000 m/s 이상에서 Swarm 분포는 PDF $\approx 10^{-1}$ s/m 에서 평탄화되는데, 이는 수직 이온 드리프트 모멘트가 자세 지터 (attitude-jitter) 및 교정 드리프트 (calibration-drift) 기여분에 의해 지배되는 영역이다 (Knudsen et al., 2017). ICEBEAR 분포는 이 임계값을 지나 그 너머까지 지수함수적으로 감쇠 (exponential decay) 를 지속하며, 약 9,000 m/s 에서 빈 수 (bin-count) 잡음 바닥 (noise floor) 에 도달한다. Cluster 3624(그림 6f) 는 이 분포의 상위 꼬리 (upper-tail) 샘플이다.

그림 9b) 는 트랙 데이터셋에서 지자기 활동도 (geomagnetic activity) 에 따른 추세를 보여주며, 15 분 이동 구간 내 속도 변동성 σ 와 각 지자기 활동도 구간 내 초고속 (superfast, > 6,000 m/s) 클러스터의 발생률을 비교한다. 지자기 활동도 정량화를 위해 SuperMAG 오로라 전기제트 지수 (auroral electrojet index, SME; Newell and Gjerloev, 2011) 를 사용한다. 흑색 데이터에 멱함수 (powerlaw) 를 피팅한 결과가 실선 파란색으로 표시되며, 이에 대해서는 4.2 절에서 논의한다.

앞서의 분석을 통해 (i) 그림 6e) 의 변동성은, Cluster 3624(그림 6f) 를 생성한 바로 그 변동성으로, 지자기 활동도에 명시적으로 의존하며, (ii) 그림 9a) 의 고속 꼬리 (high-speed tail) 는 높은 속도에서 잡음 평탄화의 뚜렷한 징후를 보이지 않고 멱함수 분포를 유지함이 입증되었다. 우리는 추적한 빠른 레이더 운동이 전리권 전기장 (ionospheric electric field) 의 고도로 국소적이고 과도적인 스파이크 (spikes) 를 측정하며, 그 진폭이 지상 기반 관측 장비를 이용해 측정된 역대 가장 강력한 값임을 결론짓는다.

4. 토의 및 요약 (Discussion & Summary)

우리는 헝가리안 연결 방식 (Hungarian-association scheme) 을 α -형태 발자국 (α -shape footprint) 에 적용하여 E-영역 레이더 오로라 (E-region radar aurora) 클러스터를 시공간적으로 추적하였다. 이 발자국은 3 차원 레이더 포인트 클라우드 (3D radar point-cloud) 에서 클러스터를 포함하며, 각 추적된 클러스터 궤적 (trajectory) 은 구간별 선형 속도 (piecewise-linear velocity) 로

환원하였다. 이 절차를 통해 특히 ICEBEAR 의 시야 (field-of-view) 내에서 킬로미터 규모의 공간 분해능과 초 단위 시간 분해능으로 전기장 구조 속도 (electric-field structure velocity) 의 분포를 산출할 수 있었다.

4.1 전리권 전기장의 프록시 측정 (Proxy measurements for the ionospheric electric field)

통계 비교, 즉 그림 9a) 의 흑색 및 적색 곡선은, 기존의 신뢰할 수 있는 전기장 측정 수단인 Swarm 위성으로 전기장이 식별되는 범위에서 ICEBEAR 가 노이즈 한계를 돌파하여 약 9,000 m/s 의 거의 사라지는 빈도수 (bin count) 에 이르기까지 멱함수 (power-law) 분포를 나타냄을 명확히 보여준다. 또한 그림 9b) 에서 입증한 바와 같이, 우리는 소규모 오로라 전기장 (small-scale, auroral electric field) 분산에 대한 지자기 활동도 (geomagnetic activity) 의존성을 명시적으로 정량화할 수 있었다.




Figure 9. **Panel a)** shows, in a solid black line, the distribution of 74,517 clusters tracked by ICEBEAR during geomagnetically disturbed conditions (SME-index > 150 nT). The distribution of ion drifts speed derived from Swarm A EFI horizontal moments, during the same conditions and inside the auroral region ($18h < MLT < 6h$, $61^\circ < MLAT < 69^\circ$), is shown with a solid red line. A dashed red line indicates the noise limitation caused by spacecraft attitude jitter and anomalous spacecraft potential and calibration drift (Knudsen et al., 2017). **Panel b)** shows the same dataset, this time binning all the tracked clusters into 4190 bins of 15-minute length (for a total of 1045 hours of radar-time), then binning (for the second time) the standard deviations, σ , of the cluster speeds inside each window, for the 24 geomagnetic activity bins. Black circles with errorbars denote average σ in each geomagnetic activity bin, and a black dashed line shows the result of a linear regression (slope = 572 m/s/, Pearson correlation = 0.84). In green, on the right y-axis, the occurrence rate for speeds > 6000 m/s is shown for each geomagnetic activity bin.

그림 9. 패널 a) 는 지자기 교란 조건 (SME 지수 > 150 nT) 동안 ICEBEAR 가 추적한 74,517 개 클러스터의 분포를 실선 (흑색) 으로 나타낸다. 동일 조건 및 오로라 영역 ($18h < MLT < 6h$, $61^\circ < MLAT < 69^\circ$) 내에서 Swarm A EFI 수평 모멘트 (horizontal moments) 로 도출된 이온 표류 속도 (ion drift speed) 의 분포는 실선 (적색) 으로 표시된다. 적색 파선은 위성 자세 지터 (spacecraft attitude jitter) 와 이상 위성 전위 (anomalous spacecraft potential) 및 교정 드리프트 (calibration drift) 에 의한 노이즈 한계를 나타낸다 (Knudsen et al., 2017). 패널 b) 는 동일 데이터셋을 대상으로, 추적된 전체 클러스터를 15 분 길이의 4,190 개 bin (bin) 으로 분류 (총 1,045 레이더 관측 시간) 한 뒤, 각 윈도우 내 클러스터 속도의 표준 편차 (σ) 를 24 개 지자기 활동도 bin으로 재분류한 결과를 보여준다. 검은 원과 오차 막대는 각 지자기 활동도 bin에서의 평균 σ 를 나타내며, 흑색 파선은 선형 회귀 결과 (기울기 = 572 m/s/nT, 피어슨 상관계수 = 0.84) 를 나타낸다. 우측 y 축의 녹색은 각 지자기 활동도 bin에서 6,000 m/s 이상 속도의 발생률을 나타낸

이 발견의 중요성을 명확히 하기 위해, 오로라 전기장 (auroral electric field) 이 전기장의 이차 모멘트 (second moment) 를 통해 그 중요 영역의 에너지 수지 (energy budget) 를 지배한다는 점에 주목한다. 높이 적분된 줄 소산 (height-integrated Joule dissipation) 은 다음과 같이 척도화된다.

$$|E|^2 = |\langle E \rangle|^2 + \text{Tr Cov}(E), \quad (3)$$

여기서 분산 항 $\text{Tr Cov}(E) = \text{Var}(E_x) + \text{Var}(E_y)$ (E 의 공분산 추적 (trace of the covariance)) 은 소산에 대한 전기장 구조의 기여를 담고 있다 (Codrescu et al., 1995). 분해된 공간 규모의 대류 패턴 (resolved-scale convection pattern) 을 기반으로 시간 진전되는 전구 자기유체역학 (MHD) 모델 (우주기상 모델 (space weather model)) 은 이 핵심 항을 모델의 공간 분해능과 갱신 주기 (update cadence) 이하까지만 표현한다. 이는 격자 이하·주기 이하의 나머지, 즉 줄 가열 (Joule heating) 모델 과소 추정의 원인으로 흔히 지목되는 변동성 (variability)(Deng and Ridley, 2007; Cosgrove et al., 2011) 으로서, 가열을 구동하는 정전기 퍼텐셜 (electrostatic potential) 에서 빠져 있다.

위에서 설명한 결손 (deficit) 은 현대 전구 모델 (contemporary global model) 의 50~100 km 해상도에서도 해소되지 않는다. 수렴 검사 (convergence test) 에서 위도 격자 간격이 2.5° 에서 1.25° 로 좁아질수록 모델 가열률 (heating rate) 은 계속 증가하며 (Deng and Ridley, 2007), 측정된 변동성 스펙트럼 (variability spectrum) 은 45 km 이하에서도 난류 (turbulent) 에너지를 유지하고 (Cousins and Shepherd, 2012), 전구 MHD 에서는 이 분산의 일부를 담당하는 전기류 난류 (electrojet turbulence) 가 시뮬레이션에 내재되지 않아 매개변수화 (parameterize) 되어 삽입되어야 하며, 추가될 경우 극관 전위 (cross-polar-cap potential) 와 전도도 (conductance) 를 10~20% 이동시킨다 (Wiltberger et al., 2017). 관측된 격자 이하 변동성을 주입하면 반구 줄 가열률 (hemispheric Joule-heating rate) 이 약 1.5 배 상승할 수 있다 (Matsuo and Richmond, 2008; Matsuo et al., 2021).

ICEBEAR 레이더 추적은 두 가지 미해결 문제를 해소함으로써 현재 최첨단 수준을 개선하는데 도움을 준다. (1) 레이더 추적은 매우 작은 공간·시간 규모를 포착한다 (ICEBEAR 는 기존 SuperDARN 레이더보다 각각 60 배, 40 배 높은 분해능을 나타낸다). 또한 (2) ICEBEAR 레이더 추적은 Swarm 에 비해 훨씬 높은 전기장 진폭을 분해할 수 있는데, 이는 주로 Swarm 의 위성 자세 지터 및 기기 교정 문제에 기인한다 (Knudsen et al., 2017).

클러스터 3624 는 ICEBEAR 의 광범위한 속도 분포에서 상한 꼬리 (upper-tail) 표본이다 (그림 6f). 적합한 속도 $11,240 \pm 660 \text{ m/s}$ 는 $|E| \approx 560 \text{ mV/m}$ 을 시사하며, 이는 문서화된 STEVE 범위 (100~200 mV/m, Gillies et al., 2020; Mishin and Streltsov, 2023) 를 초과하고, 가장 극단적인 보고된 SAID(Sub-Auroral Ion Drift) 에 필적하는 수준이다 (약 400 mV/m, Anderson et al., 2001). 추적 지속 시간은 약 5 초로서 (ICEBEAR 가 감지하는 빠른 운동에서 전형적인 값, Ivarsen et al., 2024c, 2025b), 이 규모의 전기장은 현장 관측 (in situ) 으로 측정된 바 있으며 (Marklund, 1997; Marklund et al., 1998; Johansson et al., 2004; LaBelle et al., 2010), 본 연구에서는 이를 통계적 맥락에 위치시키는 주변 분포 (surrounding distribution) 를 함께 제시한다.

4.2 우주기상 모델에서의 효용 (Utility for space weather models)

4.1 절에서 추적 속도가 전리권 전기장 (ionospheric electric field) 을 추적함을 확립한 바탕 위에, 이 절에서는 전기장 변동성 (electric field variability)(그 자체로 시공간 구간의 통계적 속성) 을 명시적으로 다룬다. 이 양은 지구권 (geospace) 의 줄 가열 수지 (Joule heating budget) 에 영향을 미친다.

4 년간 레이더 아카이브를 집계하면 (그림 9b), 윈도우별 공분산 (per-window covariance)(그림 3f) 및 6e) 에 예시) 은 지자기 활동도를 추적한다. 가중 멱함수 적합 (weighted power-law fit, $f(x) = ax^b$, 계수 a, b) 은 다음을 산출한다.

$$\sigma_{\text{trace}}^2 = 3.68 \times 10^5 \left(\frac{\text{SME}}{100 \text{ nT}} \right)^{0.353} [\text{m}^2 \text{s}^{-2}], \quad (4)$$

이는 $\text{SME} = 100 \text{ nT}$ 에서 $E_\sigma = |B| \sqrt{\sigma_{\text{trace}}}$ 의 격자 이하 전기장 분산 진폭이 30 mV/m , $\text{SME} = 4000 \text{ nT}$ 에서 60 mV/m 로 상승함을 나타내며, 지자기장의 전형적인 값을 사용하였다 (Alken et al., 2021). E_σ 는 격자 이하 항 $\text{TrCov}(E)$ 에 대한 폐합 (closure) 을 제공하여, $Q = \Sigma_P |E|^2$ 형태의 정확한 가열 계산을 가능하게 한다. 그 진폭은 평균장 (mean-field) 기여와 동일한 차수 (order) 이며 (Codrescu et al., 2000), 이는 반구 가열의 1.5 배 향상과 일치한다 (Matsuo and Richmond, 2008; Matsuo et al., 2021). 지수 (exponent) 가 완만하다는 사실 자체도 정보를 담고 있다. 활성 윈도우 내에서 조건부 분산 (conditional dispersion) 은 SME 에 따라 약하게만 증가하므로, 적분 가열의 더 가파른 활동도 의존성은 초임계 전기류 난류 (supra-threshold electrojet turbulence) 의 충전 (filling), 즉 발생 빈도 (packing number) 에 기인한다 (Ivarsen et al., 2025a).

$\Sigma_P \approx 5 \sim 30 \text{ S}$ 일 때, 클러스터 3624 의 560 mV/m 전기장은 $Q = \Sigma_P |E|^2 \approx 1.5 \sim 10 \text{ W/m}^2$ 를 산출하며, 이는 대형 자기폭풍 (major storms) 에 대한 점 측정 (point measurements) 의 상한에 해당하는 값이다 (Codrescu et al., 1995; Deng and Ridley, 2007; Knipp et al., 2004). 이 소산은 대류 구동 모델 (convection-driven model) 이 과소 추정하는 폭풍 시기 에너지 수지 (storm-time budget) 를 공급할 수 있다 (Rosenqvist et al., 2006). 추적자 (tracer) 로 사용된 팔리-부네만 난류 (Farley-Buneman turbulence) 자체도 가열 주체로서 이상 전자 가열 (anomalous electron heating) 을 유발하며, 페더슨 전도도 (Pedersen conductance) 를 높일 가능성이 있다 (Dimant and Oppenheim, 2011; Oppenheim and Dimant, 2013; St-Maurice and Goodwin, 2021). 이 난류는 사건 (event) 자체보다 짧은 시간 규모에서 발달하고 포화되므로, 부과된 전기장 에너지의 일부는 벌크 페더슨 (줄) 소산이 확립되기 전에 전자 열에너지 (electron thermal energy) 로, 나아가 자기장 정렬 전기장 (field-aligned electric field) 으로 전환될 가능성이 있다 (Schlegel and St-Maurice, 1981). 따라서 $Q = \Sigma_P |E|^2$ 추정값은 폐합된 에너지 수지가 아닌 에너지 침적률 (energy deposition rate) 의 크기 수준 추정치로 읽는 것이 가장 적절하며, 각 채널 간의 배분은 별도 연구에 맡긴다. 추적된 구조들은 편극 특징 (polarization features) 이 아닌 강수 (precipitation) 에 의해 외부 구동되므로 (Ivarsen et al., 2024b,a,c, 2025a,b), 측정된 분산은 양 (positive) 의 부호로 에너지 수지에 기여한다 (Cosgrove et al., 2011).

사사 (Acknowledgements)

이 연구는 부분적으로 유럽우주국 (European Space Agency) 의 리빙플래닛 보조금 (Living Planet Grant) No. 1000012348 의 지원을 받았다. 캐나다우주국 (Canadian Space Agency, CSA) [20SUGOICEB], 캐나다혁신재단 (Canada Foundation for Innovation, CFI) John R. Evans Leaders Fund [32117], 자연과학공학연구위원회 (Natural Science and Engineering Research Council, NSERC), 발견보조금 프로그램 (Discovery grants program) [RGPIN-2019-19135], 디지털연구연합 캐나다 (Digital Research Alliance of Canada) [RRG-4802] 의 지원에 감사한다. MFI 및 GCH 는 P. Erickson 과 Frank Lind 의 활발한 토론에 감사를 표한다. Anthropic 의 Claude Opus 4.7 과 Google Scholar Labs 가 연구 보조에 활용되었으며, Anthropic 의 Claude Opus 4.7 은 MATLAB 코딩 보조에 활용되었다.

데이터 가용성 (Data availability)

ICEBEAR 3D 에코 데이터는 <http://icebear.usask.ca/icebeardata.php?page=1> 에서 이용 가능하다 (Huyghebaert et al., 2019; Lozinsky et al., 2022). SuperMAG 데이터는 <http://supermag.jhuapl.edu/mag/> 에서, NASA 의 OMNI 서비스를 통한 태양풍 데이터는 <https://omniweb.gsfc.nasa.gov/> 에서 접근할 수 있다. SuperDARN 데이터는 RST 와 FITACF 3 알고리즘 (차수/차수 6, 참조: Thomas and Shepherd, 2018 경험 모델) 으로 처리되었으며, Globus(<https://github.com/SuperDARNCanada/globus>) 를 통해 다운로드할 수 있다. METOP 데이터는 NOAA(<https://www.ngdc.noaa.gov/stp/satellite/poes/>) 에서, DMSP 의 SSJ 및 SSIES 기기 데이터는 Madrigal(<http://cedar.openmadrigal.org/>) 을 통해 접근할 수 있다.

용어 대조표 (Glossary)

영어 (English)	한국어 (Korean)
Farley-Buneman instability	팔리-부네만 불안정성
E-region irregularity	E-영역 불규칙 구조
α -shape (alpha-shape)	알파-형상 (α -형태)
point-cloud footprint	점군 발자국
Intersection over Union (IoU)	교집합 대 합집합 비
centroid	중심 (질량 중심)
gating radius	게이팅 반경
cost matrix	비용행렬
linear assignment problem	선형배정문제
Hungarian/Munkres algorithm	헝가리안/몽크레스 알고리즘
associator	연관기
multi-target tracking	다중 목표물 추적
extended-target tracking	확장표적추적
swirl / cluster / clutter	소용돌이 / 클러스터 / 클러터
lineage	계통
piecewise-linear approximation	구간별 선형근사
segmented velocity	분할 속도
geomagnetic displacement	지자기 변위
conjunction	동시관측
ion drift	이온 드리프트
particle precipitation	입자강하
weighted median	가중 중앙값
poleward / equatorward edge	극측 / 적도측 가장자리
magnetic local time (MLT)	자기지방시
cusps	첨점
closed field-lines	폐쇄 자기력선
open-closed boundary	개방-폐쇄 경계

영어 (English)	한국어 (Korean)
auroral electrojet (index, SME)	오로라 전기제트 (류)(지수)
superstorm	슈퍼폭풍 (초강력 자기폭풍)
geomagnetic activity	지자기 활동도
proxy measurement	프록시 (대리) 측정
ionospheric electric field	전리권 전기장
energy deposition rate	에너지 침적률
Joule heating / dissipation	줄 가열 / 줄 소산
Pedersen conductance	페더슨 전도도
anomalous electron heating	이상 전자 가열
field-aligned electric field	자기장 정렬 전기장
sub-grid / sub-cadence	격자 이하 / 주기 이하
cross-polar-cap potential	극관 전위
space weather model	우주기상 모델
SAID (Sub-Auroral Ion Drift)	아오로라 이하 이온 표류
STEVE	STEVE(강한 열복사 속도증가)
convection electric field	대류 전기장
frozen-in (to magnetic field)	(자기장에) 동결
tracer	추적자

참고문헌 (References)

원문 그대로 보존 (번역하지 않음). 본 번역 작업에서는 사용자 요청에 따라 참고문헌 중요도 분석을 생략하였다.

1. Alken, P., Thébault, E., Beggan, C. D., Amit, H., Aubert, J., Baerenzung, J., Bondar, T. N., Brown, W. J., Califf, S., Chambodut, A., Chulliat, A., Cox, G. A., Finlay, C. C., Fournier, A., Gillet, N., Grayver, A., Hammer, M. D., Holschneider, M., Huder, L., Hulot, G., Jager, T., Kloss, C., Korte, M., Kuang, W., Kuvshinov, A., Langlais, B., Léger, J.-M., Lesur, V., Livermore, P. W., Lowes, F. J., Macmillan, S., Magnes, W., Manda, M., Marsal, S., Matzka, J., Metman, M. C., Minami, T., Morschhauser, A., Mound, J. E., Nair, M., Nakano, S., Olsen, N., Pavón-Carrasco, F. J., Petrov, V. G., Ropp, G., Rother, M., Sabaka, T. J., Sanchez, S., Saturnino, D., Schnepf, N. R., Shen, X., Stolle, C., Tangborn, A., Tøffner-Clausen, L., Toh, H., Torta, J. M., Varner, J., Vervelidou, F., Vigneron, P., Wardinski, I., Wicht, J., Woods, A., Yang, Y., Zeren, Z., and Zhou, B. (2021). International Geomagnetic Reference Field: The thirteenth generation. *Earth, Planets and Space*, 73(1):49.
2. Anderson, P. C., Carpenter, D. L., Tsuruda, K., Mukai, T., and Rich, F. J. (2001). Multisatellite observations of rapid subauroral ion drifts (SAID). *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 106(A12):29585–29599.
3. Bahcivan, H., Hysell, D. L., Lummerzheim, D., Larsen, M. F., and Pfaff, R. F. (2006). Observations of colocated optical and radar aurora. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 111(A12):A12307.

Physics, 111(A12).

4. Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., and Upcroft, B. (2016). Simple online and realtime tracking. In 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pages 3464–3468. Ieee.
5. Buneman, O. (1963). Excitation of Field Aligned Sound Waves by Electron Streams. *Physical Review Letters*, 10(7):285–287.
6. Codrescu, M. V., Fuller-Rowell, T. J., and Foster, J. C. (1995). On the importance of E-field variability for Joule heating in the high-latitude thermosphere. *Geophysical Research Letters*, 22(17):2393–2396.
7. Codrescu, M. V., Fuller-Rowell, T. J., Foster, J. C., Holt, J. M., and Cariglia, S. J. (2000). Electric field variability associated with the Millstone Hill electric field model. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 105(A3):5265–5273.
8. Cosgrove, R., McCready, M., Tsunoda, R., and Stromme, A. (2011). The bias on the Joule heating estimate: Small-scale variability versus resolved-scale model uncertainty and the correlation of electric field and conductance. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 116(A9).
9. Cousins, E. D. P. and Shepherd, S. G. (2012). Statistical characteristics of small-scale spatial and temporal electric field variability in the high-latitude ionosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 117(A3).
10. Deng, Y. and Ridley, A. J. (2007). Possible reasons for underestimating Joule heating in global models: E field variability, spatial resolution, and vertical velocity. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 112(A9).
11. Dimant, Y. S. and Oppenheim, M. M. (2011). Magnetosphere-ionosphere coupling through E region turbulence: 2. Anomalous conductivities and frictional heating. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 116(A9).
12. Edelsbrunner, H. and Mücke, E. P. (1994). Three-dimensional alpha shapes. *ACM Trans. Graph.*, 13(1):43–72.
13. Farley, D. T. (1963). A plasma instability resulting in field-aligned irregularities in the ionosphere. *Journal of Geophysical Research (1896-1977)*, 68(22):6083–6097.
14. Friis-Christensen, E., Lühr, H., and Hulot, G. (2006). Swarm: A constellation to study the Earth’s magnetic field. *Earth, Planets and Space*, 58:BF03351933.
15. Gillies, D. M., Liang, J., Donovan, E., and Spanswick, E. (2020). The Apparent Motion of STEVE and the Picket Fence Phenomena. *Geophysical Research Letters*, 47(20):e2020GL088980.
16. Granstrom, K., Baum, M., and Reuter, S. (2017). Extended Object Tracking: Introduction, Overview and Applications.
17. Huyghebaert, D., Hussey, G., Vierinen, J., McWilliams, K., and St-Maurice, J.-P. (2019). ICEBEAR: An all-digital bistatic coded continuous-wave radar for studies of the E region of the ionosphere. *Radio Science*, 54(4):349–364.

18. Huyghebaert, D., St.-Maurice, J.-P., McWilliams, K., Hussey, G., Howarth, A. D., Rutledge, P., and Erion, S. (2021). The Properties of ICEBEAR E-Region Coherent Radar Echoes in the Presence of Near Infrared Auroral Emissions, as Measured by the Swarm-E Fast Auroral Imager. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 126(12):e2021JA029857.
19. Ivarsen, M. F., Huyghebaert, D. R., Gillies, M. D., St-Maurice, J.-P., Themens, D. R., Oppenheim, M., Gustavsson, B. J., Billett, D., Pitzel, B., Galeschuk, D., Donovan, E., and Hussey, G. C. (2024a). Turbulence Around Auroral Arcs. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 129(8):e2023JA032309.
20. Ivarsen, M. F., Miyashita, Y., St-Maurice, J.-P., Hussey, G. C., Pitzel, B., Galeschuk, D., Marei, S., Horne, R. B., Kasahara, Y., Matsuda, S., Kasahara, S., Keika, K., Miyoshi, Y., Yamamoto, K., Shinbori, A., Huyghebaert, D. R., Matsuoka, A., Yokota, S., and Tsuchiya, F. (2025a). Characteristic E-Region Plasma Signature of Magnetospheric Wave-Particle Interactions. *Physical Review Letters*, 134(14):145201.
21. Ivarsen, M. F., St-Maurice, J.-P., Hussey, G. C., Billet, D., Huyghebaert, D. R., Jin, Y., Miyashita, Y., Kasahara, S., Song, K., Jayachandran, P. T., Yokota, S., Miyoshi, Y., Yamamoto, K., Shinbori, A., Kasahara, Y., Shinohara, I., and Matsuoka, A. (2025b). Eastward transients in the dayside ionosphere. I. Electrodynamics on closed field lines. *Physical Review E*, 112(4):045204.
22. Ivarsen, M. F., St-Maurice, J.-P., Hussey, G. C., Huyghebaert, D. R., and Gillies, M. D. (2024b). Point-cloud clustering and tracking algorithm for radar interferometry. *Physical Review E*, 110(4):045207.
23. Ivarsen, M. F., St-Maurice, J.-P., Hussey, G. C., McWilliams, K., Jin, Y., Huyghebaert, D. R., Miyashita, Y., and Sibeck, D. (2025c). Eastward transients in the dayside ionosphere. II. A parallel-plate capacitorlike effect. *Physical Review E*, 112(4):045203.
24. Ivarsen, M. F., St-Maurice, J.-P., Huyghebaert, D. R., Gillies, M. D., Lind, F., Pitzel, B., and Hussey, G. C. (2024c). Deriving the Ionospheric Electric Field From the Bulk Motion of Radar Aurora in the E-Region. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 129(11):e2024JA033060.
25. Johansson, T., Figueiredo, S., Karlsson, T., Marklund, G., Fazakerley, A., Buchert, S., Lindqvist, P.-A., and Nilsson, H. (2004). Intense high-altitude auroral electric fields - temporal and spatial characteristics. *Annales Geophysicae*, 22(7):2485–2495.
26. Keogh, E., Chu, S., Hart, D., and Pazzani, M. (2001). An online algorithm for segmenting time series. In *Proceedings 2001 IEEE International Conference on Data Mining*, pages 289–296. IEEE.
27. Knipp, D. J., Tobiska, W. K., and Emery, B. A. (2004). Direct and Indirect Thermospheric Heating Sources for Solar Cycles 21–23. *Solar Physics*, 224(1):495–505.
28. Knudsen, D. J., Burchill, J. K., Buchert, S. C., Eriksson, A. I., Gill, R., Wahlund, J.-E., Åhlen, L., Smith, M., and Moffat, B. (2017). Thermal ion imagers and Langmuir probes in the Swarm electric field instruments. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 122(2):2016JA022571.
29. Kuhn, H. W. (1955). The Hungarian method for the assignment problem. *Naval Research*

Logistics Quarterly, 2(1-2):83–97.

30. LaBelle, J., Cairns, I. H., and Kletzing, C. A. (2010). Electric field statistics and modulation characteristics of bursty Langmuir waves observed in the cusp. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 115(A10).
31. Lozinsky, A., Hussey, G., McWilliams, K., Huyghebaert, D., and Galeschuk, D. (2022). ICEBEAR-3D: A Low Elevation Imaging Radar Using a Non-Uniform Coplanar Receiver Array for E Region Observations. *Radio Science*, 57(3):e2021RS007358.
32. Madhanakumar, M., Spicher, A., Huyghebaert, D. R., Kashcheyev, A., Spogli, L., Oksavik, K., Ivarsen, M. F., Vierinen, J., and Hussey, G. C. (2025). Co-Ordinated Observations of Multi-Scale Irregularities Using ICEBEAR and GNSS During the May 2024 Superstorm. *Space Weather*, 23(8):e2025SW004411.
33. Marklund, G. T. (1997). Auroral phenomena related to intense electric fields observed by the Freja satellite. *Plasma Physics and Controlled Fusion*, 39(5A):A195.
34. Marklund, G. T., Karlsson, T., Blomberg, L. G., Lindqvist, P.-A., Fälthammar, C.-G., Johnson, M. L., Murphree, J. S., Andersson, L., Eliasson, L., Opgenoorth, H. J., and Zanetti, L. J. (1998). Observations of the electric field fine structure associated with the westward traveling surge and large-scale auroral spirals. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 103(A3):4125–4144.
35. Matsuo, T., Fan, M., Shi, X., Miller, C., Ruohoniemi, J. M., Paul, D., and Lee, T. C. M. (2021). Multiresolution Modeling of High-Latitude Ionospheric Electric Field Variability and Impact on Joule Heating Using SuperDARN Data. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 126(9):e2021JA029196.
36. Matsuo, T. and Richmond, A. D. (2008). Effects of high-latitude ionospheric electric field variability on global thermospheric Joule heating and mechanical energy transfer rate. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 113(A7).
37. Mishin, E. V. and Streltsov, A. V. (2023). The Inner Structure of STEVE-Linked SAID. *Geophysical Research Letters*, 50(8):e2023GL102956.
38. Newell, P. T. and Gjerloev, J. W. (2011). Evaluation of SuperMAG auroral electrojet indices as indicators of substorms and auroral power. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 116(A12).
39. Ni, B., Bortnik, J., Nishimura, Y., Thorne, R. M., Li, W., Angelopoulos, V., Ebihara, Y., and Weatherwax, A. T. (2014). Chorus wave scattering responsible for the Earth's dayside diffuse auroral precipitation: A detailed case study. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 119(2):897–908.
40. Oppenheim, M. M. and Dimant, Y. S. (2013). Kinetic simulations of 3-D Farley-Buneman turbulence and anomalous electron heating. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 118(3):1306–1318.
41. Rosenqvist, L., Buchert, S., Opgenoorth, H., Vaivads, A., and Lu, G. (2006). Magnetospheric energy budget during huge geomagnetic activity using Cluster and ground-based data. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 111(A10).

42. Schlegel, K. and St.-Maurice, J. P. (1981). Anomalous heating of the polar E region by unstable plasma waves 1. Observations. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 86(A3):1447–1452.
43. Spasojevic, M. and Inan, U. S. (2010). Drivers of chorus in the outer dayside magnetosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 115(A4).
44. St.-Maurice, J.-P. and Goodwin, L. (2021). Revisiting the Behavior of the E-Region Electron Temperature During Strong Electric Field Events at High Latitudes. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 126(2):2020JA028288.
45. St.-Maurice, J.-P. and Hamza, A. M. (2001). A new nonlinear approach to the theory of E region irregularities. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 106(A2):1751–1759.
46. Themens, D. R., Elvidge, S., McCaffrey, A., Jayachandran, P. T., Coster, A., Varney, R. H., Galkin, I., Goodwin, L. V., Watson, C., Maguire, S., Kavanagh, A. J., Zhang, S.-R., Goncharenko, L., Bhatt, A., Dorrian, G., Groves, K., Wood, A. G., and Reid, B. (2024). The High Latitude Ionospheric Response to the Major May 2024 Geomagnetic Storm: A Synoptic View. *Geophysical Research Letters*, 51(19):e2024GL111677.
47. Thomas, E. G. and Shepherd, S. G. (2018). Statistical Patterns of Ionospheric Convection Derived From Mid-latitude, High-Latitude, and Polar SuperDARN HF Radar Observations. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 123(4):3196–3216.
48. Wiltberger, M., Merkin, V., Zhang, B., Toffoletto, F., Oppenheim, M., Wang, W., Lyon, J. G., Liu, J., Dimant, Y., Sitnov, M. I., and Stephens, G. K. (2017). Effects of electrojet turbulence on a magnetosphere-ionosphere simulation of a geomagnetic storm. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 122(5):5008–5027.
49. Wojke, N., Bewley, A., and Paulus, D. (2017). Simple online and realtime tracking with a deep association metric. In 2017 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), pages 3645–3649. IEEE.