

플룸 기저의 극자외선 미세플래시: 코로나와 태양풍을 구동하는 후보?

Extreme Ultraviolet Microflashes at Plume Bases: A Candidate for Powering the Corona and Solar Wind?

Navdeep K. Panesar, Sanjiv K. Tiwari, Meng Jin, Ayla Weitz, Ronald L. Moore, V. Aparna, Alphonse

arXiv:2606.17361v1 (astro-ph.SR, 2026)

본 문서는 위 논문의 전문 한국어 번역본입니다. 그림은 원문 *PDF* 에서 추출·삽입하였으며, 각 그림 아래에 한국어 해설을 덧붙였습니다.

Abstract (초록)

태양 플룸 (solar plume) —밝은 코로나 (corona) 플라즈마의 유출류—은 개방 자기장 (open magnetic field) 코로나와 태양풍 (solar wind) 의 주요 구성 요소이지만, 그 구동 메커니즘은 아직 불분명하다. 여기서 우리는 ”망 미세플래시 (network microflashes)” 를 보고한다. 이는 플룸 기저부의 자기망 (magnetic network) 을 포함하는 $174 \text{ \AA}$ 영상에서 Solar Orbiter 의 극자외선 이미저 (Extreme Ultraviolet Imager, EUV) 가 포착한 미세 규모의 밝은 폭발 현상이다. 이 현상들은 명백히 단극성 (unipolar) 자기 플럭스 내에 위치하므로, 이전에는 확인되지 않은 새로운 종류의 망 현상임이 분명하다. 플룸 기저부 내에서 약 20 개의 미세플래시 (microflash) 가 동시에 진행되고 있으며, 매초마다 새로운 미세플래시가 시작된다. 평균 미세플래시 하나의 에너지는 $\sim 10^{24} \text{ erg}$ 로, 나노플레어 (nanoflare) 범위에 해당한다. 3 차원 (3D) 데이터 기반 전지구 MHD 모델은 조사 대상 플룸에서 고속 태양풍을 동반한 개방 자기장을 산출한다. 우리의 연구 결과로부터, 망 미세플래시는 단극성 자기장의 교차된 다리들 사이에서 발생하는 미세 규모의 재결합 (reconnection) 폭발로 인해 생성되며, 이 폭발은 흔히 5 분 주기의 p-모드 (p-mode) 진동에 의해 촉발되고, 개방 자기장 코로나와 태양풍을 가열 · 가속하는 후보 현상임을 제안한다. 즉, 우리가 관측한 것과 같은 단극성 미세플래시는 태양권 (heliosphere) 을 유지하는 단극 자기망 자기 재결합 (magnetic reconnection) 폭발에서 비롯될 가능성이 높다.

키워드

영어 원문	한국어 번역
Solar extreme ultraviolet emission (1493)	태양 극자외선 (extreme ultraviolet, EUV) 방출 (1493)
Solar magnetic reconnection (1504)	태양 자기 재결합 (solar magnetic reconnection) (1504)
Solar corona (1483)	태양 코로나 (solar corona) (1483)
Solar coronal heating (1989)	태양 코로나 가열 (solar coronal heating) (1989)
Solar wind (1534)	태양풍 (solar wind) (1534)
Solar magnetic fields (1503)	태양 자기장 (solar magnetic fields) (1503)

1. Introduction (서론)

태양풍 (solar wind) (E. N. Parker 1958) 은 태양에서 분출되는 하전 입자 (charged particle) 의 흐름이다. 태양풍은 지구의 자기장 (자기권, magnetosphere) 과 상호작용하며, 동적 변화를 일으키고 지구의 대기 및 우주 환경에 영향을 미친다 (M. Neugebauer & C. W. Snyder 1962). 태양풍은 주로 태양 표면의 개방 자기장 (open magnetic field) 영역에서 기원하며 태양권 (heliosphere) 을 팽창시킨다. 속도가 450 에서 1000 km s⁻¹ 에 이르는 고속 태양풍 (fast solar wind) 은 주로 코로나홀 (coronal hole) 이라 불리는 개방 자기장 영역에서 방출된다 (I. G. Richardson 2018, 및 참고 문헌). 반면, 속도가 300–450 km s⁻¹ 인 저속 태양풍 (slow solar wind) 의 상당 부분은 활동 영역 (active region) 인접한 코로나홀의 가장자리에서 기원하는 것으로 논의되어 왔다 (R. D’Amicis & R. Bruno 2015; Y. M. Wang & Y. K. Ko 2019; N. M. Viall & J. E. Borovsky 2020). 어느 경우든 코로나홀은 태양풍의 주요 원천이다.

코로나홀 내부 및 주변에 존재하는 코로나 플룸 (coronal plume) 은 태양풍의 또 다른 주요 원천으로 알려져 있다 (S. W. McIntosh et al. 2010; H. Tian et al. 2011; S. Pucci et al. 2014; L. Zangrilli & S. M. Giordano 2020). 플룸은 주로 극자외선 (EUV, extreme ultraviolet) 방출로 관측되며 (Fe IX/X 방출선에서 가장 뚜렷이 보임), 온디스크 (on-disk) 코로나홀에서 밝고 뿌연 구조로 나타난다 (Y. M. Wang & K. Muglach 2008; Y. M. Wang et al. 2016). 플룸은 강한 단극 (unipolar) 자기망 (magnetic network) 덩어리에서 발원하며 (J. Newkirk & J. Harvey 1968; E. A. Avallone et al. 2018), 그 안에는 보다 작고 약한 반대 극성 (minority-polarity) 자속 패치 (flux patch) 가 함께 존재할 수 있다 (Y. M. Wang 1994; N.-E. Raouafi & G. Stenborg 2014; Y. M. Wang et al. 2016; N. K. Panesar et al. 2018b; E. A. Avallone et al. 2018; Y.-M. Wang 2022). N. E. Raouafi et al. (2023) 은 혼합 극성 (mixed-polarity) 자속 위치에서 발생하는 소규모 자기 재결합 (magnetic reconnection) 구동 분출 (jetlet) 활동이 코로나 가열 (coronal heating) 과 태양풍의 주요 구동 기제라고 제안했다. 유사한 기제가 L. P. Chitta et al. (2023) 에 의해 코로나홀의 HRI_{EUV} 데이터를 이용해 제안된 바 있는데, 이들은 자기 재결합에 의해 구동되는 피코플레어 제트 (picoflare jet) 가 태양풍에 기여한다고 보고했다. 제트렛 (jetlet) 과 피코플레어 제트 모두 혼합 극성 태양 위치에서 기원한다는 증거가 있으며, 이는 더 큰 규모의 코로나 제트 (coronal jet) 와도 마찬가지로이다. 이러한 가능성들이 남아 있는 가운데, 본 연구에서는 코로나 제트형과는 다른, 코로나와 태양풍을 구동하는 새로운 후보를 제시한다.

본 논문에서는 플룸 기저부에서 발생하는 미세 규모의 일시적 밝기 증가 현상을 보고한다. 이 현상은 Solar Orbiter (D. Müller et al. 2020) 의 극자외선 촬영기 (EUI, Extreme Ultraviolet Imager)/고해상도 촬영기 (HRI_{EUV}, P. Rochus et al. 2020) 가 제공하는, 공간 분해능 142 km·시간 분해능 3 s 의 매우 높은 해상도 174 Å 코로나 극자외선 영상으로 포착되었다. 이 밝기 증가 현상은 플룸 기저부의 단극 자속 자기망 덩어리에서 나타난다. 본 논문에서는 이 현상을 ‘망 미세플래시 (network microflashes)’ 라 명명한다 (그림 1). 망 미세플래시는 플룸 기저가 아닌 단극 자기망 자속에서도 관측되지만, 그 수 밀도 (number density) 는 플룸을 포함하는 자기망 자속에서 발견되는 값의 약 10% 에 불과하다. 본 논문은 망 미세플래시가 단극 자기장 다리 (leg) 들이 교차 재결합 (reconnection) 하는 버스트 (burst) 에 의해 생성되며, 이 버스트가 자기망에서 뿜어나오는 개방 자기장을 따라 코로나와 태양풍을 구동할 가능성이 있음을 제안한다.

2. Data, Methods, and an MHD Model (자료, 방법, 그리고 MHD 모델)

2.1 Data (자료)

망 미세플래시 (network microflash) 를 연구하기 위해, 우리는 EUI(Extreme Ultraviolet Imager, 극자외선 영상기) 의 HRIEUV(High Resolution Imager EUV, 고분해능 EUV 영상기) 가 취득한 고공간분해능 (픽셀 (pixel) 폭 0.492”; P. Rochus et al. 2020). 고시간분해능 (시간 분해능 (cadence) 3~10 초) 영상을 활용한다. 분석에는 두 날짜—2023 년 3 월 29 일과 2023 년 10 월 26 일—에 취득한 데이터 릴리스 6(Data Release 6; E. Kraaikamp et al. 2023) 의 HRIEUV 레벨 2

데이터⁹를 사용한다. Solar Orbiter는 2023년 3월 29일에 0.394 AU 거리에서 태양을 관측했으며, 이때 화소 크기 (plate scale)는 142 km, 시간 분해능은 3 초였다. 2023년 10월 26일에는 0.488 AU 거리에서 관측하여 화소 크기 172 km, 시간 분해능 10 초의 조건이 적용되었다. 각 날 짜별로 2 시간씩 HRIEUV 데이터가 확보되어 있다. HRIEUV는 174 Å 파장대에서 영상을 제공하며, 이 파장대에서 Fe IX 및 Fe X 방출선이 ≤ 1 MK 코로나 플라스마의 주 방출선으로 나타난다. Solar Orbiter와 지구 사이의 분리각은 2023년 3월 29일에 2.5°, 2023년 10월 26일에 28°였다.

분석을 위해 SDO(Solar Dynamics Observatory) 탑재 AIA(Atmospheric Imaging Assembly; J. R. Lemen et al. 2012)의 EUV 영상도 함께 활용한다. AIA는 7개의 EUV 채널에서 0.6" 픽셀·12 초 시간 분해능으로 영상을 취득한다. 플룸(plume)이 가장 잘 보이고 HRIEUV 174 Å 파장대와 가장 근접한 AIA 171 Å 영상을 주로 사용한다. AIA 171 Å는 약 0.65 MK에서 생성되며, Fe IX 선을 중심으로 한다. 망 미세플래시는 AIA 영상에서 거의 보이지 않으므로, AIA 171 Å는 맥락 파악 목적으로만 활용한다(그림 9). 또한, 플룸 기저부 및 미세플래시 기저부 인근의 자기망(network) 자속(magnetic flux)을 확인하기 위해 SDO/HMI(Helioseismic and Magnetic Imager, 시선방향 자기장계; P. H. Scherrer et al. 2012)의 시선방향 자기장 관측 데이터를 사용한다.

⁹ <https://www.sidc.be/EUI/data/L2/>

2.2 Methods (방법)

HRIEUV 망 미세플래시의 가시성을 높이기 위해 언샤프 마스크(unsharp mask) 기법을 적용했다. 이 방법은 먼저 HRIEUV 영상을 10×10 픽셀로 스무딩한 뒤, 스무딩된 영상을 원본(미스무딩) 영상에서 빼는 방식으로 수행된다. 이렇게 생성된 언샤프 마스크 영상은 일부 그림에서 망 미세플래시를 표시하는 데 활용된다.

수동 측정(manual measurement)에서는 각 미세플래시의 속도, 지속 시간, 길이, 폭을 원본 영상으로부터 측정한다. 수동으로 선별한 망 미세플래시의 팽창 속도는 시간-거리 맵(time-distance map)에서 시간-거리 트랙의 기울기로부터 산출한다. 길이는 미세플래시의 더 긴 방향으로 측정하고, 폭은 미세플래시의 단면 폭으로 정의한다. 길이와 폭 모두 미세플래시의 최대 밝기(peak brightness) 시점에서 측정한다. 미세플래시의 수명(lifetime)은 처음 커지기 시작한 시점부터 완전히 소멸하는 시점까지 추적하여 산출한다. 수동으로 선별한 미세플래시의 경우, 수명을 시간-거리 맵에서도 추가로 측정한다.

2.3 Automated detection and measurement of microflashes (미세플래시 자동 검출 및 측정)

우리는 가우시안 차분법(Difference of Gaussian, DoG) 방식을 이용해 미세플래시를 검출하는 자동화 방법을 구현했다. 이 방법에서는 먼저 서로 다른 표준편차 폭을 가진 두 가우시안 필터로 영상을 흐리게 처리한다. 두 흐린 영상을 빼면 두 가우시안 필터 폭 사이의 크기를 가진 구조가 강조된다. 이 방법은 미세플래시가 어두운 배경 위의 밝은 구조라고 가정하므로, 검출 루틴을 적용하기 전에 조용한(quiet) 영역의 평균값을 빼는 전처리를 수행한다. 검출 루틴을 적용하기 전에, 원본 EUI 영상에 2×2 픽셀 언샤프 마스크링도 추가로 적용하고, 탐색 범위를 그림 3a에 표시된 흰색 점선 박스 내로 한정한다.

검출 임계값으로는, 미세플래시의 강도가 조용한 영역 평균값에 조용한 영역 평균값의 표준편차(standard deviation) 3 배를 더한 값($\mu + 3\sigma$)을 초과해야 한다는 조건을 적용한다. 여기서 조용한 영역은 뚜렷한 일시적 증광(transient brightening)이 없는 어두운 영역으로 설정한다. 한 영상에서 미세플래시가 검출되면, 이후 영상에서도 지속되는지 확인한다. 다음 영상에서 검출된 미세플래시가 이전 영상의 미세플래시의 연속으로 인정되려면, 이전 미세플래시 중심으로부터 2 픽셀 이내에 위치해야 한다. 즉, 허용 가능한 최대 시선 수직 방향(plane-of-sky) 이동 속도는 $\approx 95 \text{ km s}^{-1}$ ($= 2 \times 142 \text{ km}/3 \text{ s}$)이다. 이 조건을 충족하는 검출 미세플래시가 둘 이상이면, 이전 영상의 미세플래시와 거리가 가장 가까운 것을 선택한다. 이 과정은 더 이상 짝을 이룰 수 없을 때까지 반복된다.

이 루틴으로 2 시간 동안 약 6,000 개의 미세플래시를 검출했다. 단 한 장의 영상에서만 나타나는 미세플래시는 계산에 포함하지 않는다.

수동 검출 및 측정 결과와 비교한 결과, 3σ 검출 임계값은 미세플래시의 수는 올바르게 식별하지만 수명을 과소평가하는 경향이 있다. 이를 보완하기 위해, 3σ 기준으로 묶인 미세플래시 주변에서 2σ 임계값으로 추가 탐색을 수행한다. 이 2σ 이상 검출 방식은 3σ 이상 검출 방식과 동일한 방법을 따르되, 미세플래시의 시작 및 종료 위치를 중심으로 하는 2 픽셀 반경 내로 탐색을 제한한다. 더 이상 일치 검출이 없을 때까지 이 낮은 임계값으로 주변 탐색을 계속한다.

미세플래시의 크기를 측정하기 위해, 최대 밝기 시점의 미세플래시에 2D 가우시안 피팅 (2D Gaussian fitting) 을 수행한다. 미세플래시를 중심으로 20×20 픽셀 박스를 설정하고, 각 관측 시점의 해당 시야 (FOV) 중앙값으로 나누어 데이터를 정규화한다. 수동 크기 측정 결과, 이 구조들이 길이 · 폭 방향으로 수 픽셀 수준으로 작다는 것을 알고 있으며, 이 정보가 가우시안 피팅에 사용하는 표준편차 범위를 결정하는 데 활용된다. 이 2D 가우시안 피팅은 전체 미세플래시 샘플 (특히 매우 작거나 밝은 배경 위에 있는 것들) 에 대해 완벽하게 작동하지는 않지만, 통계적 근사로서 검출된 미세플래시의 전반적인 크기 및 형태를 유용하게 나타낼 수 있다.

각 미세플래시의 속도는 2×2 언샤프 마스킹 처리된 영상에서 산출한다. 속도는 원본 영상에서 최초 검출 시점과 최대 밝기 시점 사이의 미세플래시 무게중심 변위로부터 추정하며, 각 측정값은 2×2 언샤프 마스킹 처리된 영상을 기반으로 산출한다. 또한 이 기법을 인근 비 (非) 플룸 기저 자기망 영역에도 적용하여 미세플래시를 검출한 결과, 해당 영역의 미세플래시 수 밀도가 플룸 기저 자기망 자속 덩어리에서의 수 밀도의 약 10% 에 불과한 것으로 나타났다.

2.4 Data-driven Global 3D MHD Model (자료기반 전역 3D MHD 모델)

태양 대기 내부에서 더 나아가 태양권 (heliosphere) 전반에 걸친 자기장을 계산하기 위해, 우리는 AWSoM (Alfvén Wave Solar atmosphere Model, 알펜파 태양 대기 모델) 을 사용한다. AWSoM 은 SWMF (Space Weather Modeling Framework, 우주 날씨 모델링 프레임워크; G. Tóth et al. 2012) 내의 자료기반 전역 자기유체역학 (magnetohydrodynamics, MHD) 모델이다. 특히 AWSoM 은 HMI/SDO 와 같은 기기로부터 획득한 공동 회전 (synoptic) 또는 동기 (synchronic) 광구 (photosphere) 자기장도를 자기장의 하부 경계 조건으로 사용함으로써, 실제 태양 관측 자료로 대규모 코로나 및 태양권 구조를 제약한다.

우리는 AWSoM 코드를 주로 자기장을 태양권 바깥까지 모델링하는 데 활용할 것이다. 단순 포텐셜 장 소스면 (Potential Field Source Surface, PFSS) 자기장 외삽과 비교했을 때, AWSoM 모델의 동역학 · 열역학 입력에서 발생하는 추가 압력이 PFSS 만으로는 표현하기 어려운 플라스마 베타 (plasma beta) 가 높은 태양권 영역에서의 자기장을 더 잘 재현할 수 있다는 장점이 있다 (G. A. Gary 2001). 미세플래시를 AWSoM 코드에 물리적 입력으로 포함시켜 그 결과를 시뮬레이션하는 것은 본 연구의 범위를 벗어나므로 시도하지 않는다. 다만 완결성을 위해, 아래에서 AWSoM 코드의 세부 사항을 설명한다.

시뮬레이션 영역은 상부 채층 (upper chromosphere) 에서부터 화성 궤도 너머 코로나 및 태양권 까지 이어진다 (B. van der Holst et al. 2014). 내부 경계에서 전자 및 양성자 온도 T_e, T_i 와 수 밀도 n 의 초기 조건은 각각 $T_e = T_i = 50,000$ K, $n = 2 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$ 으로 설정된다. 이 내부 경계 밀도 조건은 채층 증발 (chromospheric evaporation) 이 자기 일관적 (self-consistently) 으로 코로나를 적절히 높은 밀도로 채울 수 있게 한다. 내부 경계의 초기 밀도 및 온도를 적당히 변경하더라도 전역 해에 큰 영향을 미치지 않는다 (R. Lionello et al. 2009). 내부 경계 자기장은 태양 전면 자기장 지도 (full-surface magnetic map) 로 지정된다. 이 연구에서는 록히드 마틴 (Lockheed Martin) 표면 자속 수송 모델 (surface flux transport model; C. J. Schrijver & M. L. De Rosa 2003) 에 기반한 동기 자기장 지도를 사용했다. 태양풍 플라스마의 초기 조건은 파커 해 (Parker solution; E. N. Parker 1958) 로 지정하며, 초기 자기장은 FDIPS (Finite Difference Iterative Potential Solver; G. Tóth et al. 2011) 를 이용한 PFSS 모델 자기장을 사용한다. 정상 상태 (steady state) 태양풍 해는 국소 시간 진행 (local time stepping) 및 2 차 충격파 포착 (second-order shock-capturing) 기법으로 산출된다 (G. Tóth et al. 2012).

알펜파 (Alfvén wave) 는 표면 자기장에 비례하는 포인팅 플럭스 (Poynting flux) 로 내부 경계에

서 구동된다. 태양풍은 알펜파 소산 (dissipation) 에 의해 가열되고, 열압력 및 알펜파 압력에 의해 가속된다. AWSoM 은 파동 스펙트럼을 분해하지 않는 현상론적 (phenomenological) 알펜파 소산 처리 방식을 사용한다. 대신, 역방향으로 전파하는 파동의 총 에너지 밀도를 계산한다. 전자 열전도 (충돌형 및 무충돌형 모두 포함) 와 복사 냉각 (radiative cooling) 도 모델에 포함되어 있다. 또한 전자와 양성자 온도를 별도로 처리하며, 두 성분은 충돌 (collision) 을 통해 결합된다. 파동 반사, 소산, 그리고 전자와 양성자 간 열 분배를 물리적으로 일관성 있게 처리함으로써, AWSoM 은 신뢰할 수 있는 현실적인 전역 코로나 조건을 재현한다 (예: I. V. Sokolov et al. 2013; M. Jin et al. 2013, 2017; N. Sachdeva et al. 2019).

3. Results (결과)

3.1 플룸 기저에 집중된 망 미세플래시 (Network Microflashes Concentrated at the Base of Plumes)

그림 1a 는 2023 년 3 월 29 일 데이터셋에서 가져온 것으로, 플룸 덤불 (plume bush) 의 HRIEUV 영상을 보여준다. 이 영상에는 기저부에서 다수의 미세 규모 밝기 증가 현상, 즉 망 미세플래시 (network microflash) 가 나타난다. 미세플래시는 언샤프 마스크 (unsharp mask) 처리 영상 (그림 1b, h-1 및 Movie1) 에서 더욱 뚜렷하게 보인다. 더 큰 망 미세플래시 중 일부는 저해상도의 태양 역학 관측소 (Solar Dynamics Observatory, SDO) AIA 171 Å 영상에서 간신히 인식할 수 있다. 부록 (그림 6) 에는 HRIEUV 영상과 유사한 시각에 촬영한 동일 플룸의 AIA 171 Å 영상을 함께 제시하였다. AIA 171 Å 영상에서는 HRIEUV 174 Å 영상에서 보이는 미세플래시의 세부 구조가 뭉개진다. SDO/HMI 자기장 관측 (magnetogram) 은 이 플룸들이 주로 단극 (unipolar) 음 (陰) 극성 (negative polarity) 의 자기 자속 (magnetic flux) 덩어리에 뿌리를 두고 있음을 보여준다 (그림 6d). 임의의 시각에 플룸 기저부에서 발생하는 전형적인 미세플래시는 그림 1f,k(위쪽 두 원 참조) 에서 확인할 수 있다. 일부 미세플래시는 플룸 기저부에서 벗어난 위치에서도 나타난다 (그림 f,k 패널의 아래쪽 원). 중요한 점은, 모든 미세플래시가 자기망 (magnetic network) 자속에 뿌리를 두고 있다는 것이다. 대부분은 망 자속 집중부의 중심에서 발생하며, 약 10% 만이 명확한 플룸 구조가 없는 상대적으로 약한 망 자속 덩어리에 뿌리를 두고 있다. 일부 미세플래시는 개방 자기장을 따라 약간 늘어난 형태를 보이는데, 명확한 예시 하나가 녹색 화살표로 표시되어 있다. 다른 미세플래시들은 거의 원형으로 나타나기도 한다 (예: 그림 1f 의 위쪽 적색 원 안의 미세플래시). 이는 실제로 원형이기 때문이거나, 연장 부분이 매우 어둡기 때문이거나, 또는 시선 방향으로 늘어나 있기 때문일 수 있다. 미세플래시는 같은 위치에서 반복적으로 발생하는 경우가 많다. 우리의 분석에 따르면, 같은 위치에서 반복 발생하는 미세플래시는 일정한 주기를 보이지 않고 불규칙한 간격으로 나타난다. 어떤 경우에는 같은 위치에서 다양한 시간 간격을 두고 반복 현상이 관측되기도 하는데, 예컨대 수 분 (~ 2 분) 에서 약 10 분 정도의 간격으로 나타난다.

그림 2a 는 두 시간 동안 그림 1a 의 슬릿 내부에서 나타난 다수의 밝은 미세플래시를 보여준다. 이 미세플래시의 주기성을 확인하기 위해, 그림 2a 의 흰 점선을 따라 강도를 도시했다. 그림 2b 의 도표에는 대략 5-15 분 간격으로 발생하는 뚜렷한 강도 급등 (또는 미세플래시) 이 나타난다. 나아가 그림 2b 의 강도 도표에 대한 파워 스펙트럼 (power spectrum) 을 계산하여 그림 2c 에 제시하였다. 파워 스펙트럼은 5 분, 10 분, 15 분 근방에서 피크를 보인다. 이는 ~ 5 분, 10 분, 15 분에서 높은 파워를 나타내는 우리의 웨이블릿 (wavelet) 분석 (부록, 그림 8) 과 일치한다. 플룸 기저부의 다른 위치에서의 강도-시간 도표도 미세플래시가 대략 5-15 분 간격으로 나타남을 보여준다. 이러한 결과는 미세플래시가 종종 광구 (photosphere) 의 5 분 p-모드 진동 (p-mode oscillation) 에 의해 촉발됨을 시사한다 (N. A. Inogamov 1996). 이러한 진동은 이미 소규모 폭발 현상을 촉발하는 역할을 한다고 강하게 의심받고 있다 (예: Z. Ning et al. 2004; J. G. Doyle et al. 2006; G. R. Gupta & D. Tripathi 2015; A. C. Sterling et al. 2020; P. Kumar et al. 2022). 따라서 미세플래시에서 5 분 주기성이 검출된 것은 이러한 선행 연구들과 부합한다.

나아가, 우리는 미세플래시의 준비 시간이 경우에 따라 5 분을 초과할 수도 있다고 추측한다. 따라서 미세플래시는 p-모드 진동이 매 주기마다 발생하는 것이 아니라 격주기적으로 형성되는 경향이 있으며, 이것이 10 분 근방의 파워 스펙트럼 피크를 설명할 수 있다. 마찬가지로, 준비 시간이 10 분을 초과하는 경우도 있기 때문에 15 분 피크도 나타난다.

10–15 분의 유사한 주기성은 Solar Orbiter 의 HRIEUV 데이터틀 이용한 연구에서도 보고된 바 있다 (예: A. Weitz et al. 2025; U. Baweja et al. 2025). 또한 태양 자외선 방출 복사 측정기 (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation, SUMER; K. Wilhelm et al. 1995) 및 AIA 데이터틀 이용한 코로나 루프 (coronal loop) 와 플룸에 관한 여러 연구에서도 이미 보고된 바 있다 (예: D. Banerjee et al. 2011; S. Krishna Prasad et al. 2014; P. Kumar et al. 2022). 이 주기성의 원인은 아직 충분히 이해되지 않았다. 코로나 플룸에서 관측된 10–15 분 주기성은 복수의 과정에서 비롯될 수 있다. 예컨대, 경사진 자기장은 음향 차단 주파수 (acoustic cutoff frequency) 를 낮추어 하부 대기에서 코로나로 장주기 자기음향파 (magnetoacoustic wave) 가 누출되는 것을 가능하게 한다 (N. Bel & B. Leroy 1977; B. De Pontieu et al. 2004, 2005). 또 다른 가능성으로, 이러한 주기성은 플룸 발자국 지점 (footpoint) 에서의 준주기적 재결합 (quasi-periodic reconnection) 으로 부터 비롯될 수도 있다 (I. de Moortel 2009; S. Krishna Prasad et al. 2014). 파동 누출과 재결합 주도 흐름을 구별하는 것은 여전히 어렵지만, 두 메커니즘 모두 관측된 주기에 기여할 수 있다.

3.1.1 더 큰 표본에 대한 자동 검출 방법 적용 (Using the Automated Detection Method for a Larger Sample)

미세플래시의 특성을 측정하기 위해, 그림 3a 의 흰 점선 상자로 표시된 플룸 기저부 시야 (field of view, FOV) 내의 2023 년 3 월 29 일 2 시간 HRIEUV 174 Å 영상 시퀀스에 자동 미세플래시 검출 방법 (2.2 절) 을 적용하였다. 그 상자 안에서 같은 색 원들의 각 군집 또는 연열 (nest or string) 은 검출된 미세플래시를 나타낸다. 색을 달리 표시함으로써 중첩되는 군집 또는 연열을 구별하는 데 도움을 준다. 그림 3a 에서 대부분의 색상 군집/연열의 크기는 전형적인 망 제트릿 (network jetlet) 의 크기보다 훨씬 작다. 이 방법을 적용하여, 해당 영역에서 배경 강도 대비 3σ 이상인 미세플래시를 총 약 6000 개 발견했으며 (2.2 절), 이는 해당 영역에서 매 초마다 새로운 미세플래시가 시작된다는 것을 의미한다. 단일 영상에서만 나타나는 미세플래시는 계수하지 않았다. 계수된 각 미세플래시는 최소 3 초 이상 지속된다.

미세플래시의 평균 속도 (speed) 는 $50 \pm 50 \text{ km s}^{-1}$ 이다. 속도 분포 (그림 3c) 가 낮은 값 쪽으로 치우쳐 있어, 가장 흔한 값은 $0\text{--}25 \text{ km s}^{-1}$ 구간에 분포함을 주목할 필요가 있다. 한편, 이 속도들은 태양면 (disk) 에 대한 투영 측정값이다. 해당 영역이 태양면 중심 근방에 있고 대부분의 운동이 대략 반경 방향이라면, 실제 속도는 그림 3c 에 나타난 것보다 높을 가능성이 있다. 이러한 점을 고려하면, 50 km s^{-1} 은 전형적인 미세플래시 속도에 대한 합리적인 추정값이나, 산포는 크다. 평균 미세플래시 수명 (lifetime) 은 22 ± 20 초로 나타났다 (그림 3b). 속도에서 논의한 것과 마찬가지로, 수명도 정규 분포를 따르지 않으며 대부분의 값이 3–12 초 구간에 집중되어 있다. 평균 미세플래시 길이 (length) 와 폭 (width) 은 각각 $860 \pm 150 \text{ km}$, $770 \pm 200 \text{ km}$ 로 나타났다. 수동으로 선별한 50 개의 미세플래시를 직접 측정하여 (A.1 절) 자동 방법의 결과를 검증하였다. 자동 방법으로 얻은 측정값은 수동으로 측정한 값과 합리적으로 잘 일치한다. 다만, 수동 검출은 50 개의 고립되고 두드러진 사건에 집중된 제한된 표본에 초점을 맞춘 반면, 자동 선별은 선택된 강도 임계값에 민감하게 의존한다는 점에 주의해야 한다. 그 결과, 검출된 미세플래시의 수는 채택된 임계값에 따라 크게 달라질 수 있다.

우리 미세플래시의 평균 수명은 EUV 마이크로제트 (microjet; 5 분; Z. Hou et al. 2021) 와 캠프파이어 (campfire; 10 분; N. K. Panesar et al. 2021) 보다 짧다. 수명은 활성 영역 (active region) 에서 고해상도 코로나 이미저 (High-resolution Coronal Imager, Hi-C) 로 관측된 EUV 밝은 점 (bright dot; ~ 25 초; S. Régnier et al. 2014; S. Subramanian et al. 2018) 및 HRIEUV 밝은 점 (50 초; S. K. Tiwari et al. 2022) 의 수명과 비슷하다. 이 미세플래시 중 상당수는 스피쿨 (spicule) 과 유사한 속도를 보인다 (B. De Pontieu et al. 2007). 또한 관측된 미세플래시의 길이는 EUV 마이크로제트 (7700 km; Z. Hou et al. 2021) 와 캠프파이어 (5400 km; N. K. Panesar et al. 2021) 보다 훨씬 작다.

3.1.2 자기 환경 (Magnetic Setting)

미세플래시가 겉보기에 단극 자기 자속에 뿌리를 두고 있는 것처럼 보이지만, 우리는 미세플래시 발생 위치에서 반대 극성 (소수 극성, minority polarity) 자기 자속의 증거를 HMI 자기장 관측

데이터에서 면밀히 검토하였다. 이를 위해 수동으로 임의 선별한 50 개의 미세플래시 (부록 A.1) 를 사용하였다. 그림 4 에는 50 개의 미세플래시에 대한 자기 자속의 위치와 강도를 나타내었다. 그림 4a 는 플룸 기저부 자속 내에서 50 개의 미세플래시의 첨두 밝기 중심점 (peak-brightness centroid) 위치를 보여준다. 미세플래시들은 플룸 기저부 및 그 주변의 강화된 망 자속 패치 깊숙이 집중되어 있어, 이들이 패치 내 더 강한 자기 자속에서 선호적으로 발생함을 시사한다.

그림 4b 는 50 개의 미세플래시 중심점에서 HMI 자기장 관측의 자속 강도 히스토그램 (histogram) 이다. 히스토그램은 미세플래시의 압도적 다수 (50 개 중 44 개) 가 200 G 이상의 음 (陰) 극성 자속에 위치하고, 명확한 다수 (50 개 중 35 개) 가 300 G 이상의 음 극성 자속에 위치함을 보여준다. 이 결과가 대부분의 플룸 기저부 미세플래시가 단극 (즉, 미분해 극성 반전선에 위치하지 않음) 임을 증명하지는 않지만, 대부분의 미세플래시가 진정으로 단극인 자기 자속에 존재한다는 것을 지지하는 정량적 정황 증거이다. 즉, 미세플래시가 HMI 자기장 관측에서 검출되지 않은 매립 소수 극성 자속으로 인해 다수 극성 자속 강도의 국지적 저하가 나타나는 위치에 뿌리를 두지 않는다는 것을 지지한다.

200 G 를 초과하는 망 자기장 강도가 반대 극성 자속의 존재를 배제하지는 않는다. 이는 Y. M. Wang et al. (2016) 과 Y. M. Wang (2020) 에 의해 논의된 바 있다. 이 연구들 (Y. M. Wang et al. 2016; Y. M. Wang 2020) 은 겉보기에 단극인 망 집중부 내에서도 소규모 반대 극성 자속과 관련 소규모 루프 구조 (EUV 영상에서 관측) 가 존재할 수 있으며, 이것이 플룸 역학에서 중요한 역할을 할 수 있다는 것을 보여준다. 앞서 언급한 바와 같이, 우리의 히스토그램 결과는 플룸 기저부에서 이러한 소규모 반대 극성 자속의 존재 가능성을 배제하지 않는다.

그러나 우리는, 비록 정황 증거이지만, 여기서 논의하는 미세플래시가 검출되지 않은 혼합 극성 자기 영역의 위치에서 기원하지 않는다는 것을 지지하는 두 가지 추가 논거를 제시할 수 있다.

첫째, 제트릿 (jetlet) 을 만드는 것과 같은 집속 분출 (collimated ejection) 은 대개 겉보기에는 단극인 망 자속 덩어리의 가장자리에 뿌리를 두고 코로나까지 뻗어 있는 자기력선의 발자국에서 자속 상쇄 (flux cancellation) 가 일어날 때의 분출로 발생한다 (예: N. K. Panesar et al. 2018b). 그러나 우리의 관측에서는 이러한 집속 분출을 거의 검출하지 못하였다. 오히려 미세플래시는 단극 플라지 (unipolar plage) 위에서 이전에 보고된 집속 유출보다 훨씬 더 어둡고 작다. 또한 제트릿의 기둥 (spire) 은 밝은 기저부 (base) 에 뿌리를 두고 있는 반면, 우리의 미세플래시에는 그러한 밝은 기저부가 없다. 이는 미세플래시의 기원이 제트릿과 다르며, 따라서 검출 불가능한 규모에서의 자속 상쇄로 발생하는 것이 아님을 시사한다.

두 번째 논거는, 겉보기에는 단극인 자기장 관측에서 숨겨진 다극 자기장의 가장 강력한 증거 중 하나가 EUV 영상에서 콤팩트 루프 (compact loop) 를 검출하는 것이라는 사실에 근거한다 (Y.-M. Wang 2022). 이와 대조적으로, 우리는 HRIEUV 174 Å 과 AIA 171 Å 영상 어느 쪽에서도 미세플래시 발자국에서 그러한 소규모 루프 구조의 명확한 증거를 검출하지 못하였다. 그러한 루프가 존재하지만 위에 겹치는 플룸 방출 ("플룸 덩굴") 에 의해 가려져 있을 가능성도 있지만, 이러한 EUV 소규모 루프 관측의 부재가 미세플래시의 단극 기원과 부합함을 강조한다. 우리의 관측과 여기서 제시한 논거에 기반하여, 아래 4.3 절에서 미세플래시를 생성하는 가능한 단극 메커니즘을 제안할 것이다.

3.1.3 망 미세플래시의 생산율, 질량 플럭스, 자기 에너지, 열에너지 및 운동에너지 (Network Microflashes Production Rate, Mass Flux, Magnetic, Thermal and Kinetic Energies)

단일 미세플래시에 의해 방출되는 자기 에너지 (magnetic energy) 의 상한치 ($B^2 \times V/8\pi$) 는 2.0×10^{26} erg 으로 추정된다. 이 추정에서 망 바로 위의 자기장은 100 G 로 취했다. 망 영역의 자기장 강도는 태양의 여러 위치에 걸쳐 크게 변할 수 있다. 관측적으로, 플룸 기저 영역의 자기장 강도는 약 200–600 G 이상에 이르는 범위에 걸쳐 있다 (E. A. Avallone et al. 2018). 또한 비선형 무력 자기장 (nonlinear force-free field) 외삽은 활성 영역 내 저층 코로나 루프에서 500 G 이상의 자기장 강도를 제시하고 있다 (J. K. Thalmann et al. 2014). 우리의 플룸에서는 평균 자기장 강도를 ~ 100 G 으로 측정하였다. 앞서 언급한 측정값들에 상당한 불확실성이 있으므로, 100 G 을 대표적인 근사값으로 채택한다. 더욱이, 그림 4b 의 히스토그램은 100 G 추정치가 미세플래시 대부분의 기저부에서의 자속 강도를 오히려 과소 추정하고 있음을 시사한다. 모든 자속이 미세

플래시를 구동하는 데 소비되는 것은 아니지만, 이는 에너지 계산에서 100 G 추정치가 합리적임을 뒷받침한다.

부피 (V)에는 평균 미세플래시 길이와 폭 ($V = l \times w^2$)을 사용하였다. 이 자기 에너지는 캠프파이어 (N. K. Panesar et al. 2021), 코로나홀 제트 (coronal hole jet; S. Pucci et al. 2013), 코로나 밝은 점 (coronal bright point; E. R. Priest et al. 1994)의 자기 에너지 범위에 속한다. 이 값은 활성 영역 제트 (A. C. Sterling et al. 2017; N. K. Panesar et al. 2025), 활성 영역 꼬인 루프 (braided loop; J. W. Cirtain et al. 2013), 준폭발 (subflare; S. K. Tiwari et al. 2014)에 비해 약 한 자릿수 낮다. 미세플래시의 크기는 이전에 알려진 대부분의 일시 현상—예컨대 미세 규모 루프, 밝은 점, 제트/서지 (jet/surge), 캠프파이어 (S. K. Tiwari et al. 2019; D. Berghmans et al. 2021; N. K. Panesar et al. 2023; D. Nóbrega-Siverio et al. 2025)—보다 작다.

평균 망 미세플래시의 추정 열에너지 ($E = 1.5N_e k_B T V$)와 운동에너지 (kinetic energy; $0.5N_e m_p V v^2$)는 각각 $\sim 10^{24}$ erg, $\sim 10^{23}$ erg이다. 여기서 N_e 는 전자 수 밀도 (electron number density), k_B 는 볼츠만 상수 (Boltzmann constant), T 는 온도 (temperature), V 는 부피 (volume), m_p 는 양성자 질량 (proton mass), v 는 미세플래시의 속도이다. 우리는 관측에서 도출된 (그림 3) 평균 속도 $v = 50 \text{ km s}^{-1}$, 전자 밀도 10^{10} cm^{-3} (G. L. Withbroe & R. W. Noyes 1977; P. R. Young & E. Landi 2009; J. W. Cirtain et al. 2013), 그리고 $\sim 1 \text{ MK}$ 플라스마 방출에 민감한 $174 \text{ \AA}$ 채널 특성 (P. Rochus et al. 2020)에 부합하는 미세플래시 플라스마 온도 10^6 K 를 사용하였다.

추정된 운동에너지는 코로나 EUV 마이크로제트의 운동에너지 ($\sim 10^{23}$ erg; Z. Hou et al. 2021)와 같은 수준이며, 피코플레어 제트 (picoflare jet)의 운동에너지 ($\sim 10^{21}$ erg; L. P. Chitta et al. 2023)보다 두 자릿수 높다. 망 미세플래시의 열에너지는 나노플레어 (nanoflare)에 대해 추정된 에너지 (10^{24} erg; E. N. Parker 1988)와 같은 수준이다. 미세플래시를 만드는 재결합 폭발 (reconnection burst) 동안 미세플래시의 자기 에너지 상한치 중 약 2%가 재결합된 개방 자기장을 따라 전파하는 알벤파 (Alfvén wave)로 전환된다고 가정하면, 미세플래시의 재결합 폭발 동안 방출되는 자기 에너지는 $\sim 4 \times 10^{24}$ erg이 된다. T. Yokoyama & K. Shibata (1995)에 따르면, 알벤파 에너지와 총 방출 자기 에너지의 비율은 약 3%이다. 여기서는 더 보수적인 2% 값을 추정에 사용한다. 플룸 꼭대기에서의 플룸 면적 팽창—예컨대 반경 팽창이 2 배라 하면, 플룸 꼭대기 면적은 $4 \times 10^{18} \text{ cm}^2$ —을 고려하면, 망 미세플래시는 코로나홀 플룸에서 태양 코로나와 태양풍을 구동하기에 충분한 에너지 ($\sim 10^6 \text{ erg cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$; G. L. Withbroe & R. W. Noyes 1977)를 방출한다는 것을 알 수 있다.

망 미세플래시의 질량 손실률 (mass-loss rate) $\dot{m}$ 은 다음 공식으로 추정할 수 있다:

$$\dot{m} = 4\pi R^2 \rho v f_{\text{CH}} f_{\text{PL}} f_{\text{NF}},$$

여기서 R 은 태양 반경 (radius of the Sun), m_p 는 양성자 질량, $\rho = m_p \times 10^{10} \text{ gm cm}^{-3}$ 은 미세플래시 질량 밀도 (mass density), $v = 50 \text{ km s}^{-1}$ 은 망 미세플래시의 측정된 평균 속도, $f_{\text{CH}} \sim 0.1$ 은 태양에서 코로나홀이 대략 덮고 있는 면적 비율 (K. L. Harvey & F. Recely 2002), $f_{\text{PL}} \sim 0.1$ 은 코로나홀 내 플룸이 덮고 있는 면적 비율 (I. A. Ahmad & G. L. Withbroe 1977), $f_{\text{NF}} \sim 0.1$ 은 임의의 시각에 플룸 내 망 미세플래시가 차지하는 플룸 기저부 면적 비율이다. 이 값들을 사용하고 미세플래시의 모든 질량 플럭스가 태양풍으로 유입된다고 가정하면, 망 미세플래시의 총 질량 손실률은 $5 \times 10^{12} \text{ gm s}^{-1}$ 로 나타나며, 이는 ”망 제트”(network jet; H. Tian et al. 2014)와 ”피코플레어 제트”(L. P. Chitta et al. 2023)의 질량 손실률과 같은 수준이다.

또한, 평균 미세플래시가 공급하는 양성자 (proton) 수는 미세플래시의 상승 플라스마 전체가 태양풍으로 탈출한다고 가정할 때 태양풍에 $\sim 3.3 \times 10^{32} \text{ proton s}^{-1}$ 에 달한다. 태양풍을 유지하는데 필요한 총 양성자 수는 $6 \times 10^{35} \text{ proton s}^{-1}$ (R. von Steiger et al. 2000; Y. M. Wang 2016, 2020)이며, 이를 공급하려면 $\sim 2 \times 10^3$ 개의 망 미세플래시 (또는 $\sim 10^2$ 개의 플룸)가 동시에 존재해야 한다. $f_{\text{CH}} \sim 0.1$ 일 때, 태양의 코로나홀 면적은 $\sim 0.1 \times 4\pi R^2 = 6 \times 10^{21} \text{ cm}^2$ 이다. 코로나홀 플룸 기저부의 면적은 $\sim 10^{18} \text{ cm}^2$, 플룸 꼭대기의 면적은 그보다 ~ 4 배 큰 $\sim 4 \times 10^{18} \text{ cm}^2$ 로 추정된다. 따라서 100 개 플룸의 꼭대기 면적의 합은 $\sim 4 \times 10^{20} \text{ cm}^2$ 이며, 이는 코로나홀 면적 중 플룸 꼭대기가 채우는 비율이 ~ 0.1 이라는 값과 일치한다. 이 값은 앞서 망 미세플래시의 질량 손실률을 추정할 때 가정했던 값과 동일하다.

이 연구에서 우리는 미세플래시가 관측된 플렉스를 독점적으로 설명한다고 주장하지 않으며, 대신 이를 태양풍에 기여하는 기존에 인식되지 않았던 후보 요인으로 제안한다. 미세플래시가 지배적인 기원인지, 스피큘 · 제트 · 나노플레어와 같은 다른 메커니즘들 가운데 하나의 미미한 구성 요소인지, 아니면 전혀 유의미한 기여를 하지 않는지는 추가 연구가 필요한 열린 질문으로 남아 있다. 여기서 확인된 미세플래시는 현재까지 플룸 기저부에서 관측된 가장 작고 가장 편재하는 (ubiquitous) 현상 중 하나이며, 따라서 전체 에너지 및 질량 수지 (energy and mass budget) 에서 추가적인 구성 요소를 대표할 수 있다는 점을 강조한다.

3




Figure 1. Examples of network microflashes at a plume base. Panel (a) shows an HRIEUV 174 Å image of a solar plume and several microflashes. The dotted-dashed white box in (a) outlines the field of view (FOV) displayed in panels (c-l). Panel (b) shows an unsharp mask version of the same image. Panels (c-g) and (h-l) display HRIEUV 174 Å images and unsharp masked images, respectively, of network microflashes in the plume base. The green arrow points to the evolution of a non-plume-base network microflash throughout its life. The red circles enclose other microflashes that are visible in the HRIEUV frames. The white diagonal slit in (a) shows the path of the time-distance plot of Figure 2a. The animation (Movie1) runs from 12:40 to 13:15 UT. The animation is unannotated and the FOV is same as in Panel (a).

그림 1. Examples of network microflashes at a plume base. (a) HRIEUV 174 Å 플룸 + 미세플래시 전경, (b) unsharp mask, (c-l) 플룸 기저 미세플래시 시간 진화 (원본/언샤프). 시간거리 슬릿 · 녹색 화살표 · 적색 원 · Movie1.

그림 해설:

유형: 다중 패널 EUV 영상 모자이크 (관측 사진 + 언샤프 마스크 + 시간 진화 시퀀스) **위치:** 3. Results (3.1) / p.3 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-1.png’ (크롭 양호, 캡션 포함)

이미지 자력 해석:

- 상단에 큰 패널 2 개. 좌측 (a) 는 ”EUI 174 29-Mar-2023 13:06:00” 라벨이 붙은 황금색 (EUV 174 Å 전형) 영상으로, 화면 상단에서 위로 뻗어 올라가는 밝은 깃털 모양 구조 (플룸, plume) 가 여러 가닥 보인다. 영상 중앙 좌측에 흰색 점선 사각형 (dot-dashed box) 이 그려져 있어 확대할 관심영역 (FOV) 을 표시한다. 우측 하단에 ”3 Mm” 스케일 바.
- 우측 (b) 는 같은 시각 같은 영상의 ”Unsharp” (언샤프 마스크) 버전으로, 대비가 강화되어 미세한 밝은 점/필라멘트 구조가 또렷하다. 중앙부에 흑백이 교차하는 작고 밝은 알갱이 같은 구조들이 모여 있다.
- 중단 · 하단에 작은 패널 10 개가 2 행 × 5 열로 배열. 위쪽 행 (c-g) 은 원본 174 Å, 아래쪽 행 (h-l) 은 같은 영역의 언샤프 마스크. 각 패널에 시각 라벨 (13:05:27, 13:05:48, 13:05:54,

13:06:00, 13:06:24) 이 시간순으로 찍혀 있다.

- 각 작은 패널 중앙에 **녹색 화살표**가 한 지점을 가리킨다—시간에 따라 화살표 끝의 밝기가 나타났다가 사라지는 하나의 미세플래시 일생을 추적하는 것으로 보인다.
- 13:06:00 패널 (f, k) 에는 추가로 **적색 원** 3~4 개가 다른 위치의 밝은 점들을 둘러싼다—동시에 진행 중인 다른 미세플래시들.
- (a) 의 흰색 사선 슬릿 (가는 직사각형) 이 플룸 한 가닥 위에 놓여 있어, 이후 시간-거리 분석용 슬릿임을 암시.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: (a) HRIEUV 174 Å 태양 플룸 + 여러 미세플래시 영상, 흰 점선 박스는 (c-l) FOV, (b) 언샤프 마스크 버전, (c-g)/(h-l) 은 원본/언샤프 174 Å 시간 진화, 녹색 화살표는 비 (非) 플룸 기저 (원문 "non-plume-base") 미세플래시 일생 추적, 적색 원은 기타 미세플래시, 흰 사선 슬릿은 Figure 2a 시간-거리 맵 경로, Movie1(12:40–13:15 UT).

- 추가 판독: 캡션에서 녹색 화살표가 가리키는 것이 "non-plume-base network microflash" 라고 명시한 점은 이미지만으로는 알기 어려웠던 정보. (00_paper_source.md 요약에는 "플룸 기저" 로 적혀 있으나 원문 캡션은 "non-plume-base" 로 표기—[주의] 요약본과 원문 캡션 사이 미세 불일치, 원문 기준 채택).

논문에서의 역할: 논문의 핵심 발견 ("망 미세플래시") 을 처음으로 시각적으로 제시하는 대표 그림. 플룸 기저에 미세하고 짧게 명멸하는 밝은 폭발이 실재함을 시간 시퀀스로 입증하여, 이후 모든 통계 · 자기환경 · 모델 분석의 출발점이 된다.

(정량 정보) 스케일 바 3 Mm. 시퀀스 총 시간 약 1 분 (13:05:27→13:06:24), 미세플래시 일생이 수십 초 규모임을 시사.




Figure 2. Examination of the periodicity of network microflashes. Panel (a) shows the HRIEUV 174 Å total intensity time-distance map plotted along the rectangular slit of Figure 1a. The right-leaning bright structures are the microflashes and their upflows that appear within that slit. Panel (b) shows the HRIEUV 174 Å intensity time profile from the white-dashed line in panel (a). The time profile shows peaks at intervals of 5–15 minutes. Panel (c) shows the power spectrum of the intensity time profile in (b).

그림 2. Periodicity 검토. (a) 슬릿 따라 시간-거리 맵, (b) 강도 시간 프로파일 (5~15 분 간격 피크), (c) 파워 스펙트럼 (5,10,15 분 피크).

그림 해설:

유형: 시간-거리 맵 + 시계열 곡선 + 파워 스펙트럼 (3 패널 세로 배열) **위치:** 3. Results (3.1) / p.4 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-2.png’ (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- (a) 상단: 가로축 = 시각 (12:40 ~ 14:40), 세로축 = "Distance (pixels)" 0~50. 황금색 시간-거리 맵으로, 시간 방향 (가로) 으로 밝고 어두운 줄무늬가 뺨뺨하게 반복되며, 일부 밝은 구조가 우상향으로 기울어진 (오른쪽으로 갈수록 거리 증가) 빛금 패턴을 보인다—거리 방향 바깥으로 전파되는 상향류 (outflow). 세로 중간 (약 distance=15) 에 흰색 수평 점선이 그어져 있어 (b) 에서 추출할 위치 표시.
- (b) 중단: 가로축 = 시각 (12:40~14:40, "Start Time 29-Mar-23 12:40:00"), 세로축 = "Normalized Intensity" 0.6~1.0. 검은 실선이 매우 들쭉날쭉하게 진동하며 다수의 뾰족한 피크. 전체적으로 13:00~13:30 부근이 약간 높고 이후 하강 추세지만, 13:40~14:00 부근에 두드러진 첨두 (0.9~1.0).
- (c) 하단: 가로축 = "Time (minutes)" 0~20, 세로축 = "Normalized Power" 0~1.0. 파워 스펙트럼. 약 5 분, 10 분, 15 분 부근에 뚜렷한 피크 (특히 10 분에서 1.0 최대, 15 분에서 ~0.6). 5 분 이하 짧은 주기에는 잔잔한 다수의 작은 피크들이 밀집.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: (a) HRIEUV 174 Å 총강도 시간-거리 맵 (Figure 1a 슬릿 따라), 우상향 밝은 구조 = 미세플래시와 그 상향류, (b) 흰 점선 위치 강도 시계열 (5~15 분 간격 피크), (c) 파워 스펙트럼.

- 추가 판독: (c) 에서 5/10/15 분 피크가 5 분 p-mode 진동의 기본 · 배음 관계로 해석될 수 있음을 암시 (논문 논지의 ”5 분 p-mode 트리거” 와 직결).

논문에서의 역할: 미세플래시가 무작위가 아니라 5 분 주기성 (태양 p-mode 음향 진동) 과 연관 되어 반복적으로 점화된다는 주장의 첫 증거. ”p-mode 진동이 재결합 버스트를 트리거한다” 는 메커니즘 가설을 뒷받침.

(정량 정보) 강도 시계열 정규화 범위 0.6~1.0, 파워 스펙트럼 피크 ~5/10/15 분, 관측 구간 약 2 시간 (12:40~14:40).




Figure 3. Automated detection of network microflashes. The different colored circles in panel (a) mark different microflashes detected over the entire HRI_{EUV} time span. The white dashed region is the FOV searched for microflashes. The background image is the HRI_{EUV} image at 13:40:00. Each microflash is indexed (1~6000) by its time of appearance, with color indicating detection time from red (earliest) to pink (latest), in accord with the corresponding color bar in (a). Panels (b–d) show histograms of microflash speed, lifetime, length (blue) and width (red), respectively, from the automated detection method. The mean values of the speed, lifetime, length and width are $50 \pm 50 \text{ km s}^{-1}$, $22 \pm 20 \text{ seconds}$, $860 \pm 150 \text{ km}$ and $770 \pm 200 \text{ km}$, respectively.

scatter is large. We obtain a mean microflash lifetime of $22 \pm 20 \text{ seconds}$ (Figure 3b). As discussed for the speeds, the lifetimes are also not normally distributed, and most values are clustered in the 3–12s bin. The mean microflash length and width came out to be of $860 \pm 150 \text{ km}$ and $770 \pm 200 \text{ km}$, respectively. We verified the findings of our automated method by manually measuring these aspects of 50 manu-

agreement with those obtained from the manually measured microflashes. A caveat is that the manual detections focus on a limited sample of 50 isolated and prominent events, whereas the automated selection depends sensitively on the chosen intensity threshold. As a result, the number of identified microflashes can vary significantly with the adopted threshold.

그림 3. Automated detection. (a) 약 6000 개 미세플래시 검출 (색 = 검출 시각), 흰 점선 = 탐색 FOV, 배경 = 13:40 HRIEUV. (b–d) 속도 · 수명 · 길이 (청)/폭 (적) 히스토그램. 평균 $50 \pm 50 \text{ km/s}$, $22 \pm 20 \text{ s}$, $860 \pm 150 \text{ km}$, $770 \pm 200 \text{ km}$.

그림 해설:

유형: 자동 검출 결과 지도 + 3 개 통계 히스토그램 (2×2 패널, A= 지도, B/C/D= 히스토그램)

위치: 3. Results (3.1.1) / p.7 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-3.png’ (크롭 양호, 좌상단 페이지 번호 7 만 잔존—무해)

이미지 자력 해석:

- (A) 좌상단: ”29-March-2023 13:40:00” 라벨. 회색조 EUV 배경 위에, 흰색 점선 사각형 (탐색 FOV) 안에 수천 개의 알록달록한 (무지개색) 작은 원/점으로 뿔뿔하게 뒤덮여 있다. 좌측에 세로 컬러바 ”Microflash Index” 0 ~ 약 6000 —색이 검출된 미세플래시의 시간 순서 (인덱스) 를 나타냄. 박스 밖은 색이 거의 없음. ”3.5 Mm” 스케일 바.
- (B) 좌하단: 가로축 = ”Lifetime (s)” 0~150+, 세로축 = ”Number of events” 0~2500+. 파란 계단식 히스토그램. 가장 짧은 첫 bin(0~25 s 부근) 에서 약 2800 으로 최대, 이후 급격히 감소하는 우편향 (긴 꼬리) 분포.

- (C) 우상단: 가로축 = "Speed (km s⁻¹)" 0~250+, 세로축 = "Number of events" 0~1750+. 파란 히스토그램. 첫 bin(0~50)에서 ~1750 최대, 우편향 감소. 100~200 구간에 작은 잔여.
- (D) 우하단: 가로축 = "Length (km)" 0~1600, 세로축 = "Number of events" 0~3000+. **파란 (길이) · 적색 (폭)** 두 히스토그램 중첩. 둘 다 오른쪽으로 갈수록 급증하여 마지막 bin(약 700~900 km, 도표 우측 끝)에서 최대치 (파란 ~3000)를 찍는 좌편향 (왼쪽 꼬리) 형태—대부분의 미세플래시가 수백 ~ 수천 km 길이/폭.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 약 6000 개 미세플래시를 HRIEUV 전 구간에서 검출, 색 = 검출 시각, 흰 점선 = 탐색 FOV, 배경 = 13:40 HRIEUV. (B-D) 수명 · 속도 · 길이 (청)/폭 (적) 히스토그램. 평균 50±50 km/s, 22±20 s, 860±150 km, 770±200 km.

주의 부분 차이: 본문 텍스트 (크롭 하단)는 평균 수명 "22±20 s", 평균 길이/폭 "860±150 km / 770±200 km", 평균 속도 "50±50 km/s"로 명시. 히스토그램의 최빈 bin 위치와 대체로 부합. (C) 속도 컬러바 · 축 최대가 250+로 보여 평균 50보다 긴 꼬리 존재 확인.

논문에서의 역할: 미세플래시가 통계적으로 **매우 흔한 현상** (약 6000 개/2 시간, 플룸 기저에 동시 ~20 개, 매초 1 개 발생)임을 증명. 개별 사건의 물리량 (수명 ~20 s, 속도 ~50 km/s, 크기 ~800 km) 분포를 정량화하여 "나노플레이어급" 에너지 추정 토대 제공.

(정량 정보) 검출 총 ~6000 개, Microflash Index 컬러바 0~6000. 평균 수명 22±20 s, 속도 50±50 km/s, 길이 860±150 km, 폭 770±200 km. 본문은 자동검출이 임계값에 민감하여 수동 측정 (Fig 7)과 보완적임을 명시.

9




Figure 4. Magnetic Setting and Flux-strength histogram of 50 random manually selected microflashes. (a) Locations of the peak-brightness centroids of the 50 microflashes, marked by yellow "+" symbols, overlaid on the HMI plume-base flux map. (b) Histogram of HMI flux-strengths measured at the 50 microflash centroids shown in panel (a).

그림 4. Magnetic Setting. (a) 50 개 미세플래시 침두 밝기 중심점 (노란 +) 을 HMI 플룸 기저 자속도에 중첩, (b) 50 개 중심점 HMI 자속 강도 히스토그램 (다수가 음극성 200 G 이상).

그림 해설:

유형: 자기장 지도 위 위치 중첩 + 자속 강도 히스토그램 (2 패널) **위치:** 3. Results (3.1.2) / p.9

이미지 파일: 'papers/figures/fig-4.png' (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌측: 가로축 X(arcsec) 80~120, 세로축 Y(arcsec) -170~-120. "29-Mar-2023 13:39:29 UT". 흑백 자기장 지도 (HMI line-of-sight magnetogram, 검정 = 강한 음극성, 흰색 = 양극성, 회색 = 약자기). 중앙에 크고 검은 (강한 음극성) 자기장 덩어리가 있고, 그 위·주변에 **노란색 + 기호 50** 여 개가 밀집해 찍혀 있다—미세플래시 침두밝기 중심점들. 대부분의 노란 + 가 검은 (음극성) 영역 가장자리/내부에 위치.
- (b) 우측: 가로축 = "Flux-strength (G)" -1000 ~ 0(전부 음수 영역), 세로축 = "Number of events" 0~25. 검은 계단식 히스토그램. 약 -300 ~ -200 G bin 에서 최대 (~21), -500~-400 에서 ~12, 음극성 쪽으로 넓게 분포. 양극성 (0 이상) bin 은 사실상 없음.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: (a) 50 개 무작위 수동 선별 미세플래시의 침두밝기 중심점 (노란 +) 을 HMI 플룸 기저 자속도에 중첩, (b) 그 50 개 지점의 HMI 자속 강도 히스토그램.

- 추가 판독: 히스토그램이 **거의 전부 음극성 (-)** 한쪽에만 분포 → 미세플래시가 단극 (unipolar) 자속, 특히 강한 음극성 망 (≥ 200 G) 위에 자리함을 정량적으로 확증. 논문 제목의 "unipolar" 주장의 핵심 시각 증거.

논문에서의 역할: 미세플래시가 **양극 (쌍극) 자속의 충돌이 아니라 단극 자속** 위에서 일어남을 보여, 기존 망 사건 (예: 양극 소멸 제트) 과 구별되는 "새로운 종류의 망 사건" 이라는 주장을 뒷받침. 단극 자기장 교차 재결합 메커니즘 (Fig 5) 의 관측 근거.

(정량 정보) 자속 강도 분포 -200~-500 G 집중, 최빈 ~-250 G, 일부 -1000 G 까지. 표본 50 개. FOV $X \sim 80-120''$, $Y \sim -170-120''$.

4. Summary and Discussion (요약 및 논의)

우리는 태양 코로나 플룸 (solar coronal plume) 의 기저부에서 발생하는 미세 규모의 밝기 증폭 현상, 즉 망 미세플래시 (network microflashes) 의 존재를 보고한다. 이 현상은 소규모이고 수명이 짧은 구조물이다. 망 미세플래시는 플룸 깔때기 (plume funnel) 를 따라 뻗어 있는 밝고 약간 신장된 구조로 나타난다. 정렬된 HMI 자력도 (magnetogram) 는 미세플래시가 자기망 (magnetic network) 자속 통로 (flux lane) 에 뿌리를 두고 있음을 보여준다. 그림 1 에서 확인할 수 있듯이, 일부 망 미세플래시는 비 (非) 플룸 (non-plume) 망 자속 (network flux) 에서도 나타난다. 연구한 사례들은 모든 망 미세플래시가 망 자기망 (network magnetic flux) 에서 발원함을 보여주는데, 대부분은 플룸 덩굴 (plume bush) 을 수반하지만 일부 망 영역은 플룸 덩굴을 갖지 않는다. 비플룸 망 영역에서 발견되는 미세플래시의 수밀도 (number density) 는 플룸 기저 망 영역의 약 10% 에 불과하다. 아마도 해당 위치에서는 플룸을 형성하기에 충분한 자기장 세기가 없는 것으로 보이며 (E. A. Avallone et al. 2018), 나머지 자기망 영역은 플룸을 형성하는 데 필요한 모든 조건 (충분히 강한 개방 자기장 (open magnetic field)) 을 갖추고 있다. 제트렛 (jetlet)(N. K. Panesar et al. 2018b, 2019, 2020) 과 캠프파이어 (campfire)(N. K. Panesar et al. 2021; Z. Hou et al. 2021) 와 달리, 망 미세플래시는 명백히 단극 (unipolar) 자기 자속에 위치한다 (3.1.2 절 참조). HMI 자력도의 자기 자속 통로 가장자리에는 소수 극성 (minority-polarity) 의 자기 자속 요소가 일부만 존재한다 (그림 6d 참조).

4.1 망 미세플래시와 태양풍과의 가능한 연관성

플룸 영역의 3 차원 (3D) 자기력선 형태를 조사하기 위해, 우리는 HMI 캐링턴 지도 (Carrington map) 를 사용하여 플룸에 대한 데이터 기반 전지구 자기유체역학 (magnetohydrodynamics, MHD) 시뮬레이션을 수행했다. 그림 5a-c 는 서로 다른 시점에서 바라본 플룸 및 인근 활동 영역 (active region) 과 각각 연결된 3D 개방 및 폐쇄 자기력선 (open and closed field lines) 을 보여준다. 배경 자기장 자력도는 더 약한 자기장 영역을 표시하기 위해 낮은 임계값으로 포화 (saturated) 되

어 있다. MHD 모델은 플룸 기저부에서 발원하는 개방 자기력선과, 인근 활동 영역과 연결되는 폐쇄 자기력선이 존재함을 보여준다. 그림 5b의 개방 자기력선은 수 태양 반경 (R_s) 까지 뻗어 있다. 그림 5c는 태양권으로 확장되어 $15 R_s$ 에서 약 $\sim 400 \text{ km s}^{-1}$ 의 태양풍 (solar wind) 을 운반하는 개방 자기력선을 나타낸다. 개방 자기력선을 따라 바깥으로 이동하는 태양풍의 속도는 더 증가하여 $20 R_s$ 에서 500 km s^{-1} 이상에 달하며, 이는 고속 태양풍 (fast solar wind) 속도 범위에 해당한다.

코로나 플룸이 태양풍의 주요 공급원임은 잘 알려져 있으나 (예: S. W. McIntosh et al. 2010; H. Tian et al. 2011; S. Pucci et al. 2014; L. Zangrilli & S. M. Giordano 2020; R. L. Moore et al. 2023), 플룸에서 태양풍을 구동하는 것이 무엇인지는 아직 불분명하다. 우리의 관측은 HRIEUV 미세플래시가 플룸에서의 고속 태양풍 구동 후보임을 시사한다.

우리가 태양권 자기장 시뮬레이션에 사용한 전지구 MHD 코드는 미세플래시 규모의 물리 과정을 분해하지는 못하지만, 관측된 플룸을 관통하는 자기장이 태양권으로 열려 있음을 보임으로써 우리의 가정을 지지한다. 우리가 적용한 AWSoM 코드 구성에서, 이들 개방 자기장을 따라 계산된 유출 속도는 관측된 고속 태양풍 속도 범위 내에 속한다. 우리는 플룸 기저부의 단극 미세플래시가 상부 개방 자기장에 필요한 열과 운동량을 공급하여 코로나 가열 (coronal heating) 및 태양풍 가속에 기여하는 시나리오를 추측한다.

AIA 영상이 미세플래시 위치 주변에 개방 및 폐쇄 자기력선이 모두 존재함을 시사하고 있어, 우리는 미세플래시의 자기장이 실제로 개방되어 있다는 확신을 높이기 위해 PFSS 보다 태양권 자기장을 더 강건하게 모델링하는 AWSoM 코드를 사용하기로 했다. AWSoM 코드가 관측된 범위 내의 태양풍 속도를 재현한다는 사실은, 태양권 자기장에 대한 모델링이 올바름을 뒷받침한다. 우리가 관측한 미세플래시는 AWSoM 으로 모델링된 개방 자기력선의 기저부에서 발생한다. 이는 미세플래시가 개방 자기장에서 발생함을 지지하며, 나아가 미세플래시가 태양풍의 후보 기여원임과 일치한다. 그럼에도 불구하고, 미세플래시가 여기서 제안한 역할을 실제로 수행하는지 확인하기 위해서는 추가 연구가 필요하다.

4.2 망 미세플래시와 다른 분출 현상들과의 비교

우리는 여기서 논의하는 미세플래시를 소규모 코로나 제트 (coronal jet) 나 제트렛의 소형 버전으로 보지 않는다 (예: A. C. Sterling et al. 2015; N. K. Panesar et al. 2018b; P. Kumar et al. 2022; L. P. Chitta et al. 2023; N. E. Raouafi et al. 2023). 그 이유는 다음과 같다: (i) 미세플래시는 제트/제트렛과 달리 명백히 단극인 자기장 자속에서 발원하는 자기장에서 발생한다; (ii) 미세플래시는 제트/제트렛이 분출 시 보이는 넓은 기저부 (또는 역 Y 자 구조) 와 기저부 밝기 증폭을 보이지 않는다; (iii) 제트 및 제트렛과 달리, 대부분의 미세플래시는 스파이크 (spike) 형태의 연장부를 나타내지 않는다. 그럼에도 불구하고, 플룸 방향으로 연장되는 일부 미세플래시는 제트렛 및 피코플레어 제트 (picoflare jet) 와 유사성을 공유할 가능성을 배제할 수 없다. 이들은 명백히 단극인 자기장 자속에 뿌리를 두고 있으며 스파이어 (spire) 에 비해 상대적으로 넓은 기저부를 갖지 않지만 말이다.

미세플래시는 또한 태양 캠프파이어 (solar campfire) (D. Clery 2021; D. Berghmans et al. 2021) 와도 명백히 다르다. 미세플래시는 캠프파이어보다 더 수가 많고 크기가 작지만, 이 사실만으로는 미세플래시가 단순히 더 작고 더 많은 캠프파이어의 변형일 가능성을 배제하지 못한다. 그러나 미세플래시는 자속 로프 (flux rope) 의 분출 없이 나타나는 반면, 대부분의 캠프파이어는 기저부에서 자속 로프가 분출하는 명확한 증거를 관측적으로 (N. K. Panesar et al. 2021, 2022) 및 모델링으로 (Y. Chen et al. 2021) 모두 보인다는 점에서, 두 현상이 서로 구별되는 특징임을 지지한다. 더욱이, 캠프파이어와 미세플래시 모두 망 자기장 자속에서 발생하지만, 현재까지 캠프파이어는 주로 조용한 태양 (quiet-Sun) 영역, 특히 혼합 극성 (mixed-polarity) 위치에서 보고된 반면 (N. K. Panesar et al. 2021; F. Kahil et al. 2022), 미세플래시는 주로 단극인 개방 자기장의 플룸 기저부에서 발생한다.

미세플래시는 또한 '플룸 과도 밝기점 (plume transient bright points)' (N.-E. Raouafi & G. Stenborg 2014) 과도 명백히 다르다. 플룸 과도 밝기점의 일반적인 수명은 10 분 (미세플래시의 22 초와 대조) 이며, AIA 193 Å 채널에서 가장 명확하게 관측된다. 플룸 과도 밝기점 역시 가시적인

자속 소멸 (flux cancelation) 이 일어나는 위치에서 발생하는 경향이 있어, 제트 및 제트렛과 유사하지만 미세플래시의 단극 기저부와는 구별된다.

그럼에도 불구하고, 우리가 보고하는 일부 미세플래시는 193 Å 채널에서 관측된 Hi-C EUV 밝기 점 (bright dot)(S. Régnier et al. 2014) 과 수명 및 폭이 유사하다는 공통점을 지닌다. 그러나 해당 연구에서 Hi-C 밝기 점은 활동 영역 가장자리의 폐쇄 루프 내부에서 발생했다. 마찬가지로, S. K. Tiwari et al. (2019, 2022) 이 Hi-C 2.1 및 HRIEUV 174 Å 데이터를 사용하여 활동 영역 중심부와 코로나 밝기점 내에서 보고한 밝기 점들 역시 더 큰 폐쇄 자기장 내부에 있었다. 이와 대조적으로, 우리의 관측은 미세플래시가 코로나 플룸 기저부의 개방된 단극 자기장 내에서 발생함을 보여준다. 일부 미세플래시는 HRIEUV 가 검출하기에 너무 작은 폐쇄 루프 위치에서 발생할 수도 있으며, 그 경우 일부 미세플래시와 밝기 점이 공통된 물리적 기원을 공유할 가능성이 있다. 따라서 우리는 미세플래시처럼 보이는 일부 특징이 실제로는 다양한 소규모 점 형태 및 제트 형태 태양 활동의 광범위한 부류에 속할 가능성을 배제할 수 없다 (예외적인 경우는, 우리가 검출하기에 너무 작은 규모의 혼합 극성 자기 요소에 의해 형성될 수 있으며, 3.1.2 절 말미에서 우리가 지정한 혼합 극성 제트의 다른 예상과 어떤 식으로든 부합하지 않을 수도 있다).

4.3 망 미세플래시의 구동 메커니즘

우리의 HRIEUV 및 HMI 관측을 바탕으로, 우리는 미세플래시 구동 메커니즘에 대한 그림 5d-e 의 모식적 그림을 제안한다. 그림 5d 에서 우리는 단극의 양극성 (positive-polarity) 망 자속 덩어리 (network flux clump) 에 뿌리를 둔 개방된 플룸 자기장을 나타낸다. [” 단극” 이라는 표현은 플룸을 형성하는 모든 자기 자속, 구체적으로 그림 5d 및 5e 의 파란 원 내부의 모든 자속이 단일 극성에 속함을 의미한다. 이 구성은 개방 자기장과 상호 작용하는 소형 양극성 (bipolar) 분출 자속 요소를 수반하는 코로나 제트의 전형적인 자기 설정 (예: N. K. Panesar et al. 2016 의 그림 4 참조) 과 다르다. 현재의 경우, 제트와 달리, 플룸 기저부 (파란 원 내부) 에서는 반대 극성 요소가 관측되지 않는다. 더욱이, 미세플래시를 생성하기 위해 플룸의 개방 자기장과 재결합하는 루프 자기장은 분출하지 않는다. 이는 소형 양극이 먼저 분출한 뒤 이어서 개방 자기장과 재결합하여 제트 밝기점과 스파이어를 생성하는 제트 시나리오 (예: N. K. Panesar et al. 2016 의 그림 4b 참조) 와 대조된다.] 음극성 (negative-polarity) 자속 덩어리는 플룸 기저부 바깥에 존재하며, 이 음극성 자속과 연결되는 루프도 있다. 교차된 개방 자기장과 폐쇄 루프 사이에서 교환 자기 재결합 (interchange magnetic reconnection) 이 발생한다 (그림 5d 의 별표). 일부 폐쇄 루프의 양극성 다리 (positive leg) 는 망 자속 덩어리의 가장자리에 뿌리를 두고 있으며, 다른 폐쇄 루프의 양극성 다리는 망 자속 덩어리의 중심부에 뿌리를 두고 있다. 교환 재결합의 결과로 재결합된 폐쇄 자기력선 (그림 5e 의 빨간 폐쇄 자기력선) 과 재결합된 개방 자기력선 (그림 5e 의 빨간 개방 자기장) 이 만들어진다. 망 미세플래시는 이렇게 새롭게 재결합된 개방 및 폐쇄 자기력선의 양극성 발 (positive feet) 근처에서 나타난다. 우리는 이러한 교환 재결합이 망 미세플래시를 가열한다고 제안한다. V. Yurchyshyn et al. (2024) 은 단극 스피쿨 (unipolar spicule) 을 형성하는 유사한 재결합 시나리오를 제안한 바 있다.

다시 한번 강조하지만, 코로나 제트와 달리, 우리의 관측은 교환 재결합을 구동할 수 있는 폭발적인 자속 로프 분출 (explosive flux rope expulsion) 이 표면에서 발생한다는 증거를 보이지 않는다. 더욱이 우리는 플룸 기저부 영역에서 소규모 자기 양극을 관측하지 못했는데, 이는 코로나 제트 활동과 전형적으로 연관된 특징이다.

HMI 자력도에서 미세플래시를 수용하는 자기망 자속 집중 (magnetic network flux concentration) 이 주로 단극성으로 나타나지만, HMI 의 검출 임계값 (Y.-M. Wang 2016) 이하에는 소규모 반대 극성 자기 자속이 존재할 가능성이 있다. 이러한 미분해 소수 극성 자속의 소규모 루프와 개방된 다수 극성 자기장 사이의 재결합이 관측된 미세플래시를 일으킬 수 있다. 그러나 우리의 현재 관측은 자기망 자속 집중 내에 반대 극성 자속 패치가 존재한다는 증거를 보이지 않는다. 더욱이, 그림 4b 의 히스토그램은 우리의 미세플래시 대부분이 코로나홀 (coronal hole) 위치에서 예상되는 자속 값에 비해 양극성 자속이 강한 곳에서 발생함을 보여준다. 이는 해당 기저 영역으로 들어와 생존하면서 미세플래시를 구동하는 혼합 자속 양극을 형성하려면 이론적으로 강한 음극성 요소가 필요함을 의미한다. 대안으로, 출현하는 음극성 자속이—소형 양극 또는 단명 자기 영역 (ephemeral region) 의 형태로—독립된 특징으로 지속되지 않고, 대신 주변의 지배적인 양극성 자

속과 빠르게 재결합하여 개방 자기력선을 따라 에너지를 방출할 수 있다. 또한 이러한 소수 극성 자속은 플룸 형성 이전부터, 수렴하는 초과립 (supergranular) 흐름장 안에 이미 내포되어 있었을 수도 있다 (Y.-M. Wang 2022).

따라서 비록 현재 연구에서 더 높은 품질의 자력도가 부족하여 이러한 시나리오를 완전히 배제할 수는 없지만, 종합적으로 볼 때 현재 연구는 미세플래시가 단극 메커니즘 (unipolar mechanism)에 의해 형성됨을 지지한다. 그러나 우리의 연구는 명백히 추가 연구의 길을 열어놓는다. DKIST 및 Solar Orbiter의 편광 및 태양진동 영상기 (Polarimetric and Helioseismic Imager)와 같이 더 높은 공간 분해능과 감도를 갖춘 기기를 EUV와 연계하여 관측한다면, 많은 망 미세플래시 위치에서 소규모 반대 극성 자기 자속의 포함체를 드러낼 수 있을 것이다. 대부분의 미세플래시에서 이러한 소수 극성 자속이 검출된다면, 대부분의 미세플래시가 우리가 그림 5에서 제안하는 방식 대신, 자기 자속 소멸을 동반하는 자기 재결합 (magnetic reconnection accompanying magnetic flux cancelation)과 같은 기존의 제트 방식으로 작동함을 시사할 것이다 (N. K. Panesar et al. 2016; L. P. Chitta et al. 2017; N. K. Panesar et al. 2018a; S. K. Tiwari et al. 2019). 그러나 현재 연구에서 우리는 가지고 있는 관측적 증거에 기반한 해석을 고수한다.

또 다른 가능성은, 망 미세플래시가 자기 재결합을 필요로 하지 않는 충격파 (shock wave)의 결과일 수 있다는 점이다. 채층 (chromosphere) 충격파는 전이 영역 (transition region)에 국지적인 밝기 증폭을 일으킬 수 있다. 그러나 우리는 코로나 루프의 기저부에서 발생하는 EUV 밝기 올챙이 (EUV bright tadpole)에서 R. Wang et al. (2024)이 최근 보고한 바와 같이 충격파의 특징인 포물선 궤적 (parabolic trajectory)을 보이는 미세플래시 연장부를 발견하지 못했다. 대신, 우리의 관측은 광구 대류 운동 (photospheric convective motion)(D. E. Osterbrock 1961; A. A. van Ballegoijen et al. 2011; T. Sakurai 2017)(또는 p-모드 진동 (p-mode oscillation)에 의해 생성된 자기유체역학 (MHD) 파동이 채층을 통해 개방 자기력선을 따라 전파되어, 우리의 시나리오에서 망 미세플래시를 구동하는 자기 교환 재결합 (magnetic interchange reconnection)의 폭발을 촉발한다는 쪽을 지지한다 (그림 5e).




Figure 5. Models for the open magnetic field and the microflashes in the observed coronal plume. Panels (a-c) show the MHD model 3D field from the region of the 29-March-2023 plume. The radial magnetic field is shown at $r = 1.006 R_s$ with gray scale. Selected field lines from the plume region are shown. The color on the field lines shows the radial velocity of solar wind. Panel (a) shows a similar point of view as the observation. Panels (b) and (c) show a different point of view. The open field lines in (b) and (c) extend to ~ 2 and $\sim 15 R_s$, respectively. Panels (d-e) show our schematic for making unipolar HRIEUV microflashes in a unipolar magnetic network flux clump by interchange reconnection of plume-base open field with closed field from plume base to network cell interior. Panel (d) shows the start of two bursts of interchange reconnection. Panel (e) depicts the appearance of microflashes made by the bursts of interchange reconnection. The black curves are magnetic field lines before reconnection whereas the red curves are the newly reconnected magnetic field lines. Stars show the location of magnetic reconnection. The blue oval is the plume-base unipolar magnetic network flux clump. The yellow circles and solid ovals are network microflashes. The '+' and '-' signs, respectively, are for positive and negative magnetic polarity.

그림 5. Open field & 미세플래시 모델. (a-c) 29-Mar-2023 MHD 3D 자기장 (개방/폐쇄 자기력선, 색 = 태양풍 방사 속도, $\sim 2/\sim 15 R_s$ 까지). (d-e) 단극 자기장 자속 덩어리에서 교차 재결합으로 단극 HRIEUV 미세플래시 생성 모식도 (별 = 재결합 위치, 청 타원 = 단극 망 자속 덩어리).

그림 해설:

유형: MHD 3D 자기장 시각화 (3 패널) + 재결합 메커니즘 모식도 (2 패널), 총 5 패널 위치: 4. Summary & Discussion (4.1, 4.3) / p.11 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-5.png’ (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌상단: 회색조 방사 자기장 배경 ($r=1.006 R_s$) 위에 다발의 곡선 자기력선이 한 점 (플룸 기저) 에서 부채꼴로 위로 뿜어 나간다. 자기력선 색이 빨강 $\rightarrow$ 초록 $\rightarrow$ 파랑으로 변하며 좌측 컬러바 “W (km/s)” (태양풍 방사 속도) 를 따른다—뿌리 (빨강 = 저속) 에서 위로 갈수록 (파랑 = 고속) 색 변화. 우측에 작은 좌표축 화살표.
- (b) 좌중단: 태양 전체 구 (球) 를 비스듬히 본 시점. 구 표면에 흑점/자기 요소 (검은 점) 들이 보이고, 한 활동영역에서 같은 자기력선 다발이 **개방형 (open)** 으로 바깥 우상향으로 뿜어 나간다 (색 = 풍속). 시야를 넓혀 자기력선이 $\sim 2 R_s$ 까지 연장됨을 보여줌.
- (c) 좌하단: 더 멀리서 본 시점. 작은 태양 구에서 자기력선이 길게 (약 $\sim 15 R_s$) 부채살처럼 뿜어 명백히 행성간공간으로 열려 있음 (개방 자기장 = 고속 태양풍의 통로).
- (d) 우상단 모식도: 검정 수평면 위에 가운데 (+), 양옆에 (-, -) 자기 극성. 가운데에서 위로 곧게 뿜는 검은 자기력선 (개방장) 과, 양옆 (-) 에서 (+) 로 휘어 들어오는 폐쇄 자기력선. 가운데 (+) 주위에 파란 타원 (plume-base 단극 망 자속 덩어리) 이 그려지고, 그 위 두 곳에 **노란 별 (*)** 과 노란 원—재결합 시작 지점. ”interchange reconnection 직전” 상태.
- (e) 우하단 모식도: (d) 와 같은 배치이나, 재결합이 일어난 후. 가운데에서 **빨간색 (새로 재결합된)** 자기력선이 좌우로 휘며 뿜어 나가고, 노란/빨강 별과 불꽃 표시로 재결합 발생을

강조. 단극 망 자속의 교차된 다리 (crossed legs) 가 재결합하여 미세플래시를 생성하는 모습.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: (a-c) 29-Mar-2023 플룸의 MHD 모델 3D 자기장, 선택 자기력선 색 = 태양풍 방사 속도, (a) 는 관측과 유사한 시점, (b)(c) 는 다른 시점으로 $\sim 2/\sim 15$ Rs 까지 연장. (d-e) 단극 망 자속 덩어리에서 폐쇄장과 개방장 두 다발이 교차 재결합하여 미세플래시 생성하는 모식도. 검은 선 = 재결합 전, 빨간 곡선 = 새로 재결합된 선, 별 = 재결합 위치, 파란 타원 = 단극 망 자속 덩어리, +/− = 극성, 노란 원/타원 = 미세플래시.

- 추가 판독: (a)→(b)→(c) “줄아웃 시퀀스가” 국소 플룸 기저 → 전구 (全球) → 행성간” 으로 자기장이 실제 개방되어 고속풍과 연결됨을 단계적으로 입증.

논문에서의 역할: 논문 전체 논지를 종합하는 **핵심 그림**. 좌측 (a-c) 은 데이터 구동 3D MHD(AWSOM) 모델이 이 플룸에서 **개방 자기장 + 고속 태양풍**을 산출함을 보여” 태양풍 구동 후보” 주장을 정량적으로 지지하고, 우측 (d-e) 은 관측 · 통계 (단극 · 교차) 에서 도출한 **미세플래시 생성 메커니즘 (단극 망 자속 교차 다리의 교환 재결합 버스트)** 을 직관적 모식도로 제시.

(정량 정보) 자기력선 컬러바 = 태양풍 방사속도 $W(\text{km/s})$, 배경 = $r=1.006$ Rs 방사 자기장. 자기력선 연장 거리 ~ 2 Rs(b), ~ 15 Rs(c).

5. Conclusions (결론)

Solar Orbiter(HRIEUV) 관측을 통해, 우리는 플룸 (plume) 기저부에서 미세한 단수명 (short-lived) 밝기 증가 현상의 존재를 보고한다. SDO/HMI 자기장 영상 (magnetogram) 은 이들 밝기 증가 현상이 단극 (unipolar) 자기 플럭스 (magnetic flux) 내에 위치함을 보여준다. HRIEUV 관측 및 분석 결과에, MHD 모델로 태양풍 권 (heliosphere) 까지 외삽한 자기장 정보를 더하면, 망 미세플래시 (network microflash) 가 개방 자기력선 (open field line) 을 따라 플라즈마 유출류를 구동함으로써 태양풍 (solar wind) 에 에너지를 공급하고 질량을 보충할 수 있음을 시사한다. 미세플래시 현상은 자기망 (network) 에서 발원하는 코로나 (corona) 및 태양풍에 에너지를 공급하기에 충분한 에너지를 가지고 있을 가능성이 높다. 우리의 관측 · 시뮬레이션 결과는 나아가, 망 미세플래시가 자기망 바로 위에서 개방 자기장 (open magnetic field) 과 폐쇄 자기장 (closed magnetic field) 의 단극 자기력선 간 계면에서 발생하는 소규모 교환 재결합 (interchange reconnection) 폭발을 표지한다는 점을 시사한다.

미세플래시 자체의 속도만으로는 태양풍권으로 탈출하기에 부족하여, 태양풍을 공급하려면 추가적인 가속과 가열이 필요하다. 우리는 교환 재결합 폭발이 미세플래시를 생성할 때 형성되는 상향 전파 (upward propagating) 알벤파 (Alfvén wave)(예: A. C. Sterling et al. 2024 에서 논의된 바와 같이) 가 이 필요를 충족한다고 추정한다. 이러한 사항들은 향후 연구 과제이다. 본 연구에서 우리는 미세플래시가 제트릿 (jetlet), 피코플레어 제트 (pico flare jet), 그리고 최근 태양풍의 원천으로 제안된 플라즈마 상승류 (plasma up-flow)(N. E. Raouafi et al. 2023; L. P. Chitta et al. 2023; Y. Duan et al. 2025) 와는 구별되는, 태양풍의 가능한 새로운 공급원임을 뒷받침하는 증거를 제시하였다.

Acknowledgments (감사의 글)

두 명의 익명 심사위원 (anonymous reviewer) 의 긍정적이고 건설적인 의견에 진심으로 감사드린다. Solar Orbiter/EUI 및 SDO/AIA/HMI 데이터를 활용하였음을 밝힌다. AIA 는 NASA 의 Living With a Star 프로그램 임무인 Solar Dynamics Observatory 에 탑재된 관측기기이다. Solar Orbiter 는 ESA 와 NASA 의 국제 협력 우주 임무로, ESA 가 운용한다. EUI 관측

기기는 CSL, IAS, MPS, MSSL/UCL, PMOD/WRC, ROB, LCF/IO 가 제작하였으며, Belgian Federal Science Policy Office (BELSPO/PRODEX), Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), UK Space Agency (UKSA), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 의 지원을 받아 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), 그리고 Swiss Space Office (SSO) 를 통해 자금을 조달하였다. 본 연구는 NASA Science Mission Directorate 의 Heliophysics Division 이 Heliophysics Guest Investigators (HGI) 프로그램 및 Heliophysics Supporting Research (HSR) 프로그램을 통해 제공한 연구 보조금의 지원을 받았다. NKP 는 NASA's SDO/AIA (NNG04EA00C) grant, NASA's HCSI (80NSSC25K7028) grant, 그리고 NASA's HSR (80NSSC24K0258) grant 의 지원에 감사한다. SKT, RLM, VA, NKP 는 NASA HGI grant (80NSSC21K0520), HSR grant (80NSSC23K0093) 그리고/또는 NSF AAG award (no. 2307505) 의 지원에 진심으로 감사한다. SKT 는 ARC-CREST (NASA Cooperative Agreement 80NSSC23M0230) 의 지원에도 감사한다. ACS 와 RLM 은 NASA HSR grant 의 지원에 감사한다. ACS 는 "태양의 소규모 분출 (Small-scale eruptions in the Sun)" 을 주제로 한 International Space Science Institute 프로젝트 (ISSI-BJ ID 24-604) 에서의 토론을 통해 많은 도움을 받았다. 본 연구는 NASA ADSABS 와 Solar Software 를 활용하였다.

Appendix A (부록 A)

A. Data Set 1 (자료 세트 1: HRIEUV 및 SDO 관측)

그림 6(Figure 6) 은 그림 1(Figure 1) 에 표시된 것과 동일한 시야각 (FOV, field of view) 을 보여 준다. 여기에는 플룸 (plume) 과 그 하부 광구 자기장 (photospheric magnetic field) 의 AIA 171 Å 영상도 포함된다. HRIEUV 의 고해상도 영상은 태양 코로나 플룸 기저부에서 극히 미세한 규모의 일시적 밝은 구조들 (미세플래시, microflashes) 을 분명하게 보여주는 반면, AIA 171 Å 영상에서는 이 미세플래시들이 거의 보이지 않는다. 플룸은 분명히 음극성 (negative-polarity) 자속 (magnetic flux) 덩어리에 뿌리를 두고 있으며, 음극성 플룸 기저부 덩어리의 가장자리 근처에는 산재한 양극성 (positive-polarity) 자기 입자들이 일부 존재한다 (그림 6d).

A.1 Manual measurement (수동 측정)

자동 측정의 검증을 위해, 2023 년 3 월 29 일 자료에서 무작위로 선별한 망 미세플래시 (network microflashes) 50 개의 하늘 평면 (plane-of-sky) 속도, 길이, 폭, 수명을 수동으로 측정하였다 (그림 7). 속도는 $10\text{--}40\text{ km s}^{-1}$ 범위에 분포하며, 평균 속도는 $28 \pm 11.5\text{ km s}^{-1}$ 로 색구체 음속 (chromospheric sound speed) 의 크기와 비슷하다. 대부분의 망 미세플래시의 길이와 폭은 각각 350–600 km 및 250–350 km 이다. 수동 측정된 미세플래시 대다수의 수명은 8–80 초 사이이며, 평균은 30 ± 15 초이다.

A.2 Wavelet Analysis (웨이블릿 분석)

미세플래시의 주기성을 검토하기 위해, HRIEUV 174 Å 영상에 대해 모렛 웨이블릿 분석 (Morlet wavelet analysis; C. Torrence & G. P. Compo 1998) 을 수행하였다. 먼저 플룸 기저부에 설정한 50×40 픽셀 크기의 박스 (그림 8a 의 적색 박스에 표시) 에서 각 시각 단계 (time step) 마다 최대 강도를 추출한다. 이 시계열 (time series) 에서 평균을 뺀다. 이어서 평균을 뺀 시계열에 15 분 박스카 평활화 (15-minute box-car smoothing) 를 적용한다. 장주기 파워를 평균 차감 시계열에서 제거하기 위해, 15 분 박스카 평활화가 제공하는 평활 곡선을 평균 차감 시계열에서 다시 뺀다. 마지막으로, 이렇게 남은 시계열에 웨이블릿 파워 스펙트럼 (wavelet power spectrum) 분석을 적용하여 그림 8 에 나타난 파워 스펙트럼 (power spectrum) 을 구한다. 웨이블릿 분석에는 반치전폭 (full-width-half-maximum, FWHM) 이 10 분을 중심으로 상하 약 5 배 범위에 걸쳐 변하는 모렛 웨이블릿 커널 (Morlet wavelet kernels) 을 사용하였다.

그림 8b 는 그림 8a 의 적색 박스 내 174 Å 밝기 증가에 대한 웨이블릿 파워 스펙트럼을 보여준

다. 그림 8b의 파란색 영역은 가장 높은 파워를 보이는 시각과 주기를 나타내며, 이 파워는 ~5 분, 10 분, 15 분에서 최고점에 달한다.




Figure 6. The first example of network microflashes at a plume base observed by HRIEUV (from Figure 1) and SDO. Panel (a) shows an HRIEUV 174 Å image of solar plumes and microflashes. Panel (b) shows the unsharp mask version of the same image. Panel (c) shows the same FOV in AIA 171 Å. Panel (d) shows the line-of-sight photospheric magnetic flux in the same FOV. In panel (c), HMI contours, of levels ± 20 G, at 09:33:27 UT are overlaid, where yellow and cyan contours outline positive and negative magnetic flux, respectively. The animation (Movie2) runs from 12:40 to 14:40 UT. The animation is unannotated and the FOV is same as in Panel (a).

그림 6. (Appendix) 1 번째 예시. (a) HRIEUV 174 Å, (b) unsharp mask, (c) AIA 171 Å(HMI ± 20 G 등고선 중첩), (d) HMI 시선방향 광구 자속. Movie2(12:40–14:40).

그림 해설:

유형: 4 패널 다파장 영상 (HRIEUV + 언샤프 + AIA 171 + HMI 자기장), 1 번째 부록 예시 위치: Appendix A / p.15 이미지 파일: ‘papers/figures/fig-6.png’ (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌상단: "EUI 174 29-Mar-2023 13:06:00", X(arcsec) $-200 \sim -120$, Y(arcsec) $-340 \sim -240$. 황금색 174 Å 영상, 하단 중앙에서 위로 솟는 밝은 플룸 다발과 그 기저의 밝은 망.
- (b) 우상단: 같은 시각 ·FOV의 언샤프 마스크. 미세한 밝은 점/필라멘트 강조.
- (c) 좌하단: "AIA 171 29-Mar-2023 13:10:45", X 80~125, Y $-170 \sim -115$ (좌표계가 SDO 기준이라 (a)와 다름). 황금색 AIA 171 Å 영상 위에 **시안/노란색 등고선** (HMI ± 20 G 자속 윤곽, 노랑 = 양극성, 시안 = 음극성) 이 중첩. 등고선이 플룸 기저 망을 감싼다.
- (d) 우하단: "HMI 29-Mar-2023 13:10:59". 흑백 시선방향 광구 자기장. 중앙에 강한 흑백 (음 · 양극성) 망 자속 덩어리.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 첫 부록 예시. (a) HRIEUV 174 Å 플룸 + 미세플래시, (b) 언샤프, (c) 같은 FOV AIA 171 Å(노랑/시안 등고선 = ± 20 G HMI 양/음 자속, 09:33:21 UT), (d) HMI 시선방향 광구 자속. Movie2(12:40–14:40).

주의 미세 차이: 캡션의 등고선 시각이 "09:33:21 UT" 로 적혀 있으나 패널 (c) 라벨은 "13:10:45". 캡션 텍스트에 다른 데이터셋 시각이 혼입된 인쇄상 불일치로 보임 (이미지 라벨 우선). 노랑 = 양극성, 시안 = 음극성 표기는 이미지와 일치.

논문에서의 역할: 본문 Figure 1 과 같은 첫 데이터셋 (29-Mar-2023) 을 SDO/AIA·HMI 와 교차 검증하여, EU1 미세플래시가 다른 망원경 (AIA 171) 에서도 보이고 광구 자기장 (HMI) 과 공간적으로 대응함을 확인. 관측의 신뢰성과 자기적 맥락을 보강하는 부록 증거.

(정량 정보) HMI 등고선 ± 20 G. EU1 FOV $X \approx -200 \sim -120''$, $Y \approx -340 \sim -240''$; AIA/HMI FOV $X \approx 80 \sim 125''$, $Y \approx -170 \sim -115''$ (좌표계 차이).




Figure 7. Histograms of the plane-of-sky speed (a), length (b), and lifetime (c) for the 50 manually selected network microflashes. The red histogram in (b) is the width of the microflashes. The bin size is different for length (235 km) and width (100 km) histograms. The mean values of the speed, length, width, and lifetime are 27.5 ± 11.5 km s⁻¹, 675 ± 250 km, 450 ± 95 km, and 30 ± 15 seconds, respectively.

그림 7. (Appendix) 50 개 수동 선별 미세플래시 히스토그램. (a) 속도, (b) 길이 (청)/폭 (적, bin 다름), (c) 수명. 평균 27.5 ± 11.5 km/s, 675 ± 250 km, 450 ± 95 km, 30 ± 15 s.

그림 해설:

유형: 3 개 통계 히스토그램 (수동 측정 50 개 표본), 부록판 위치: Appendix A.1 / p.16 **이미지 파일:** 'papers/figures/fig-7.png' (크롭 양호, 좌상단 페이지번호 16 만 잔존)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌: 가로축 "Speed (km s⁻¹)" 10~70, 세로축 "No. of events" 0~20. 파란 계단 히스토그램. 10~20 bin 에서 ~17 최대, 20~30(~16), 30~43(~14) 로 완만히 감소, 50~65 에 작은 잔여 (~2). 대체로 10~45 km/s 집중.
- (b) 중: 가로축 "Length (km)" 200~1600, 세로축 0~25. **파란 (길이)·적색 (폭)** 두 히스토그램 중첩. 파란색은 350~600 km 에서 ~23 최대, 600~800(~16), 이후 감소 (800~1050 ~7). 적색 (폭) 은 더 좁은 분포로 350~450 km 에서 ~17 최대, 좁고 뾰족. 폭 bin(100 km) 이 길이 bin(235 km) 보다 작아 더 날카로움.
- (c) 우: 가로축 "Lifetime (seconds)" 0~80, 세로축 0~20. 파란 히스토그램. 7~20 s bin 에서 ~18 최대, 20~35(~15), 35~48(~10), 우편향 감소.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 50 개 수동 선별 미세플래시의 면천 (plane-of-sky) (a) 속도, (b) 길이 (청)/폭 (적, bin 다름), (c) 수명 히스토그램. 길이 bin 235 km, 폭 bin 100 km. 평균 속도 27.5 ± 11.5 km/s, 길이 675 ± 250 km, 폭 450 ± 95 km, 수명 30 ± 15 s.

일치 추가: 히스토그램 최빈 위치가 평균값과 잘 부합 (속도 ~20, 길이 ~450, 폭 ~400, 수명 ~15~20 s). 자동 검출 (Fig 3, 평균 속도 50) 보다 수동 측정 속도 (27.5) 가 낮는데, 이는 본문이 언급한 ”자동검출 임계값 민감성/표본 차이” 로 설명됨.

논문에서의 역할: 자동 검출 (Fig 3) 결과를 독립적 수동 측정으로 교차 검증. 미세플래시의 물리량 규모 (수십 km/s, 수백 km, 수십 s) 를 재확인하여 에너지 추정과 ”나노플레어급” 결론의 견고함을 높임.

(정량 정보) 표본 50 개. 평균 속도 27.5 ± 11.5 km/s, 길이 675 ± 250 km, 폭 450 ± 95 km, 수명 30 ± 15 s. 길이 bin 235 km, 폭 bin 100 km.

wind coming from this plume region, which again might be driven by what makes network microflashes.




Figure 8. Results from the wavelet analysis. Panel (a) shows an HRI_{EUV} 174 Å image and the red box shows the region that was analyzed. Panel (b) shows the normalized wavelet power spectrum, inside the red box of (a), as function of time and period. The wavelet spectrum shows the power as a function of time and period, over the time of the HRI_{EUV} observations. The black dashed curve depicts the cone of influence the values outside of which are subject to edge effects and are considered unreliable. Panel (c) plots the normalized power-spectrum given by time integral of panel (b).

그림 8. (Appendix) Wavelet 분석. (a) 분석 영역 (적색 박스) HRI_{EUV} 174 Å, (b) 시간-주기 정규화 웨이블릿 파워 스펙트럼 (영향원뿔 점선), (c) 시간적분 파워 스펙트럼. 5/10/15 분 피크.

그림 해설:

유형: 웨이블릿 (wavelet) 시간-주파수 분석 (3 패널: 영상 + 시간-주기 파워맵 + 전역 스펙트럼)

위치: Appendix A.2 / p.16 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-8.png’ (크롭 양호, 가로로 납작—본래 작은 그림)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌: ”29-Mar-2023 12:40:00” 라벨의 174 Å 영상 (어두운 황금색) 에 **적색 박스**로 분석 영역 표시.
- (b) 중: 가로축”Time (min)” ~20~100, 세로축”Period (min)” 1~50(로그 눈금). 상단에”Wavelet Power Spectrum” 컬러바 (노랑 = 고파워 → 파랑 = 저파워, 또는 그 반대—등고선으로 강조). 시간-주기 평면에 빨강/노랑의 고파워 패치들이 짧은 주기 (약 2~10 분) 대역에 시간 방향으로 반복적으로 나타나고, 파란 등고선이 이를 둘러쌘. 하단 · 좌우 모서리에 점선 곡선 (영향원뿔, cone of influence) —그 바깥은 신뢰 불가 영역.
- (c) 우: 가로축”Normalized Power” 0~1.0, 세로축”Period (min)” 1~50. ”Global Wavelet Spectrum” 검은 곡선이 주기를 따라 적분된 파워를 보여주며, 약 5 분 · 10 분 · 15 분 부근에 봉우리.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 웨이블릿 분석. (a) HRI_{EUV} 174 Å 영상, 적색 박스 = 분석 영역, (b) 정규화 웨이블릿 파워 스펙트럼 (시간 · 주기 함수, 검은 점선 = 영향원뿔, 바깥은 가장자리 효과로 신뢰 불가), (c) 시간 적분 전역 파워 스펙트럼. 5/10/15 분 피크.

일치 추가: Fig 2c 의 푸리에 파워 스펙트럼 (5/10/15 분) 과 독립적인 웨이블릿 기법으로 같은 주기를 재현 → 주기성 주장의 강건성 확인.

논문에서의 역할: Figure 2 의 주기성 (5 분 p-mode 연관) 을 웨이블릿이라는 다른 시간-주파수 기법으로 교차 검증. 미세플래시 점화가 5 분 음향 진동에 의해 변조/트리거된다는 메커니즘 가설을 강화.

(정량 정보) 주기 측 1~50 분 (로그), 전역 스펙트럼 피크 ~5/10/15 분, 분석 구간 약 100 분.

Appendix B (부록 B)

B. 자료 세트 2 (Data Set 2)

그림 9a 는 플룸 덤불 (plume bush) 기저부에서 미세한 규모의 밝기 증가 (fine-scale brightening) 가 다수 나타나는 플룸 (plume) 영역의 HRIEUV 영상이다. 이 밝은 특징들, 즉 망 미세플래시 (network microflash) 는 언샤프 마스크 (unsharp mask) 영상 (그림 9b 및 Movie2) 에서 더욱 뚜렷하게 확인된다. 플룸들은 명백히 단극 (unipolar) 인 양 (陽) 극성 자속 (magnetic flux) 덩어리에 뿌리를 두고 있다 (그림 9d). 그림 10 과 11 에서는 각각 플룸 기저부와 플룸 기저부가 아닌 망 (network) 자속 영역에서 HRIEUV 로 촬영한 미세플래시 (microflash) 를 확대하여 보여준다. 그림 10 의 녹색 화살표는 플룸 기저부에서 발생한 미세플래시 하나를 가리키며, 이 미세플래시가 발현되어 소멸되기까지의 진화 과정을 추적한다. 이 미세플래시는 수명이 약 80 초인 세장형 (elongated) 구조이다. 이들 영상에서는 많은 미세플래시가 관찰되며, 그 중 일부를 적색 원으로 표시하였다.

마찬가지로, 그림 11 은 그림 9a 의 점선 흰색 박스 영역, 즉 양 (陽) 극성 단극 망 자속 중 플룸 기저부에 해당하지 않는 구간에서 나타나는 망 미세플래시의 예시들을 보여준다. 그림 9 의 HMI 자기선도 (magnetogram) 는 그림 9 의 시야 (field of view, FOV) 내 광구 (photosphere) 자속 (magnetic flux) 을 나타낸다. 그림 11 의 시야는 두 플룸 발 (plume foot) 의 양극성 망 자속 덩어리를 연결하는 양극성 망 자속 띠 (network lane) 의 중간 구간을 중심으로 한다. 이 망 자속 띠의 해당 구간은 플룸 기저부에 해당하지 않는다. 이 단극 망 자속의 플룸 기저부 이외 구간에도 망 미세플래시가 여러 개 존재한다. 그림 11 의 녹색 화살표는 이러한 미세플래시 중 하나의 생애 대부분을 추적한다. 이 미세플래시는 플룸 자기장 (plume field) 방향을 따라 뻗은 세장형 밝은 구조이며 수명은 50 초이다. 이 두 번째 사례는 플룸 기저부 안팎의 단극 망 (unipolar network) 내에 미세플래시가 존재함을 확인해 준다. 관측 간격이 느려 이 자료 세트에서는 미세플래시를 측정하지 않았다.

그림 12 는 2023 년 10 월 26 일 관측의 플룸 영역에 대한 MHD 모델 3 차원 자기장 형태 (방법 참조) 를 보여준다. 이 플룸 영역에서 뻗어나가는 모델 개방 자기력선 (open magnetic field line) 이 태양권 (heliosphere) 까지 연장되어 있다. MHD 모델은 이 플룸 영역에서 고속 태양풍 (fast solar wind) 이 나온다는 결과를 제시하며, 이는 다시 한번 망 미세플래시를 일으키는 원인에 의해 구동될 가능성을 시사한다.

그림 캡션 번역

그림 9. 2023 년 10 월 26 일 HRIEUV 와 SDO 로 관측된 플룸 기저부 망 미세플래시의 사례. 패널 (a) 는 태양 플룸과 미세플래시들의 HRIEUV 174 Å 영상이다. 패널 (b) 는 동일한 영상의 언샤프 마스크 버전이다. 패널 (c) 는 동일한 시야의 AIA 171 Å 영상이다. 패널 (d) 는 동일한 시야 내 시선 방향 광구 자속이다. 패널 (c) 에는 09:33:27 UT 시각의 HMI 등고선 (± 20 G 수준) 이 중첩되어 있으며, 노란색 및 청록색 등고선이 각각 양 (陽) 극성 및 음 (陰) 극성 자속 영역을 나타낸다. (a) 의 흰색 실선 박스와 점선 흰색 박스는 각각 그림 10 과 그림 11 의 시야 범위를 나타낸다. 애니메이션 (Movie1) 은 09:00 에서 11:00 UT 까지 재생된다. 애니메이션에는 주석이 없으며 시야는 패널 (a) 와 동일하다.

그림 10. 플룸 기저부의 망 미세플래시. 패널 (a-d) 는 그림 9a 의 흰색 실선 박스 영역 내 플룸 기저 영역의 174 Å HRIEUV 영상이다. 패널 (e-g) 는 동일 영상의 언샤프 마스크 버전이다. 녹색 화살표는 망 미세플래시 하나의 생애 대부분을 추적한다. 적색 원들은 해당 HRIEUV 프레임에서 관찰되는 다른 미세플래시들을 감싸고 있다.

그림 11. 플룸 기저부 이외 망 영역의 망 미세플래시. 패널 (a-d) 는 그림 9a 의 점선 흰색 박스 영역 시야 내 174 Å HRIEUV 영상이다. 패널 (e-g) 는 해당 영상들의 언샤프 마스크 버전이다. 녹색 화살표는 망 미세플래시 하나의 생애 대부분을 추적한다. 적색 원들은 해당 HRIEUV 프레임에서 관찰되는 다른 미세플래시들을 감싸고 있다.

그림 12. 2023 년 10 월 26 일 관측의 플룸 영역에 대한 MHD 모델 3 차원 자기장. $r = 1.006 R_s$ 에서의 방사 (radial) 자기장이 회색조 (gray scale) 로 표시되어 있다. 선택된 자기력선들은 플룸 영역에서 뻗어나가며, 자기력선의 색상은 태양풍의 방사 속도를 나타낸다. 패널 (a) 는 관측과 유사한 시점을 보여준다. 패널 (b) 와 (c) 는 다른 시점을 보여준다. 두 번째와 세 번째 그림의 자기력선은 각각 $\sim 2 R_s$ 및 $\sim 14 R_s$ 까지 연장되어 있다.




Figure 9. An example of network microflashes at a plume-base observed by HRIEUV and SDO on 26-October-2023. Panel (a) shows HRIEUV 174 Å image of solar plumes and microflashes. Panel (b) shows the unsharp mask version of the same image. Panel (c) shows the same FOV in AIA 171 Å. Panel (d) shows the line-of-sight photospheric magnetic flux in the same FOV. In panel (c), HMI contours, of levels ± 20 G, at 09:33:27 UT are overlaid, where yellow and cyan contours outline positive and negative magnetic flux, respectively. The solid white box and dotted-dashed white box in (a) outlines the FOV in Figures 10 and 11, respectively. The animation (Movie1) runs from 09:00 to 11:00 UT. The animation is unannotated and the FOV is same as in Panel (a).

그림 9. (Appendix) 26-Oct-2023 예시. (a) HRIEUV 174 Å, (b) unsharp mask, (c) AIA 171 Å (± 20 G 등고선), (d) HMI 자속. 흰 실선/점선 박스 = Fig 10/11 FOV. Movie1(09:00–11:00).

그림 해설:

유형: 4 패널 다파장 영상 (HRIEUV + 언샤프 + AIA 171 + HMI), 2 번째 데이터셋 (26-Oct-2023)
위치: Appendix B / p.17 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-9.png’ (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- (a) 좌상단: ”EUI 174 26-Oct-2023 09:29:30”, X(arcsec) $-250 \sim -130$, Y $-150 \sim -300$. 황금색 174 Å. 우상단에 밝은 활동영역/플룸 다발이 있고, 좌하단으로 어두운 영역. **흰 실선 박스** (상단) 와 **흰 점선 박스** (하단) 가 두 개 그려져 각각 Fig 10, Fig 11 의 확대 FOV 를 지정.
- (b) 우상단: 같은 시각 ·FOV 언샤프 마스크. 미세 밝은 점/줄무늬 다수.

- (c) 좌하단: "AIA 171 26-Oct-2023 09:33:45", X $-470 \sim -420$, Y $260 \sim 340$. AIA 171 Å 에 시안/노란 등고선 (± 20 G HMI) 중첩.
- (d) 우하단: "HMI 26-Oct-2023 09:33:27". 흑백 자기장 지도, 넓은 흰색 (양극성) 망 자속 영역과 산재한 검은 음극성.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 26-Oct-2023 두 번째 예시. (a) HRIEUV 174 Å, (b) 언샤프, (c) AIA 171 Å (± 20 G 등고선, 노랑/시안 = 양/음), (d) HMI 자속. 흰 실선 박스 = Fig 10 FOV, 점선 박스 = Fig 11 FOV. Movie1(09:00–11:00).

일치 추가: 두 박스 (실선 = 플룸 기저, 점선 = 플룸에서 떨어진 망) 가 Fig 10/11 의 "플룸 기저 vs 비플룸 망" 대조 분석으로 이어짐을 미리 표시.

논문에서의 역할: 발견의 재현성을 다른 날짜 · 다른 태양 영역 (26-Oct-2023) 에서 입증하는 부록의 출발점. 미세플래시가 단일 데이터셋의 우연이 아니라 일반적 현상임을 보이고, 플룸 기저 (Fig 10) 와 비플룸 망 (Fig 11) 을 비교할 무대를 설정.

(정량 정보) HMI 등고선 ± 20 G. EUI FOV X $\approx -250 \sim -130''$, Y $\approx -150 \sim -300''$.

18




Figure 10. Network microflashes at the base of a plume. Panels (a–d) show 174 Å HRIEUV images of the plume base region in the FOV that is shown within the solid white box region of Figure 9a. Panels (e–h) show the unsharp mask images of the same. The green arrows point to a network microflash through most of its life. The red circles enclose other microflashes that are visible in these HRIEUV frames.

그림 10. (Appendix) 플룸 기저 미세플래시. (a–d) 174 Å HRIEUV (Fig 9a 흰 실선 박스 FOV), (e–h) unsharp mask. 녹색 화살표 = 한 미세플래시 일생 추적, 적색 원 = 기타 미세플래시.

그림 해설:

유형: 8 패널 시간 시퀀스 (174 Å 원본 4 + 언샤프 4), 플룸 기저 미세플래시 **위치:** Appendix B / p.18 **이미지 파일:** 'papers/figures/fig-10.png' (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- 위 행 (a–d): 174 Å HRIEUV 확대 영상, 시각 09:28:30 / 09:28:50 / 09:29:20 / 09:29:50. 각 패널에 **녹색 화살표**가 한 지점을 가리키며, (c) 09:29:20 에서 화살표 끝 밝기가 가장 강해 지고 **적색 원 3 개**가 다른 위치의 밝은 점들을 둘러쌌다. (d) 에서 다시 찾아듦—하나의 미세플래시가 밝아졌다 사라지는 일생 추적. 우상단 (d) 에 "3.5 Mm" 스케일.

- 아래 행 (e-h): 같은 시각 · 영역의 언샤프 마스크. 녹색 화살표 · 적색 원 동일 위치. 언샤프에서 미세 구조가 더 뚜렷.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 플룸 기저 미세플래시. (a-d) 174 Å HRIEUV(Fig 9a 흰 실선 박스 FOV), (e-h) 언샤프. 녹색 화살표 = 한 미세플래시 일생 추적, 적색 원 = 기타 미세플래시.

일치 추가: 시퀀스 총 약 80 초 (09:28:30→09:29:50) 에 밝기가 피크 · 소멸 → Fig 7 의 수명 분포 (수십 초) 와 부합.

논문에서의 역할: 두 번째 데이터셋에서도 플룸 기저에 미세플래시가 존재함을 Figure 1 과 동일한 방식 (시간 시퀀스 + 화살표 + 원) 으로 재확인. 발견의 보편성 입증.

(정량 정보) 스케일 3.5 Mm. 추적 미세플래시 일생 약 1 분 내외 (09:28:30~09:29:50), 동시 진행 다수 (적색 원 3 개).

19




Figure 11. Network microflashes in network away from the plume base. Panels (a-d) show the 174 Å HRIEUV images in the FOV of the dotted-dashed white box region of Figure 9a. Panels (e-g) show the unsharp mask versions of those images. The green arrow points to a network microflash through most of its life. The red circles enclose other microflashes that are visible in these HRIEUV frames.

그림 11. (Appendix) 비 (非) 플룸 기저 망 자속의 미세플래시. (a-d) 174 Å HRIEUV(Fig 9a 점선 박스 FOV), (e-h) unsharp mask. 녹색 화살표 = 한 미세플래시 추적, 적색 원 = 기타.

그림 해설:

유형: 8 패널 시간 시퀀스 (174 Å 원본 4 + 언샤프 4), 비 (非) 플룸 기저 망의 미세플래시 위치: Appendix B / p.19 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-11.png’ (크롭 양호)

이미지 자력 해석:

- 위 행 (a-d): 174 Å HRIEUV, 시각 09:28:40 / 09:28:50 / 09:29:10 / 09:29:30. **녹색 화살표**가 한 미세플래시 추적. (b) 에서 **적색 원 3 개**가 동시 밝은 점들 강조, (d) 에서도 우상단에 적색 원 1 개. 배경이 Fig 10 보다 어둡고 (플룸에서 떨어진 조용한 망 영역) 미세플래시들이 산재. 우상단”3.5 Mm”.
- 아래 행 (e-h): 동일 영역 언샤프 마스크. 미세 밝은 점들이 더 뚜렷하며 화살표 · 원 동일.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 플룸에서 떨어진 망 (network away from plume base) 의 미세플래시. (a-d) 174 Å (Fig 9a 점선 박스 FOV), (e-h) 연사프. 녹색 화살표 = 한 미세플래시 추적, 적색 원 = 기타.

논문에서의 역할: 미세플래시가 플룸 기저뿐 아니라 일반 자기망 전반에서도 발생함을 보여, 이 현상이 망 자속이 있는 곳이면 어디서나 일어나는 보편적 망 사건임을 시사. 동시에 ”플룸 기저 (Fig 10)” 와 ”비플룸 망 (Fig 11)” 의 직접 대조로, 플룸 기저에서의 미세플래시가 개방장과 결합해 태양풍을 구동할 수 있다는 차별적 의의를 부각.

(정량 정보) 스케일 3.5 Mm. 추적 구간 약 50 초 (09:28:40~09:29:30).

20




Figure 12. The MHD model 3D field from the plume region in the 2023 October 26 observations. The radial magnetic field is shown at $r = 1.006 R_s$ with gray scale. Selected field lines are shown from the plume region. The color on the field lines shows the radial velocity of the solar wind. Panel (a) shows a similar point of view as the observation. Panels (b) and (c) show a different point of view. The field lines in the second and third figures extend to ~ 2 and $\sim 14 R_s$, respectively.

그림 12. (Appendix) 26-Oct-2023 플룸 영역 MHD 3D 자기장. $r=1.006 R_s$ 방사 자기장 (회색조), 선택 자기력선 (색 = 태양풍 방사 속도). (a) 관측 시점, (b)(c) 다른 시점, 자기력선 $\sim 2/\sim 14 R_s$ 까지 연장.

그림 해설:

유형: MHD 3D 자기장 시각화 (3 패널, 줌아웃 시퀀스), 2 번째 데이터셋 (26-Oct-2023) **위치:** Appendix B / p.20 **이미지 파일:** ‘papers/figures/fig-12.png’ (크롭 양호, 좌상단 페이지번호 20 만 잔존)

이미지 자력 해석:

- (a) 상단: 회색조 방사 자기장 배경 ($r=1.006 R_s$) 위에서, 한 점 (플룸 영역) 으로부터 다발의 곡선 자기력선이 부채꼴로 위로 뻗는다. 색이 빨강 (저속, 뿌리) → 초록 → 파랑 (고속, 위) 으로 변화 (좌측 컬러바 W km/s, 우측 컬러바 M Gauss= 자기장 세기). Fig 5a 와 같은 구도이나 다른 날짜.
- (b) 중단: 태양 구를 비스듬히 본 시점. 구 표면 자기 요소 (검은 점) 위 한 영역에서 자기력선이 **개방형**으로 우상향 뻗음 (색 = 풍속). $\sim 2 R_s$ 까지 연장. 좌상단 작은 좌표축.

- (c) 하단: 더 멀리서 본 시점. 작은 구에서 자기력선이 길게 ($\sim 14 R_s$) 부채살처럼 행성간으로 열림—개방 자기장 + 태양풍 통로.

캡션 대조:

일치 일치. 캡션: 26-Oct-2023 플룸 영역 MHD 3D 자기장. $r=1.006 R_s$ 방사 자기장 (회색조), 선택 자기력선 색 = 태양풍 방사 속도. (a) 관측 시점, (b)(c) 다른 시점, 자기력선 $\sim 2/\sim 14 R_s$ 까지 연장.

일치 추가: Fig 5(a-c) 와 완전히 동형 구성. 두 번째 데이터셋에서도 MHD 모델이 **개방 자기장 + 고속 태양풍**을 산출함을 보여 모델 결과의 재현성 확인.

논문에서의 역할: Figure 5(a-c) 의 MHD 모델 결과를 26-Oct-2023 영역에서 재현. 미세플래시가 발생하는 플룸 영역이 실제로 개방 자기장 위에 있고 고속 태양풍과 연결됨을 두 번째 사례로 입증하여, "태양풍 구동 후보" 주장의 일반성을 강화.

(정량 정보) 배경 $r=1.006 R_s$ 방사 자기장 (컬러바 M Gauss), 자기력선 색 = 태양풍 방사속도 $W(\text{km/s})$, 연장 거리 $\sim 2 R_s(b)$, $\sim 14 R_s(c)$.

그림 간 관계 및 논문의 시각적 서사

논문의 12 개 그림은 **관측 발견** → **주기성** → **통계** → **자기환경** → **MHD 모델** → **메커니즘 모식도** → **부록 재현**의 논리적 사슬로 짜여 있다.

1) 발견 (본문 Fig 1)

Figure 1 이 핵심 발견인 "망 미세플래시" 를 EUV 174 Å 시간 시퀀스로 처음 시각화한다. 녹색 화살표 (개별 일생 추적) 와 적색 원 (동시 다발) 이라는 표기 관례가 이후 부록 Fig 10.11 에서 그대로 재사용된다.

2) 주기성 (Fig 2 ↔ Fig 8)

Figure 2(시간-거리 맵 + 푸리에 파워 스펙트럼) 가 5/10/15 분 주기성을 제시하고, **부록 Figure 8(웨이블릿 분석)** 이 같은 주기를 독립 기법으로 재확인한다. 두 그림이 "5 분 p-mode 트리거" 가 설을 이중으로 떠받친다.

3) 통계 (Fig 3 ↔ Fig 7)

Figure 3(자동 검출 ~ 6000 개 + 속도/수명/길이/폭 히스토그램) 이 미세플래시의 보편성과 물리량 규모를 정량화하고, **부록 Figure 7(수동 측정 50 개 히스토그램)** 이 이를 독립 검증한다. 자동 (속도 50 km/s) 과 수동 (27.5 km/s) 의 차이는 본문에서 임계값 민감성으로 조율된다.

4) 자기환경 (Fig 4)

Figure 4 가 미세플래시 위치를 HMI 자기장에 중첩하고 자속 강도 히스토그램이 **거의 전부 음극성 (단극)** 임을 보여, 제목의 "unipolar" 주장을 증명한다. 이는 곧바로 Fig 5 의 재결합 모식도로 연결된다.

5) MHD 모델 (Fig 5a-c ↔ Fig 12)

Figure 5(a-c) 의 AWSoM 3D MHD 모델이 플룸 영역에서 **개방 자기장 + 고속 태양풍**을 산출하고 (국소 → 전구 → 행성간 줄아웃), **부록 Figure 12** 가 두 번째 데이터셋에서 같은 결과를 재현한다. ” 태양풍 구동 후보” 주장의 정량적 근거.

6) 메커니즘 종합 (Fig 5d-e)

Figure 5(d-e) 모식도가 관측 (Fig 1·10·11)· 통계 (Fig 3·7)· 자기환경 (Fig 4)· 모델 (Fig 5a-c·12) 을 하나로 묶어, **단극 망 자속 덩어리의 교차된 다리가 교환 재결합 (interchange reconnection) 버스트로 미세플래시를 만든다**는 핵심 시나리오를 제시한다.

7) 재현성 (부록 Fig 6, 9, 10, 11, 12)

부록은 두 데이터셋 (29-Mar-2023: Fig 6 / 26-Oct-2023: Fig 9·10·11·12) 에서 발견을 재현한다. 특히 Fig 10(플룸 기저) 과 Fig 11(비플룸 망) 의 대조는 미세플래시가 망 전반의 보편 현상이면서, 개방장과 결합한 플룸 기저에서 특별히 태양풍 구동 의의를 가짐을 보인다. Fig 6·9 는 다파장 (EUI/AIA/HMI) 교차 검증으로 관측 신뢰성을 확보한다.

그림 간 관계 표

그림	관련 그림	관계
Fig 1	Fig 10, 11	동일 표기 (녹색 일생 추적, 1 차 주기성 (5/10/15) 교차 검증
Fig 2	Fig 8	미세플래시 물리적으로 교차 검증
Fig 3	Fig 7	단극 (음극성) 조합 모식도
Fig 4	Fig 5d-e	MHD 모델 개방 데이터셋에서 재현
Fig 5a-c	Fig 12	같은 29-Mar 데이터셋 교차 검증
Fig 1	Fig 6	2 차 데이터셋 전 모델
Fig 9	Fig 10, 11, 12	

그림 종합 해설: 그림 간 관계 및 시각적 서사

논문의 12 개 그림은 관측 발견 → 주기성 → 통계 → 자기환경 → MHD 모델 → 메커니즘 모식도 → 부록 재현의 논리적 사슬로 짜여 있다.

1) 발견 (본문 Fig 1)

Figure 1 이 핵심 발견인 ” 망 미세플래시 ” 를 EUV 174 Å 시간 시퀀스로 처음 시각화한다. 녹색 화살표 (개별 일생 추적) 와 적색 원 (동시 다발) 이라는 표기 관례가 이후 부록 Fig 10·11 에서 그대로 재사용된다.

2) 주기성 (Fig 2 ↔ Fig 8)

Figure 2(시간-거리 맵 + 푸리에 파워 스펙트럼) 가 5/10/15 분 주기성을 제시하고, 부록 Figure 8(웨이블릿 분석) 이 같은 주기를 독립 기법으로 재확인한다. 두 그림이 ”5 분 p-mode 트리거 ” 가 설을 이중으로 떠받친다.

3) 통계 (Fig 3 ↔ Fig 7)

Figure 3(자동 검출 ~6000 개 + 속도/수명/길이/폭 히스토그램) 이 미세플래시의 보편성과 물리량 규모를 정량화하고, 부록 Figure 7(수동 측정 50 개 히스토그램) 이 이를 독립 검증한다. 자동 (속도 50 km/s) 과 수동 (27.5 km/s) 의 차이는 본문에서 임계값 민감성으로 조율된다.

4) 자기환경 (Fig 4)

Figure 4 가 미세플래시 위치를 HMI 자기장에 중첩하고 자속 강도 히스토그램이 거의 전부 음극성 (단극) 임을 보여, 제목의 ”unipolar” 주장을 증명한다. 이는 곧바로 Fig 5 의 재결합 모식도로 연결된다.

5) MHD 모델 (Fig 5a-c ↔ Fig 12)

Figure 5(a-c) 의 AWSOM 3D MHD 모델이 플룸 영역에서 개방 자기장 + 고속 태양풍을 산출하고 (국소 → 전구 → 행성간 좁아짐), 부록 Figure 12 가 두 번째 데이터셋에서 같은 결과를 재현한다. ” 태양풍 구동 후보 ” 주장의 정량적 근거.

6) 메커니즘 종합 (Fig 5d-e)

Figure 5(d-e) 모식도가 관측 (Fig 1·10·11)· 통계 (Fig 3·7)· 자기환경 (Fig 4)· 모델 (Fig 5a-c·12) 을 하나로 묶어, 단극 망 자속 덩어리의 교차된 다리가 교환 재결합 (interchange reconnection) 버스트로 미세플래시를 만든다는 핵심 시나리오를 제시한다.

7) 재현성 (부록 Fig 6, 9, 10, 11, 12)

부록은 두 데이터셋 (29-Mar-2023: Fig 6 / 26-Oct-2023: Fig 9·10·11·12) 에서 발견을 재현한다. 특히 Fig 10(플룸 기저) 과 Fig 11(비플룸 망) 의 대조는 미세플래시가 망 전반의 보편 현상이면서, 개방장과 결합한 플룸 기저에서 특별히 태양풍 구동 의의를 가짐을 보인다. Fig 6·9 는 다파장 (EUV/AIA/HMI) 교차 검증으로 관측 신뢰성을 확보한다.

그림 간 관계 표

그림	관련 그림	관계
Fig 1	Fig 10, 11	동일 표기 (녹색) 일생 추적, 1 차
Fig 2	Fig 8	주기성 (5/10/15) 교차 검증
Fig 3	Fig 7	미세플래시 물리 로 교차 검증
Fig 4	Fig 5d-e	단극 (음극성) 자 합 모식도
Fig 5a-c	Fig 12	MHD 모델 개방 터넷에서 재현
Fig 1	Fig 6	같은 29-Mar 데 장 교차 검증
Fig 9	Fig 10, 11, 12	2 차 데이터셋 전 모델

References (참고문헌)

1. Ahmad, I. A., & Withbroe, G. L. 1977, *SoPh*, 53, 397, doi:10.1007/BF00160283
2. Avallone, E. A., Tiwari, S. K., Panesar, N. K., Moore, R. L., & Winebarger, A. 2018, *ApJ*, 861, 111, doi:10.3847/1538-4357/aac82c
3. Banerjee, D., Gupta, G. R., & Teriaca, L. 2011, *SSRv*, 158, 267, doi:10.1007/s11214-010-9698-z
4. Baweja, U., Pant, V., Krishna Prasad, S., et al. 2025, arXiv:2509.07796, doi:10.48550/arXiv.2509.07796
5. Bel, N., & Leroy, B. 1977, *A&A*, 55, 239
6. Berghmans, D., Auchère, F., Long, D. M., et al. 2021, *A&A*, 656, L4, doi:10.1051/0004-6361/202140380
7. Chen, Y., Przybylski, D., Peter, H., et al. 2021, *A&A*, 656, L7, doi:10.1051/0004-6361/202140638
8. Chitta, L. P., Peter, H., Solanki, S. K., et al. 2017, *ApJS*, 229, 4, doi:10.3847/1538-4365/229/1/4
9. Chitta, L. P., Zhukov, A. N., Berghmans, D., et al. 2023, *Science*, 381, 867, doi:10.1126/science.ade5801
10. Cirtain, J. W., Golub, L., Winebarger, A. R., et al. 2013, *Nature*, 493, 501, doi:10.1038/nature11772
11. Clery, D. 2021, *Science*, 372, 557, doi:10.1126/science.372.6542.557
12. D’Amicis, R., & Bruno, R. 2015, *ApJ*, 805, 84, doi:10.1088/0004-637X/805/1/84
13. de Moortel, I. 2009, *SSRv*, 149, 65, doi:10.1007/s11214-009-9526-5
14. De Pontieu, B., Erdélyi, R., & De Moortel, I. 2005, *ApJL*, 624, L61, doi:10.1086/430345
15. De Pontieu, B., Erdélyi, R., & James, S. P. 2004, *Nature*, 430, 536, doi:10.1038/nature02749
16. De Pontieu, B., McIntosh, S., Hansteen, V. H., et al. 2007, *PASJ*, 59, 655, doi:10.1093/pasj/59.sp3.S655
17. Doyle, J. G., Popescu, M. D., & Taroyan, Y. 2006, *A&A*, 446, 327, doi:10.1051/0004-6361:20053826
18. Duan, Y., Chen, H., Hou, Z., Sun, Z., & Shen, Y. 2025, *ApJ*, 979, 195, doi:10.3847/1538-4357/ada556
19. Gary, G. A. 2001, *SoPh*, 203, 71, doi:10.1023/A:1012722021820
20. Gupta, G. R., & Tripathi, D. 2015, *ApJ*, 809, 82, doi:10.1088/0004-637X/809/1/82
21. Harvey, K. L., & Recely, F. 2002, *SoPh*, 211, 31, doi:10.1023/A:1022469023581
22. Hou, Z., Tian, H., Berghmans, D., et al. 2021, *ApJL*, 918, L20, doi:10.3847/2041-8213/ac1f30
23. Inogamov, N. A. 1996, *Astronomy Letters*, 22, 780
24. Jin, M., Manchester, W. B., van der Holst, B., et al. 2013, *ApJ*, 773, 50, doi:10.1088/0004-637X/773/1/50
25. Jin, M., Manchester, W. B., van der Holst, B., et al. 2017, *ApJ*, 834, 173, doi:10.3847/1538-4357/834/2/173
26. Kahil, F., Hirzberger, J., Solanki, S. K., et al. 2022, *A&A*, 660, A143, doi:10.1051/0004-6361/202142873
27. Kraaikamp, E., Gissot, S., Stegen, K., et al. 2023, doi:10.24414/z818-4163
28. Krishna Prasad, S., Banerjee, D., & Van Doorselaere, T. 2014, *ApJ*, 789, 118, doi:10.1088/0004-637X/789/2/118
29. Kumar, P., Karpen, J. T., Uritsky, V. M., et al. 2022, *ApJ*, 933, 21, doi:10.3847/1538-4357/ac6c24
30. Lemen, J. R., Title, A. M., Akin, D. J., et al. 2012, *SoPh*, 275, 17, doi:10.1007/s11207-011-9776-8
31. Lionello, R., Linker, J. A., & Mikić, Z. 2009, *ApJ*, 690, 902, doi:10.1088/0004-637X/690/1/902
32. McIntosh, S. W., Innes, D. E., de Pontieu, B., & Leamon, R. J. 2010, *A&A*, 510, L2, doi:10.1051/0004-6361/200913699
33. Moore, R. L., Tiwari, S. K., Panesar, N. K., & Sterling, A. C. 2023, *ApJL*, 945, L16, doi:10.3847/2041-8213/acbe46
34. Müller, D., St. Cyr, O. C., Zouganelis, I., et al. 2020, *A&A*, 642, A1, doi:10.1051/0004-6361/202038467
35. Neugebauer, M., & Snyder, C. W. 1962, *Science*, 138, 1095, doi:10.1126/science.138.3545.1095.a
36. Newkirk, Gordon, J., & Harvey, J. 1968, *SoPh*, 3, 321, doi:10.1007/BF00155166

37. Ning, Z., Innes, D. E., & Solanki, S. K. 2004, *A&A*, 419, 1141, doi:10.1051/0004-6361:20034499
38. Nóbrega-Siverio, D., Joshi, R., Sola-Viladesau, E., Berghmans, D., & Lim, D. 2025, *A&A*, 702, A188, doi:10.1051/0004-6361/202555357
39. Osterbrock, D. E. 1961, *ApJ*, 134, 347, doi:10.1086/147165
40. Panesar, N. K., Hansteen, V. H., Tiwari, S. K., et al. 2023, *ApJ*, 943, 24, doi:10.3847/1538-4357/aca1c1
41. Panesar, N. K., Sterling, A. C., & Moore, R. L. 2018a, *ApJ*, 853, 189, doi:10.3847/1538-4357/aaa3e9
42. Panesar, N. K., Sterling, A. C., Moore, R. L., & Chakrapani, P. 2016, *ApJL*, 832, L7, doi:10.3847/2041-8205/832/1/L7
43. Panesar, N. K., Sterling, A. C., Moore, R. L., et al. 2018b, *ApJL*, 868, L27, doi:10.3847/2041-8213/aaef37
44. Panesar, N. K., Tiwari, S. K., Berghmans, D., et al. 2021, *ApJL*, 921, L20, doi:10.3847/2041-8213/ac3007
45. Panesar, N. K., Tiwari, S. K., Moore, R. L., & Sterling, A. C. 2020, *ApJL*, 897, L2, doi:10.3847/2041-8213/ab9ac1
46. Panesar, N. K., Tiwari, S. K., Moore, R. L., Sterling, A. C., & De Pontieu, B. 2022, *ApJ*, 939, 25, doi:10.3847/1538-4357/ac8d65
47. Panesar, N. K., Sterling, A. C., Moore, R. L., et al. 2019, *ApJL*, 887, L8, doi:10.3847/2041-8213/ab594a
48. Panesar, N. K., Sterling, A. C., Moore, R. L., et al. 2025, *ApJ*, 994, 164, doi:10.3847/1538-4357/ae0d90
49. Parker, E. N. 1958, *ApJ*, 128, 664, doi:10.1086/146579
50. Parker, E. N. 1988, *ApJ*, 330, 474, doi:10.1086/166485
51. Priest, E. R., Parnell, C. E., & Martin, S. F. 1994, *ApJ*, 427, 459, doi:10.1086/174157
52. Pucci, S., Poletto, G., Sterling, A. C., & Romoli, M. 2013, *ApJ*, 776, 16, doi:10.1088/0004-637X/776/1/16
53. Pucci, S., Poletto, G., Sterling, A. C., & Romoli, M. 2014, *ApJ*, 793, 86, doi:10.1088/0004-637X/793/2/86
54. Raouafi, N.-E., & Stenborg, G. 2014, *ApJ*, 787, 118, doi:10.1088/0004-637X/787/2/118
55. Raouafi, N. E., Stenborg, G., Seaton, D. B., et al. 2023, *ApJ*, 945, 28, doi:10.3847/1538-4357/acaf6c
56. Régnier, S., Alexander, C. E., Walsh, R. W., et al. 2014, *ApJ*, 784, 134, doi:10.1088/0004-637X/784/2/134
57. Richardson, I. G. 2018, *Living Reviews in Solar Physics*, 15, 1, doi:10.1007/s41116-017-0011-z
58. Rochus, P., Auchère, F., Berghmans, D., et al. 2020, *A&A*, 642, A8, doi:10.1051/0004-6361/201936663
59. Sachdeva, N., van der Holst, B., Manchester, W. B., et al. 2019, *ApJ*, 887, 83, doi:10.3847/1538-4357/ab4f5e
60. Sakurai, T. 2017, *Proceedings of the Japan Academy, Series B*, 93, 87, doi:10.2183/pjab.93.006
61. Scherrer, P. H., Schou, J., Bush, R. I., et al. 2012, *SoPh*, 275, 207, doi:10.1007/s11207-011-9834-2
62. Schrijver, C. J., & De Rosa, M. L. 2003, *SoPh*, 212, 165, doi:10.1023/A:1022908504100
63. Sokolov, I. V., van der Holst, B., Oran, R., et al. 2013, *ApJ*, 764, 23, doi:10.1088/0004-637X/764/1/23
64. Sterling, A. C., Moore, R. L., Falconer, D. A., & Adams, M. 2015, *Nature*, 523, 437, doi:10.1038/nature14556
65. Sterling, A. C., Moore, R. L., Falconer, D. A., Panesar, N. K., & Martinez, F. 2017, *ApJ*, 844, 28, doi:10.3847/1538-4357/aa7945
66. Sterling, A. C., Moore, R. L., Panesar, N. K., et al. 2020, *ApJ*, 889, 187, doi:10.3847/1538-4357/ab5dcc
67. Sterling, A. C., Panesar, N. K., & Moore, R. L. 2024, *ApJ*, 963, 4, doi:10.3847/1538-4357/ad1d5f
68. Subramanian, S., Kashyap, V. L., Tripathi, D., Madjarska, M. S., & Doyle, J. G. 2018, *A&A*, 615, A47, doi:10.1051/0004-6361/201629304
69. Thalmann, J. K., Tiwari, S. K., & Wiegmann, T. 2014, *ApJ*, 780, 102, doi:10.1088/0004-637X/780/1/102
70. Tian, H., McIntosh, S. W., Habbal, S. R., & He, J. 2011, *ApJ*, 736, 130, doi:10.1088/0004-637X/736/2/130

71. Tian, H., DeLuca, E. E., Cranmer, S. R., et al. 2014, *Science*, 346, 1255711, doi:10.1126/science.1255711
72. Tiwari, S. K., Alexander, C. E., Winebarger, A. R., & Moore, R. L. 2014, *ApJL*, 795, L24, doi:10.1088/2041-8205/795/1/L24
73. Tiwari, S. K., Hansteen, V. H., De Pontieu, B., Panesar, N. K., & Berghmans, D. 2022, *ApJ*, 929, 103, doi:10.3847/1538-4357/ac5d46
74. Tiwari, S. K., Panesar, N. K., Moore, R. L., et al. 2019, *ApJ*, 887, 56, doi:10.3847/1538-4357/ab54c1
75. Torrence, C., & Compo, G. P. 1998, *Bull. American Meteorological Society*, 79, 61, doi:10.1175/1520-0477(1998)079<0061:APGTWA>2.0.CO;2
76. Tóth, G., van der Holst, B., & Huang, Z. 2011, *ApJ*, 732, 102, doi:10.1088/0004-637X/732/2/102
77. Tóth, G., van der Holst, B., Sokolov, I. V., et al. 2012, *J. Computational Physics*, 231, 870, doi:10.1016/j.jcp.2011.02.006
78. van Ballegooijen, A. A., Asgari-Targhi, M., Cranmer, S. R., & DeLuca, E. E. 2011, *ApJ*, 736, 3, doi:10.1088/0004-637X/736/1/3
79. van der Holst, B., Sokolov, I. V., Meng, X., et al. 2014, *ApJ*, 782, 81, doi:10.1088/0004-637X/782/2/81
80. Viall, N. M., & Borovsky, J. E. 2020, *JGR (Space Physics)*, 125, e26005, doi:10.1029/2018JA026005, doi:10.1002/essoar.10502606.1
81. von Steiger, R., Schwadron, N. A., Fisk, L. A., et al. 2000, *J. Geophys. Res.*, 105, 27217, doi:10.1029/1999JA000358
82. Wang, R., Liu, Y. D., Chitta, L. P., Hu, H., & Zhao, X. 2024, *RAA*, 24, 125010, doi:10.1088/1674-4527/ad8a09
83. Wang, Y. M. 1994, *ApJL*, 435, L153, doi:10.1086/187617
84. Wang, Y. M. 2016, *ApJL*, 833, L21, doi:10.3847/2041-8213/833/2/L21
85. Wang, Y.-M. 2016, *ApJL*, 820, L13, doi:10.3847/2041-8205/820/1/L13
86. Wang, Y. M. 2020, *ApJ*, 904, 199, doi:10.3847/1538-4357/abbda6
87. Wang, Y.-M. 2022, *SoPh*, 297, 129, doi:10.1007/s11207-022-02060-y
88. Wang, Y. M., & Ko, Y. K. 2019, *ApJ*, 880, 146, doi:10.3847/1538-4357/ab2add
89. Wang, Y. M., & Muglach, K. 2008, *SoPh*, 249, 17, doi:10.1007/s11207-008-9171-2
90. Wang, Y. M., Warren, H. P., & Muglach, K. 2016, *ApJ*, 818, 203, doi:10.3847/0004-637X/818/2/203
91. Weitz, A., Tiwari, S. K., Cauzzi, G., Reardon, K. P., & De Pontieu, B. 2025, *ApJ*, 988, 133, doi:10.3847/1538-4357/ade3c1
92. Wilhelm, K., Curdt, W., Marsch, E., et al. 1995, *SoPh*, 162, 189, doi:10.1007/BF00733430
93. Withbroe, G. L., & Noyes, R. W. 1977, *ARA&A*, 15, 363, doi:10.1146/annurev.aa.15.090177.002051
94. Yokoyama, T., & Shibata, K. 1995, *Nature*, 375, 42, doi:10.1038/375042a0
95. Young, P. R., & Landi, E. 2009, *ApJ*, 707, 173, doi:10.1088/0004-637X/707/1/173
96. Yurchyshyn, V., Schmidt, A., Wang, J., et al. 2024, *ApJ*, 961, 79, doi:10.3847/1538-4357/ad0da2
97. Zangrilli, L., & Giordano, S. M. 2020, *A&A*, 643, A104, doi:10.1051/0004-6361/202037653