

- **seksuele selectie** = wanneer dier een partner kiest met bepaalde eigenschap (sterkste, stem, kleur, ...), deze eigenschap zal zich verspreiden in populatie
- **coeloom** = embryonale secundaire lichaamsholte waaruit de voornaamste lichaamsholten zich vormen
- **mutualisme** = beide partijen halen voordeel uit het langdurig samenleven met elkaar
- **spongocoel** = centrale lichaamsholte bij Porifera
- **gamont** = speciale cel bij Protozoa die door gamogonie aanleiding geeft tot gameten
- **komoxeen** = parasitaire soorten die slechts 1 gastheer nodig hebben
- **Urochordata** = manteldieren: oa. zakpijpen
- **korzels** = 2-vleugelige Insecta, larven parasiteren in zoogdieren
- **Teleostei** = echte beenvissen (Osteichthyes)
- **Cephalochordata** = lancetvisjes
- **digitigrad** = type v. lopen bij zoogdieren waarbij vingers/tenen (digiti) contact maken met grond
- **Enterobius Vermicularis** = behoort tot Nemathelminthes, zorgen bij mens voor orale of retro-infectie
- **ribosomen** = celorganel waarop eiwitten worden geassembleerd (op ER)
- **buisjes v. Malpighi** = lange dunne darmuitstulpingen die tussen weefsels en in hemolymfe liggen (excretie) (Arthropoda)
- **receptaculum seminis** = terminale verdikking vd vagina bij Arthropoda, vangt lichaamsvreemd zaad op (porifera)
- **choanocyten** = cellen die waterstroom doen ontstaan