

Begrippen

- **proglottiden** = lichaamssegment bij Cestoda / lintworm
- **flucterende asymmetrie** = ie populatie is de ene al wat meer onevenwichtig/asymmetrisch dan de andere
→ symmetrische patronen genieten een voorkeur boven asymmetrische
- **nephridioporus** = uitmonding van nephridium naar buiten (excretiestelsel Annelida)
- **orgaan v. Johnston** = orgaan dat de ruimtelijke oriëntatie der antennen registreert (Arthropoda)
- **nematocyst** = netelkapsel vol cnidoblast/netelcel (Cnidaria)
- **ceratotrichia** = filamenten die voor steun zorgen id vinnen (Chondrichthyes)
- **orgaan v. Jacobson** = gleuven in mondbak v. Reptilia met chemoreceptorfunctie
- **clitellum** = klierachtig deel van epidermis bij Annelida dat als zaaiel gevormd is en een rol speelt bij de voortplanting
- **madreporenplaat** = zeefplaat voorzien v. fijne kanaaltjes, deel van watervatenstelsel bij Echinodermata (zeesterren)
- **pseudocel** = lichaamsholte bij Nemathelminthes
- **dermatocranium** = deel van schedel bij Chordata, bestaande uit dekbeenderen bovenop neurocranium om zo kraakbeenig dak van schedelkaps en onderkaken te vervangen
- **gnathobasen** = basisleden bij pedipalpen van Arach-