- nida, worden gebroikt om te herkouwen
- oumoebocyt = celler die voedsel intracellulair verteren (Parijera)
- · Chidaria = neteldieren: aa. Kwallen, poliepen,...
- · Schistosoma = geslacht v. parasitaire wormen uh phylum Platyhelminthes: ub. Schistosoma mansoni
- · vesicula seminalis = bij lage organismes: opslagplaats voor mannelijke gemeten, bij mannelijke Mammalia: klier dat alkalinevloeistof aan semen toevoegt
- · syrinx = stemorgaan (Aves)
- · tympanum = trommelulies, reemt trillingen weer (Arthropoda)
- · hemorragisch giß = giß dat bloedingen tot stand brengt
- · Caudata = arole ud salamanders (Amphebia)
- · homologe kenmerken = kenmerken met dezeljale genetische oorsprong maar verschillend viterlijk
- o splijtpoot = type bouuplan v. segmentaanhangsels met lassen bij geleedpotigen (crustaceal)
- · Arthiodactyla = eenhoevigen (Mammalia)
- · pygostyle = vergræing ud staantwervels by Aves
- Entamaeba hystolytica = soort amaebe alie bij de mens parasiteert en die leialt tot enstige vormen v. diarree
- pedipalpen = aanhangsels un le kapsegment bij Arachnida, dienen als tostargaan (spinnen) of grijpscharen (scharpiaenen)
- · Gasterophilidae = 2-gevleugelole parasitaire vliegen: oa. paarden botulieg
- · cravium = schedeldos (Chordata)