Versuch · Benedict-Probe mit Mono- und Disacchariden

Material

Geräte

- 4 Reagenzgläser mit Ständer und Klammer
- Becherglas (400 mL)
- Bunsenbrenner, Dreifuß, Drahtnetz, Feuerzeug


Chemikalien

- Benedict-Reagenz
- Glucose-Lösung (1 %)
- Fructose-Lösung (1 %)
- Maltose-Lösung (1 %)
- Saccharose-Lösung (1 %)



Benedict-Reagenz
Achtung

Sicherheit: Schutzbrille tragen, lange Haare zusammenbinden.



Durchführung

- Setze ein heißes Wasserbad an.
- Beschrifte vier Reagenzgläser und setze die Proben entsprechend der Tabelle an.
- Stelle alle Reagenzgläser gleichzeitig für ca. 5 Minuten in das heiße Wasserbad und notiere deine Beobachtungen.

Beobachtung

Probe	Zuckerlösung (daumenbreit)	Benedict-Reagenz	Beobachtung
1	Glucose-Lösung	ca. 10 Tropfen	
2	Fructose-Lösung	ca. 10 Tropfen	
3	Maltose-Lösung	ca. 10 Tropfen	
4	Saccharose-Lösung	ca. 10 Tropfen	