



Chirurgien: Dr. NJINOUE NGNINKEU Bertin

Date: Sep 2, 2019

Anesthésiste: Dr. KUITCHE Jerry

Nom du patient: Chafang Lontchi Abdias

TYPE D'INTERVENTION :

décubitus dorsal sur la table opératoire sous anesthésie loco - régionale.
Désinfection et pose de champs stériles.

INDICATION OPERATOIRE :

décubitus dorsal sur la table opératoire sous anesthésie loco - régionale.
Désinfection et pose de champs stériles.

INTERVENTION :

- ? Introduction facile du cystoscope jusqu'à la vessie.
- ? Urètre bien visualisé dans son ensemble, avec une muqueuse bien vascularisée, sans rétrécissement de sa lumière, ni signe inflammatoire.
- ? Cystoscopie normale notamment absence de signes de lutte vésicale ; repérage des méats urétéraux.
- ? Volumineuse prostate obstructive de 1,5 champs optiques avec un lobe médian moyen.
- ? Résection complète du lobe médian permettant la création d'un tunnel de travail.
- ? Résection complète du lobe gauche puis du lobe droit avec hémostase correcte.
- ? Evacuation des copeaux à la poire d'Ellik et sous contrôle visuel.
- ? Mise en place d'une sonde 24 Ch. à 3 voies et mise en route de l'irrigation.

SUITES OPERATOIRES :

- ? Arrêt de l'irrigation à J1, et sortie à J2. ? Ablation de la sonde transurétrale à J2