

Ejercicios Hoja 2

Curso 2020/2021

1. Calcular los determinantes de las siguientes matrices:

a) $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \text{ en } \mathbb{Z}_7^3$

b) $B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ en } \mathbb{Z}_5^4$

c) $C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ en } \mathbb{Z}_3^5$

2. Hallar una base \mathcal{B} del espacio \mathbb{R}^3 tal que se verifiquen las siguientes igualdades:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

3. Dadas las aplicaciones

a) $f_1 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ definida por $f_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 \end{pmatrix}$

b) $f_2 : \mathbb{Z}_3^4 \longrightarrow \mathbb{Z}_3^2$ definida por $f_2 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 \end{pmatrix}.$

c) $f_3 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ definida por $f_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - x_2 \\ 2x_1 + x_2 \\ 1 \end{pmatrix}$

- d) $f_4 : P_3(\mathbb{R}) \longrightarrow P_2(\mathbb{R})$ definida por $f_4(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2$.

Estudiar si son aplicaciones lineales y, en su caso determinar su matriz asociada $\mathcal{M}(f)$.

4. Dado el sistema de vectores, sobre el cuerpo \mathbb{Z}_5 ,

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Comprobar si son base y caso de serlo calcular las matrices de paso $\mathcal{P}_{\mathcal{B}I_3}$ y $\mathcal{P}_{I_3\mathcal{B}}$ (**Nota.-** La matriz I_3 denota la matriz identidad de tamaño 3×3 .)

5. Dados los siguientes conjuntos de vectores, sobre el cuerpo \mathbb{Z}_5 ,

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Comprobar si son base y, caso de serlo calcula la matriz de paso $\mathcal{P}_{\mathcal{B}_1\mathcal{B}_2}$.

6. Sea la aplicación lineal:

$$f : \mathbb{Z}_5^2 \longrightarrow \mathbb{Z}_5^4 \text{ definida por } f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + 2x_2 \\ 2x_1 - 3x_2 \\ 4x_1 + 2x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

y las bases:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ de } \mathbb{Z}_5^2$$

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ de } \mathbb{Z}_5^4$$

Calcular las siguientes matrices:

a) $\mathcal{M}_{B_1 I_4}(f)$.

b) $\mathcal{M}_{I_2 B_2}(f)$.

c) $\mathcal{M}_{B_1 B_2}(f)$.

(**Nota.-** Las matrices I_2 y I_4 denotan la matriz identidad de tamaño 2×2 y 4×4 respectivamente.)

7. Dadas las aplicaciones lineales:

$$\mathbb{R}^3 \xrightarrow{g} \mathbb{R}^2 \text{ y } \mathbb{R}^2 \xrightarrow{f} \mathbb{R}^3$$

definidas por:

$$g \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 \end{pmatrix} \text{ y } f \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 \\ x_1 + 3x_2 \\ -x_1 - x_2 \end{pmatrix}$$

y las bases

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ de } \mathbb{R}^2$$

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ de } \mathbb{R}^3$$

$$\mathcal{B}_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \text{ de } \mathbb{R}^3$$

Calcular:

a) $\mathcal{M}_{B_1 B_2}(f)$

b) $\mathcal{M}_{B_3 B_1}(g)$

c) $\mathcal{M}_{B_2 B_3}(f \circ g)$

8. Calcular el núcleo, $\text{Ker}(f)$, y el espacio imagen, $\text{Im}(f)$, de las siguientes aplicaciones lineales:

a) la aplicación dada por la matriz

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{Z}_5)$$

b) la aplicación lineal $f : P_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}^4$ definida por:

$$f(p(x)) = (p(0), p(1), p(2), p(3))$$

(**Nota.** $p(x)$ denota en general al polinomio $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in P_2(\mathbb{R})$)

9. Sean las bases de \mathbb{Z}_5^3 ,

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \right\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

y la aplicación lineal $f : \mathbb{Z}_5^3 \longrightarrow \mathbb{Z}_5^3$ cuya matriz asociada en bases \mathcal{B}_2 y \mathcal{B}_1 es:

$$\mathcal{M}_{\mathcal{B}_2\mathcal{B}_1}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

a) Calcula la matriz del cambio de base $\mathcal{P}_{\mathcal{B}_2\mathcal{B}_1}$

b) Dado el espacio $U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1} \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \right\}$. Hallar una base de U cuyos vectores estén expresados en base canónica.

c) Calcular $f \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

10. Dado el espacio $V = C(B)$ siendo B la matriz, sobre el cuerpo \mathbb{R} ,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 3 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

- a) Estudia si los vectores son generadores, linealmente independientes o base.
 - b) Si no son base extrae una base de entre ellos.
 - c) Calcula unas ecuaciones implícitas de V .
 - d) Ampliar la base del espacio V , encontrada en el apartado b), añadiéndole los vectores que se necesiten para obtener una base del espacio \mathbb{R}^4 .
11. Dados los espacios $U = N(B)$ y $V = N(C)$ siendo B y C las matrices, sobre el cuerpo \mathbb{Z}_5^5 ,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 4 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Se pide:

- a) Estudiar si ambos espacios son iguales o si alguno está contenido en el otro.
 - b) Ecuaciones implícitas del espacio suma $U + V$ y del espacio intersección $U \cap V$.
 - c) Bases de los espacios $U + V$ y $U \cap V$.
12. Dados los espacios de $P_3(\mathbb{R})$

$$U = \langle 1 - x + x^2 + x^3, x - x^2, -1 + x^2, 2 + x - 2x^2 + x^3 \rangle$$

y

$$V = \langle 1 - x - x^2 + 2x^3, 2x - 2x^2, 3 - 3x^2, 3 + 2x - 5x^2 \rangle.$$

Se pide:

- a) Base y dimensión de U y V .
- b) Ecuaciones implícitas de U y V .

- c) Estudia si son iguales o si alguno está contenido en el otro.
- d) Encuentra un polinomio que esté en V pero no en U . Comprueba que ese polinomio junto con los de la base de U forman una base de $P_3(\mathbb{R})$.
- e) Ecuaciones paramétricas de $U + V$ y de $U \cap V$.