

5. 最近の成果2: 複数積公式のコスト証明

■ 複数積公式 (Multi-product formula, MPF)

G. H. Low, et al., arXiv:1907.11679 (2019)

- Trotter分解(積公式)とユニタリ線型結合を組み合わせた量子アルゴリズム

$$M(\tau) = \sum_{j=1}^J c_j [T_p(\tau/k_j)]^{k_j} = e^{-iH\tau} + \mathcal{O}(\tau^{m+1}).$$

線型結合

p 次 Trotter 分解

- Trotter分解の **良い N -依存性** と ユニタリ線型結合の **指数的に良い ε 依存性**
を両立すると期待されるが、**完全な計算コストの証明は未解決**

■ Our work: 複数積公式の計算コスト証明

K. Mizuta, Quantum 10, 1974 (2026)

	$\mathcal{O}(1)$ -qubit の量子ゲート数		補助 qubit 数
	有限距離相互作用 H	長距離 k 体相互作用 H	
p 次 Trotter 分解 A. Childs, et al. (2021)	$Ng \left(\frac{Ngt}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{p}}$	$N^k g \left(\frac{Ngt}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{p}}$	0
LCU/QSVT A. Gilyén, et al. (2019)	$N(Ngt + \log(1/\varepsilon))$	$N^k(Ngt + \log(1/\varepsilon))$	$\log N$
HHKL J. Haah, et al. (2021)	$Ngt \times \text{polylog}(Ngt/\varepsilon)$	\leftarrow Lieb-Robinson限界を利用	$\log \log(Ngt/\varepsilon)$
p次複数積公式 (this work)	$N^{1+\frac{1}{p+1}}gt \times \text{polylog}(Ngt/\varepsilon)$	$N^{k+\frac{1}{p+1}}gt \times \text{polylog}(Ngt/\varepsilon)$	$\log \log(Ngt/\varepsilon)$

複数積公式は良い N, t, ε 依存性を有する量子アルゴリズム / 理論下限 $\Omega(Nt)$ にも近い