

Tadeusz Olszewski, PESEL: 45081301338

wykonano biopsję węzłów chłonnych pachowych lewych - wynik do odebrania w I Klinice Chirurgii, Poradni Chorób Sutka za 10 dni. Z wynikiem badania wskazana pilna konsultacja onkologiczna w rejonie.

Chory zostaje wypisany do domu z zaleceniami jak na pierwszej stronie karty informacyjnej. Wskazana systematyczna kontrola specjalistyczna: reumatologiczna, nefrologiczna oraz pilna konsultacja onkologiczna.

Zalecenia:

1. Wskazana systematyczna kontrola reumatologiczna i nefrologiczna.
2. Konsultacja onkologiczna z wynikami badań z biopsji węzła pachowego lewego.
3. Przepisano po 2 opakowania leków:

Metypred 4 mg 1x1 tbl.
Immuran a 50 mg 1x1 tbl.
Controloc 20 mg 2x1 tbl.
Calperos 2 g 3x1 tbl.
Simvasteryl 20 mg 1x1 tbl. wieczorem
Ciprinol 250 mg 2x1 tbl. przez 5 dni

Rp.:

CALPEROS 1000 [KAPS.] 1 G = 0,4 G WAPNIA - 2 opak, 2 tabl 3x dziennie [Odpł.: 100%];
CIPRINOL [TABL. POWŁ.] 0,25 G - 1 opak, 1 tabl 2xdziennie przez 5 dni [Odpł.: 50%];
IMURAN [TABL. POWŁ.] 0,05 G - 2 opak, 1 tabl 1x dziennie rano [Odpł.: R];
METYPRED [TABL.] 0,004 G - 2 opak, 1 tabl 1x dziennie rano [Odpł.: R];
POLPRAZOL [KAPS.] 0,02 G - 2 opak, 1 tabl 2x dziennie [Odpł.: 50%];
SIMVASTEROL [TABL. POWŁ.] 0,02 G - 2 opak, 1 tabl 1x dziennie wieczorem [Odpł.: 30%];

Wyniki badań diagnostycznych, laboratoryjnych oraz konsultacji:

Badania diagnostyczne:

2014-05-29 - 87.410 -- TK - klatka piersiowa HRCT bez kontrastu dożylnego- Dane ze skierowania: Diagnostyka zmian śródmiąższowych płuc. Stan po licznych zapaleniach płuc. Amyloidozą AA nerek, PNN, RZS.

W dolnych partiach lewego płuca rozległe pasmowate zagęszczenia włókniste o charakterze bliznowato-niedodmowym, z niewielkimi zwapnieniami w obrębie zagęszczeń, ze zmniejszeniem objętości dolnego płata i pęcherzami rozedmowymi wśród zmian włóknistych, z towarzyszącym pogrubieniem opłucnej przy tylnej ścianie klatki piersiowej. Oskrzela na tym obszarze są skupione na mniejszej przestrzeni, w większości mają pogrubiałe ściany, widoczne są także rozstrzenie z pociągania. Niewielkie zmiany linijne z towarzyszącym poszerzeniem światła oskrzeli widoczne są w segmencie 3. płuca prawego. W szczycie prawego płuca niewielkie nawarstwienia opłucnej.

Poza tym płuca bez zmian naciekowych, z cechami niewielkiej rozedmy.

W obrębie śródpiersia uwidoczniono dość liczną węzły chłonne: największy węzeł przytchawiczy dolny prawy wielkości 12x18 mm uwapniony, pozostałe węzły nie przekraczają 10 mm w osi krótkiej, część z nich zawiera zwapnienia.

Tarczycę powiększoną zwłaszcza w zakresie lewego płata, niejednorodną, ze zwapnieniami.

Zwapnienia w ścianie aorty oraz w tętnicach wieńcowych.

Dość liczne, drobne zwapnienia widoczne są w obrębie śledziony i wątroby. Trzon lewego nadnercza poszerzony do 12 mm.

Prawe nadnercze prawidłowe. Śledziona dodatkowa średnicy 10 mm w okolicy wnęki śledziony.

W nadbrzuszu dość liczne węzły chłonne nieprzekraczające 10 mm w osi krótkiej.

Umiarkowane zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa.

Wnioski: Obraz zmian w płucach może odpowiadać zmianom pozapalnym, w tym swoistym.

2014-05-29 - 87.440 -- Rutynowe zdjęcia RTG klatki piersiowej - inne (pa + bok)- Rozległe włókniste zacięcia w dolnym polu płuca lewego. Niewielkie nawarstwienia opłucnej w szczycie prawym. Pozostałe pola płucne bez zmian naciekowych. Serce niepowiększone. Aorta silniej wysycona.

2014-05-30 - 89.522 -- Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)- EKG: Rytm zatokowy, miarowy ok. 85/min. Normogram.

2014-06-03 - 88.769 -- Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrz- USG JAMY BRZUSZNEJ

Wątroba z niejednorodnym echogenicznie miąższem, mnogimi rozszanymi punktowymi hiperechami o typie zwapnień widocznymi w obu płatach, niepowiększona. Rysunek naczyń wątrobowych prawidłowy. Drogi żółciowe wewnątrz- i