

## Numeri complessi

$$x_1^2 - 2x_1 + 2 = 0 \longrightarrow \underset{1=}{(1+i)^2} - 2(1+i) + 2 = 0$$


$$\underset{1=}{1 + i^2 + 2i - 2 - 2i + 2 = 0}$$

$$1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Insieme numeri complessi =  $\mathbb{C} : \left\{ \underbrace{a+ib}_{\substack{\text{numeri} \\ \text{complessi}}} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$   
 $i^2 = -1$

$z = \underbrace{a}_{\text{parte reale}} + \underbrace{ib}_{\text{parte immaginaria}}$  con  $a, b \in \mathbb{R}$   
 $\text{Re}(z) = a$   
 $\text{Im}(z) = b$   
 $z(2, 3) = (2, b)$

$\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$



Operazioni possibili:

- SOMMA

$$\begin{aligned} z_1, z_2 &\in \mathbb{C} & z_1 + z_2 & \text{(immaginare il piano di Gauss)} \\ & & & = \\ & & & (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \end{aligned}$$

props:

Commutative  $\checkmark$

associative ✓

elem. neutro :  $z_1 + 0 = 0 + z_1$  (coord  $(0,0) \rightarrow$  origine)

opposite:  $-z_1 = -2 - ib$   
 $\hookrightarrow z_1 + (-z_1) = 0$

- MOLTIPLICAZIONE

$$z_1, z_2 \in \mathcal{C}$$

$$z_1 = x_1 + iy_1 \rightarrow 2 + 3i$$

$$z_2 = x_2 + iy_2 \rightarrow 1 - i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (2+3i)(1-i) = 2 - 2i + 3i - \underbrace{3i(i)}_3$$

$$= 5+i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + iy_1x_2 + i^2y_1y_2$$

$$= \underbrace{x_1x_2 - y_1y_2}_{\text{Re}(z_1 \cdot z_2)} + i \underbrace{(x_1y_2 + y_1x_2)}_{\text{Im}(z_1 \cdot z_2)}$$

props:

props:

- commutative ✓

- associative ✓

- e./ neutro:  $1 \cdot z_1 = z_1 \cdot 1 = z_1$

- recíproco  $\frac{1}{z_1} \cdot z_1 = 1$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$  è un campo

Calcolare reciproco di un numero complesso!

$i \rightarrow \frac{1}{i} = -i$

$z_1 = 1 - 5i$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{1-5i} = \frac{1}{1-5i} \cdot \frac{1+5i}{1+5i} = \frac{1+5i}{1-(5i)^2} = \frac{1+5i}{26}$$


DIVISIONE

$z_1 = 1 - 5i$   
 $z_2 = 1 + i \rightarrow \frac{z_1}{z_2} = \frac{1-5i}{1+i} \cdot \frac{1-i}{1-i} = \frac{(1-5i)(1-i)}{1-(i)^2} = \frac{1-i-5i+5i^2}{2} = \frac{-4-6i}{2} = -2-3i$

CONIUGATO

$z_1 = a + ib$  ;  $\bar{z}_1 = a - ib$   
coniugato di  $z_1$

$a \in \mathbb{R} \quad \bar{a} = a$



$z = 1 + 2i = (1, 2)$


$\bar{z} = 1 - 2i = (1, -2)$

da dimostrare!

$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$


$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

FORMA TRIGONOMETRICA (FORMA POLARE)




$\rho = |z|$   $\rho = |z|$  - lunghezza segmento

$\theta$  theta  $\rightarrow$  argomento di  $z$   
angolo tra x e segmento OP



$z = \sqrt{3} + i$   
 $\underbrace{\quad}_{\text{Re}(\sqrt{3}), \text{Im}(1)}$   
 $|z| = \rho = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} = \sqrt{4} = 2$

$\downarrow$  condizioni  
 $\begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin(\varphi) = \frac{1}{2} \end{cases}$   
 $\downarrow$   
 $\varphi = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$



$0 \leq \varphi < 2\pi$

forma trigonometrica  $\sqrt{3} + i = 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i 2 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

## FORMULA DI EULERO

$z = x + iy \rightarrow$  rappresentazione algebrica

$= |z| (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$   
 $= \rho (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$

$0 \leq \varphi < 2\pi$


$\rho \geq 0$

$\begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases}$

$\downarrow$  forma trigonometrica

$$\rho(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = \rho e^{i\varphi}$$

ecco cosa dice Eulero!



$$z = -\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \rightarrow \text{FORMA POLARE? (PER CASA)}$$

## POTENZA

- $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$  con  $n \in \mathbb{N}$
- $|z_1^n| = |z_1|^n$
- $|z^n| = |z|^n e^{in\varphi}$

$$z_1 = \rho_1 e^{i\varphi_1} \quad \text{dove } \rho_1 = |z_1|$$

$$z_2 = \rho_2 e^{i\varphi_2} \quad \text{dove } \rho_2 = |z_2|$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (\rho_1 e^{i\varphi_1}) (\rho_2 e^{i\varphi_2}) \\ &= \rho_1 \cdot \rho_2 e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2} = \underbrace{\rho_1 \cdot \rho_2}_{|z_1| \cdot |z_2|} e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} \end{aligned}$$

$$|z_1 z_2| = \rho_1 \cdot \rho_2 = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\text{Arg}(z_1 \cdot z_2) = \varphi_1 + \varphi_2 \quad (\text{angoli si sommano!})$$

$$\bullet \quad |z^n| = |z|^n$$

↑  
dimostrazioni  
formule  
potenza

$$|z \cdot z| = |z^2| = |z|^2 \quad n \in \mathbb{N}$$

• **FORMULA DI DE MOIVRE** (importante)

$$z \in \mathbb{C} \quad \rho = |z|; \quad \varphi = \text{Arg}(z)$$

$$z^n = \rho^n \cdot e^{in\varphi}$$

forme algebrica

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} z^n &= \rho^n \cos(n\varphi) + i \rho^n \sin(n\varphi) \\ &= \rho^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) \end{aligned}$$

DIMOSTRAZIONE

$$z = \rho e^{i\varphi}$$

$$\begin{aligned} z^n &= (\rho e^{i\varphi})^n \\ &= \rho^n e^{in\varphi} \end{aligned}$$

**ESERCIZIO**

$$z = 1 + i \quad z^7 = (1 + i)^7$$


soluzione

$$|z| = \sqrt{2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\text{Arg}(z)$$

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{2} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \\ \sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 \end{cases}$$




$$z = \rho e^{i\varphi} = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$z = (\sqrt{2} \cdot e^{i\frac{\pi}{4}})^2 = \sqrt{2}^2 \cdot e^{i\frac{7}{4}\pi}$$

$$= \sqrt{2 \cdot 2^6} \cdot "$$

$$= 8\sqrt{2} e^{i\frac{7}{4}\pi}$$



$$x, y? \begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases}$$

$$x = 8\sqrt{2} \cdot \cos\left(\frac{7}{4}\pi\right)$$

$$= 8\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= 8$$

$$y = 8\sqrt{2} \cdot \sin\left(\frac{7}{4}\pi\right)$$

$$= 8\sqrt{2} \cdot -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$= -8$$

quindi

$$(1+i)^2 = 8-8i$$

Trova la soluzione a:

forma algebrica  $1+i - \frac{i}{1-2i}$  e  $(1-i)^{11}$

no pot. trova subito Re e Im      potenza, meglio forma polare

RADICI N-ESIME DI  $z \in \mathbb{C}$

dato  $w \in \mathbb{C}$  diremo che  $z \in \mathbb{C}$  è radice n-esima di  $w$  se  $z^n = w$   
e scriveremo  $z = \sqrt[n]{w}$  ( $n \in \mathbb{N}$ )

$$w = i$$

$$z^2 = i$$

$$z = \sqrt[4]{i}$$

## ① Approccio geometrico

$$z = x + iy ; z^2 = i$$

$$x, y \in \mathbb{R}$$

stessa parte imm.  
che vuole per  
essere uguali

$$(x + iy)^2 = i$$

$$x^2 - y^2 + 2xyi = i$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = 1 \end{cases}$$

$$(x-y)(x+y) = 0$$

$$\textcircled{1} (x-y) = 0 \rightarrow x = y$$

$$\textcircled{2} (x+y) = 0 \rightarrow x = -y$$

$$\begin{cases} x = y \\ 2xy = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$$

$$z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i \frac{1}{\sqrt{2}}$$

**soluzioni!!**

$$\begin{cases} x = -y \\ 2xy = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -y \\ y^2 = -\frac{1}{2} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{non esiste!!} \\ \text{soluzioni!!} \end{matrix}$$

perché


## ② Soluzione in forma polare

$$z = \sqrt[4]{i}$$

$$; z^2 = i$$

$$z = \rho e^{i\varphi}$$

$$i = 1 e^{i\frac{\pi}{2}}$$





Incognite

$$\rho \geq 0, \varphi \in [0, 2\pi[$$

$$( \rho e^{i\varphi} )^2 = e^{i\frac{\pi}{2}} \rightarrow \rho^2 e^{i2\varphi} = 1 e^{i\frac{\pi}{2}}$$

$$\bullet \rho^2 = 1 \rightarrow \rho = \pm 1 \rightarrow \rho = 1$$

$$\bullet 2\varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \text{ (importante la periodicit\`a)} \text{ con } k \in \mathbb{N}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$k=0 \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} \quad \text{1 soluzione} \rightarrow z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}$$

$$k=1 \rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{4} \quad \text{2 soluzione} \rightarrow z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

$$k=2 \rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4} + 2\pi \text{ !! non va bene, perch\`e}$$

$$z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}} \quad z_2 = e^{i\frac{5\pi}{4}}$$

$$\hookrightarrow z_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$z_2 = -\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}$$

## TEOREMA

data l'equazione  $z^n = w$ ,  $w \in \mathbb{C}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  con  $n > 1$

ci sono esattamente  $n$  soluzioni distinte in  $\mathbb{C}$ ,  $z_0, \dots, z_{n-1} \in \mathbb{C}$

$$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i\varphi_k} \text{ con } k = 0, \dots, n-1$$

$$|z_k| = \sqrt[n]{\rho} \quad \text{Arg}(z_k) = \varphi_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} \text{ dove } |w| = \rho \text{ Arg}(w) = \varphi$$

## ESEMPI (PARTE SOPRA)

1)  $z^4 - 1 = 0 \rightarrow z^4 = 1$

$w = 1$  ;  $\rho = |w| = 1$  ;  $\varphi = \text{Arg}(w) = 0$

$w = 1 \cdot e^{i \cdot 0} = 1$

$z_k = \sqrt[n]{\rho} e^{i \varphi_k}$

$k = 0, \dots, n-1$


$\varphi_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n} = \frac{\pi}{2} \cdot k \quad k = 0, \dots, 3$

$z_1 = 1 \cdot e^{i0} = 1$


$z_2 = 1 \cdot e^{i\frac{\pi}{2}} = i$

$z_3 = 1 \cdot e^{i2\frac{\pi}{2}} = e^{i\pi} = -1$

$z_4 = 1 \cdot e^{i3\frac{\pi}{2}} = e^{i\frac{3\pi}{2}} = -i$



$z^4 - 1 = 0 \xrightarrow{\text{sol}} 1, i, -1, -i \quad (-i)^4 = ((-i)^2)^2 = (-1)^2 = 1$





$|z_k| = \sqrt[n]{\rho}$

$\varphi_k = \frac{\varphi}{n} + \frac{2k\pi}{n}$



$\varphi_0 = \frac{\varphi}{n}$


$\varphi_1 = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n}$





$\arctg: \mathbb{R} \rightarrow \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$   
 $k \rightarrow \theta = \arctg(k) : \text{tg}(\theta) = k$





### ESERCIZIO

$$w = 1 + i$$

$$z \in \mathbb{C} \quad z^3 = 1 + i \quad z = \sqrt[3]{1+i}$$

$$z^n = w \rightarrow n \text{ soluzioni: } z_0, z_1, \dots, z_{n-1}$$

$$|z_k| = \sqrt[n]{|w|}$$

$$\varphi_k = \frac{\text{Arg}(w)}{n} + \frac{2\pi}{n}k \quad k = 0, \dots, n-1$$

$$|w| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$$

$$z_w : \begin{cases} x = \rho \cos(\varphi) \\ y = \rho \sin(\varphi) \end{cases} \begin{cases} \cos(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$= \varphi_w = \frac{\pi}{4}$$

$$\varphi_k = \frac{\varphi_w}{3} + \frac{2\pi}{3}k \quad \checkmark k=0,1,2$$


$$\varphi_0 = \frac{\pi}{12} = 15^\circ$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{12} + \frac{2}{3}\pi = \frac{3}{4}\pi$$

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{12} + \frac{4}{3}\pi$$

radici cubiche  $\nearrow$

$$|z| = \sqrt[3]{|w|} = \sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2} = 2^{\frac{1}{6}}$$



si ottiene un triangolo equilatero

### Teorema fondamentale dell'algebra

un eq polinomiale di grado  $n$  in campo complesso ha esattamente  $n$  soluzioni contate con le loro molteplicità

$$z^3 = 0 = (3 \text{ soluzioni})$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ z \cdot 0 \cdot z \quad 0 \cdot z \cdot z \quad z \cdot z \cdot 0 \end{array}$$

$$z^2 - (4+i)z + 4+2i = 0$$

$$1) \quad z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{4+i \pm \sqrt{(4+i)^2 - 4(4+2i)}}{2}$$

$$2) \quad z = x+iy \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$(x+iy)^2 - (4+i)(x+iy) + 4+2i = 0$$

$$x^2 - y^2 + 2xyi - 4x - 4iy - ix + y + 4 + 2i = 0$$

$$x^2 - y^2 - 4x + y + 4 + i(2yx - 4y - x + 2) = 0$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 4x + y + 4 = 0 \\ 2yx - 4y - x + 2 = 0 \end{cases}$$

$$2y(x-2) - (x-2) = (x-2)(2y-1) = 0$$

$$1) \quad \begin{array}{l} x-2=0 \quad x=2 \\ 4-y^2-8+y+4=0 \end{array}$$

$$2) \quad y = \frac{1}{2}$$

una sola che soluzioni!!

EQ. Algebriche (polinomizli)

EQ. NON Algebriche

$$z^2 + i \operatorname{Im}(z) + 2\bar{z} = 0$$

← problema

$$z = x + iy \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$(x + iy)^2 + iy + 2(x - iy) = 0$$

$$x^2 - y^2 + 2xyi + iy + 2x - 2iy = 0$$

$$x^2 - y^2 + 2x + i(2xy + y - 2y) = 0$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2x = 0 \\ 2xy - y = 0 \end{cases}$$

$$y(2x - 1) = 0$$

$$\textcircled{1} y = 0$$

$$\textcircled{2} x = \frac{1}{2}$$

oppure

$$x^2 + 2x = 0$$

$$x(x + 2) = 0$$

$$x = 0$$

$$x = -2$$

$$1.1 \quad z_1 = 0$$

$$1.2 \quad z_1 = -2$$

$$\frac{1}{4} - y^2 + 1 = 0$$

$$\frac{5}{4} - y^2 = 0$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$2.1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}i$$

$$2.2 = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}i$$