

# Esercizi Unità 1

## Analisi dei dati 2023/24

Cristiano Varin

1. Si consideri un campione casuale semplice di dimensione  $n$  da una variabile casuale di media  $\mu$  e varianza pari a 3. Si consideri il seguente stimatore di  $\mu$ :

$$T = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n X_i,$$

Si calcolino la distorsione e la varianza dello stimatore e si dica se si tratta di uno stimatore consistente.

**Soluzione.** La distorsione di  $T$  è

$$\text{Bias}(T) = E(T) - \mu = \frac{n}{n-2}\mu - \mu = \frac{2\mu}{n-2}.$$

La varianza di  $T$  è

$$\text{Var}(T) = \frac{3n}{(n-2)^2}.$$

Lo stimatore è consistente perché la sua distorsione e la sua varianza convergono a zero al crescere della dimensione campionaria.

2. Si consideri un campione casuale semplice di dimensione tre da una popolazione con valore atteso  $\mu$  e varianza unitaria. Si considerino i seguenti stimatori di  $\mu$ :

$$T_1 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3 \quad \text{e} \quad T_2 = \bar{X},$$

Si dica quale dei due stimatori è preferibile (la risposta va motivata).

**Soluzione.** Entrambi gli stimatori hanno valore atteso pari a  $\mu$  e quindi sono non distorti. Le varianze dei due stimatori sono

$$\text{Var}(T_1) = \frac{6}{16}, \quad \text{Var}(T_2) = \frac{1}{3},$$

quindi lo stimatore  $T_2$  è preferibile.

3. Si consideri un campione casuale semplice  $(X_1, X_2, X_3)$  da una variabile di Poisson con media  $\lambda > 0$ . Si considerino i due stimatori di  $\lambda$ :

$$T_1 = \frac{2X_1 + X_2/2 + X_3}{5} \quad \text{e} \quad T_2 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{4}.$$

Si dica quale dei due stimatori è preferibile (la risposta va motivata).

**Soluzione.** I valori attesi dei due stimatori sono

$$E(T_1) = \frac{7}{10}\lambda, \quad E(T_2) = \frac{3}{2}\lambda.$$

Quindi, entrambi gli stimatori sono distorti

$$\text{Bias}(T_1) = -\frac{3}{10}\lambda, \quad \text{Bias}(T_2) = \frac{\lambda}{2}$$

Le varianze dei due stimatori sono

$$\text{Var}(T_1) = \frac{21}{100}\lambda, \quad \text{Var}(T_2) = \frac{14}{16}\lambda,$$

da cui segue che gli errori quadratici medi dei due stimatori sono

$$\text{MSE}(T_1) = \frac{9}{100}\lambda^2 + \frac{21}{100}\lambda, \quad \text{MSE}(T_2) = \frac{\lambda^2}{4} + \frac{14}{16}\lambda.$$

La differenza fra i due errori quadratici medi è

$$\begin{aligned} \text{MSE}(T_2) - \text{MSE}(T_1) &= \lambda \left\{ \left( \frac{1}{4} - \frac{9}{100} \right) \lambda + \frac{14}{16} - \frac{21}{100} \right\} \\ &= \lambda(0.16\lambda + 0.665) \end{aligned}$$

Siccome la differenza dei due errori quadratici medi è positiva per qualsiasi valore ammissibile di  $\lambda$ , concludiamo che lo stimatore  $T_1$  è preferibile.

4. Siano  $T_1$  e  $T_2$  due stimatori indipendenti tali che  $E(T_1) = E(T_2) = \theta$ ,  $\text{Var}(T_1) = \sigma_1^2 > 0$  e  $\text{Var}(T_2) = \sigma_2^2 > 0$ . Si consideri la combinazione lineare dei due stimatori

$$T_3 = aT_1 + (1-a)T_2, \quad a \in [0, 1].$$

Si calcoli il valore di  $a$  per cui l'errore quadratico medio di  $T_3$  è il più piccolo possibile.

**Soluzione.** Lo stimatore  $T_3$  è ovviamente non distorto visto che

$$E(T_3) = aE(T_1) + (1-a)E(T_2) = \theta.$$

L'errore quadratico medio di  $T_3$  quindi coincide con la sua varianza

$$\text{Var}(T_3) = a^2\text{Var}(T_1) + (1-a)^2\text{Var}(T_2) = a^2\sigma_1^2 + (1-a)^2\sigma_2^2.$$

Per cercare il valore di  $a$  che minimizza  $\text{Var}(T_3)$  ne calcoliamo la derivata prima

$$\frac{d}{da}\text{Var}(T_3) = 2a\sigma_1^2 - 2(1-a)\sigma_2^2$$

e la poniamo pari a zero

$$\frac{d}{da}\text{Var}(T_3) = 0 \longleftrightarrow \hat{a} = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}.$$

Il valore  $\hat{a}$  è il punto di minimo di  $\text{Var}(T_3)$  visto che la sua derivata seconda vale è una funzione positiva:

$$\frac{d^2}{da^2}\text{Var}(T_3) = 2\sigma_1^2 + 2\sigma_2^2 > 0.$$

5. Sia  $X$  un campione casuale di dimensione uno da una variabile casuale di Poisson con media  $\lambda > 0$ . Si considerano i due stimatori di  $\lambda$  :

$$T_1 = X \quad \text{e} \quad T_2 = 1.$$

Si calcolino i valori di  $\lambda$  per cui lo stimatore  $T_2$  è preferibile allo stimatore  $T_1$ .

**Soluzione.** La distorsione dei due stimatori è

$$\text{Bias}(T_1) = 0 \quad \text{e} \quad \text{Bias}(T_2) = (1 - \lambda),$$

mentre la varianza è

$$\text{Var}(T_1) = \lambda \quad \text{e} \quad \text{Var}(T_2) = 0.$$

Quindi, l'errore quadratico medio dei due stimatori è

$$\text{MSE}(T_1) = \lambda \quad \text{e} \quad \text{MSE}(T_2) = (1 - \lambda)^2.$$

Lo stimatore  $T_2$  è preferibile allo stimatore  $T_1$  se

$$(1 - \lambda)^2 < \lambda,$$

ovvero se

$$\lambda^2 - 3\lambda + 1 < 0,$$

che corrisponde a

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2} < \lambda < \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

6. Sia  $X_1, \dots, X_n$  un campione casuale semplice da una variabile casuale con media  $\mu$  e varianza  $\sigma^2 > 0$ . Si costruisca uno stimatore non distorto di  $\gamma = \mu^2$ .

**Soluzione.** Sappiamo che

$$\begin{aligned} \frac{\sigma^2}{n} &= \text{Var}(\bar{X}) \\ &= E(\bar{X}^2) - \{E(\bar{X})\}^2 \\ &= E(\bar{X}^2) - \mu^2, \end{aligned}$$

ovvero

$$E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2.$$

Quindi, uno stimatore non distorto di  $\gamma = \mu^2$  è

$$\hat{\gamma} = \frac{S}{n} - \bar{X}^2,$$

infatti

$$\begin{aligned} E(\hat{\gamma}) &= E\left(\frac{S}{n}\right) - E(\bar{X}^2) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \\ &= \mu^2. \end{aligned}$$

7. Sia  $X_1, \dots, X_n$  un campione casuale semplice da una variabile casuale uniforme nell'intervallo  $(0, \theta)$ , ovvero con densità

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 1/\theta, & \text{se } 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

per un qualche parametro ignoto  $\theta > 0$ . Si consideri lo stimatore  $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ .

- (a) Si calcoli la distorsione di  $\hat{\theta}$ .
- (b) Si valuti la consistenza di  $\hat{\theta}$ .

**Soluzione.**

- (a) Il valore atteso dello stimatore è  $E(\hat{\theta}) = E(2\bar{X}_n) = 2E(X_1)$ . Siccome

$$E(X_1) = \int_0^\theta \frac{x}{\theta} dx = \frac{\theta}{2}$$

allora abbiamo che  $E(\hat{\theta}) = \theta$ , cioè lo stimatore è non distorto.

- (b) Secondo la 'Legge dei grandi numeri' abbiamo che

$$\bar{X} \xrightarrow{p} E(X_1) = \frac{\theta}{2}, \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Siccome  $\hat{\theta}$  è una trasformazione continua di  $\bar{X}$  abbiamo che

$$\hat{\theta} = g(\bar{X}) \xrightarrow{p} g\{E(X_1)\} = 2\frac{\theta}{2} = \theta, \quad \text{per } n \rightarrow \infty,$$

ovvero  $\hat{\theta}$  è uno stimatore consistente di  $\theta$ .

Alternativamente, la consistenza dello stimatore si può verificare controllando che la varianza dello stimatore converge a zero al crescere della dimensione campionaria, come mostrato nel seguito. La varianza dello stimatore è

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}(2\bar{X}_n) = \frac{4}{n} \text{Var}(X_1).$$

Resta da calcolare  $\text{Var}(X_1)$ :

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_1) &= E(X_1^2) - E(X_1)^2 \\ &= E(X_1^2) - \frac{\theta^2}{4} \\ &= \int_0^\theta \frac{x^2}{\theta} dx - \frac{\theta^2}{4} \\ &= \frac{\theta^2}{3} - \frac{\theta^2}{4} \\ &= \frac{\theta^2}{12}. \end{aligned}$$

Quindi la varianza dello stimatore è

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{4}{n} \frac{\theta^2}{12} = \frac{\theta^2}{3n}$$

quantità che converge a zero al divergere di  $n$ .

8. Sia  $X_1, \dots, X_n$  un campione casuale semplice da una variabile casuale discreta con funzione di probabilità:

$$\Pr(X = x; \theta) = \begin{cases} 1/2, & \text{se } x = -1, \\ (1 - \theta)/2, & \text{se } x = 0, \\ \theta/2, & \text{se } x = 1, \end{cases}$$

per un qualche parametro ignoto  $\theta \in [0, 1]$ . Si consideri lo stimatore  $\hat{\theta} = 2\bar{X} + 1$ .

- (a) Si calcoli la distorsione di  $\hat{\theta}$ .
- (b) Si valuti la consistenza di  $\hat{\theta}$ .

**Soluzione.**

- (a) Il valore atteso di  $X_1$  è

$$E(X_1) = -1 \left( \frac{1}{2} \right) + 0 \left( \frac{1 - \theta}{2} \right) + 1 \left( \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta - 1}{2}.$$

Quindi, il valor atteso di  $\hat{\theta}$  è

$$E(\hat{\theta}) = 2E(X_1) + 1 = \theta,$$

ovvero  $\hat{\theta}$  è non distorto.

- (b) Utilizzando la ‘Legge dei grandi numeri’ e le proprietà delle trasformazioni continue delle variabili casuali verifichiamo immediatamente la consistenza di  $\hat{\theta}$ :

$$\hat{\theta} = g(\bar{X}) \xrightarrow{p} g\{E(X_1)\} = 2E(X_1) + 1 = \theta, \quad \text{per } n \rightarrow \infty.$$

Alternativamente possiamo provare la consistenza dello stimatore non distorto  $\hat{\theta}$  verificando che la sua varianza converge a zero. La varianza di  $X_1$  è

$$\text{Var}(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = E(X_1^2) - \frac{(\theta - 1)^2}{4}.$$

Siccome

$$E(X_1^2) = -1^2 \left( \frac{1}{2} \right) + 0^2 \left( \frac{1 - \theta}{2} \right) + 1^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) = \frac{\theta + 1}{2},$$

abbiamo che

$$\text{Var}(X_1) = \frac{\theta + 1}{2} - \frac{(\theta - 1)^2}{4} = \frac{-\theta^2 + 4\theta + 1}{4}.$$

Quindi la varianza di  $\hat{\theta}$  è

$$\text{var}(\hat{\theta}) = \frac{4}{n} \text{var}(X_1) = \frac{-\theta^2 + 4\theta + 1}{n},$$

quantità che converge a zero al crescere della dimensione campionaria.

9. Si risolva l'esercizio 8.3 del libro di testo Baron (2014, pagina 234).

**Soluzione.** Abbiamo che

$$\begin{aligned}\Pr(X \geq 127.78) &= \Pr(X - 48.23 \geq 127.78 - 48.23) \\ &\leq \Pr\left(\frac{|X - 48.23|}{26.52} \geq \frac{79.55}{26.52}\right) \\ &= \Pr\left(\frac{|X - 48.23|}{26.52} \geq 3\right) \\ &\leq \frac{1}{9}\end{aligned}$$

10. Sia  $X_1, \dots, X_n$  un campione casuale semplice da una variabile casuale con funzione di densità

$$f(x; \theta) = 2\theta^2 x^{-3}, \quad \text{per } x > \theta \text{ e } \theta > 0.$$

Si consideri lo stimatore  $\hat{\theta} = \bar{X}/2$ .

- (a) Si calcoli la distorsione di  $\hat{\theta}$ .
- (b) Si calcoli l'errore standard di  $\hat{\theta}$ .
- (c) Si valuti la consistenza di  $\hat{\theta}$ .

**Soluzione.**

- (a) Il valore atteso di  $X_1$  è

$$E(X_1) = \int_{\theta}^{\infty} 2\theta^2 x^{-2} dx = 2\theta$$

Quindi lo stimatore  $\hat{\theta}$  è non distorto poiché

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}/2) = E(X_1/2) = \theta.$$

- (b) La varianza dello stimatore è pari a

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{1}{4n} \text{Var}(X_1).$$

Dobbiamo valutare  $\text{Var}(X_1)$ :

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_1) &= E(X_1^2) - E(X_1)^2 \\ &= E(X_1^2) - 4\theta^2 \\ &= \int_{\theta}^{\infty} 2\theta^2 x^{-1} dx - 4\theta^2\end{aligned}$$

Siccome l'integrale è divergente, la varianza non è finita e quindi l'errore standard di  $\hat{\theta}$  non esiste finito.

- (c) Siccome la varianza non è finita, lo stimatore non è consistente.