

# Föreläsning 7: Dyck-stigar och Catalanal · 1MA020

Vilhelm Agdur<sup>1</sup>

<sup>1</sup> vilhelm.agdur@math.uu.se

14 februari 2023

Vi introducerar Dyck-stigar, och härleder en rekursion för deras antal. Sedan använder vi rekursionen för att hitta en genererande funktion, och använder genererande funktionen för att ge en explicit formel för deras antal.

Efter det ger vi ett kombinatoriskt bevis för vår formel för antalet Dyck-stigar, som är betydligt kortare.

Slutligen ger vi två till exempel på saker som räknas av Catalanalen.

## Dyck-stigar

**Definition 1.** En gitterstig på  $\mathbb{Z}^2$  av längd  $n$  mellan  $a$  och  $b$  börjar i punkten  $a$  och tar sig sedan till punkten  $b$  med  $n$  stycken steg, som kan vara upp, ner, höger, eller vänster.<sup>2</sup>



<sup>2</sup> Vi kan betrakta en sådan stig som ett ord av längd  $n$  ur alfabetet  $\{U, N, H, V\}$ , tillsammans med en startpunkt.

Figur 1: En gitterstig av längd 28 från  $(0,0)$  till  $(2,8)$ .

Det finns uppenbarligen  $4^n$  gitterstigar av längd  $n$  med en given startpunkt, om vi inte kräver att den skall sluta i någon given punkt.

**Definition 2.** En uppåt-höger-stig på  $\mathbb{Z}^2$  från  $a$  till  $b$  är en gitterstig mellan  $a$  och  $b$  som enbart tar steg uppåt och åt höger.<sup>3</sup>

Notera att till skillnad från allmänna gitterstigar bestäms en uppåt-höger-stigs längd av dess start och slutpunkt, eftersom den inte kan ta några omvägar eller gå baklänges. En stig från  $(0,0)$  till  $(a,b)$  kommer alltid att ta precis  $a$  steg uppåt och  $b$  steg till höger, det enda som kan variera är i vilken ordning stegen tas.

Alltså ges det totala antalet uppåt-höger-stigar från  $(0,0)$  till  $(a,b)$  av  $\binom{a+b}{a}$ , eftersom det är antalet sätt att välja de  $a$  ställen vi tar ett steg höger av totalt  $a+b$  steg.

<sup>3</sup> I tolkningen av stigar som ord är alltså dessa ord ur det mindre alfabetet  $\{U, H\}$ .

**Definition 3.** En Dyck-stig av längd  $2n$  är en uppåt-höger-stig från  $(0,0)$  till  $(n,n)$  som aldrig går under diagonalen.



Figur 2: En uppåt-höger-stig från  $(0,0)$  till  $(8,8)$  av längd sexton.



Figur 3: En Dyck-stig av längd sexton.

Notera att en Dyck-stig alltid måste börja med ett steg uppåt och sluta med ett steg åt höger, eftersom den annars ju hade varit under diagonalen.

Hur många Dyck-stigar finns det av varje given längd? Vi kan använda vår observation om att de alltid börjar med ett upp-steg för att ge en rekursion för detta antal:

**Lemma 4.** Låt  $d_n$  beteckna antalet Dyck-stigar av längd  $2n$ . Då gäller det för alla  $n \geq 0$  att

$$d_{n+1} = \sum_{k=0}^n d_k d_{n-k}$$

och  $d_0 = 1$ .<sup>4</sup>

*Bevis.* Överväg en Dyck-stig av längd  $2(n+1)$ . Vi kan dela upp den i två kortare Dyck-stigar som följer: Den börjar med ett upp-steg, som vi färgar grått. Sedan fortsätter den i ett tag tills den träffar diagonalen för första gången. Vi färgar alla steg innan det steg i vilken den träffar diagonalen röda, och steget i vilken den träffar diagonalen grått. Sedan färgar vi resten av stegen blåa.

Vi hävdar att de blå stegen utgör en Dyck-stig av längd  $2k$  för något  $0 \leq k \leq n$ , och de röda stegen utgör en Dyck-stig av längd  $2(n-k)$ , så att vi tillsammans med de två gråa stegen har totalt

<sup>4</sup> Antalet ord av längd noll anser vi vara ett, eftersom det bara finns ett sätt att välja ett sådant.



Figur 4: En illustration av vår uppdelning av en Dyck-stig i gråa, blåa, och röda steg.

$2k + 2(n - k) + 2 = 2(n + 1)$  steg. Ekvivalent, i tolkningen av stigar som ord, så säger vi att ordet för stigen vi började med kan skrivas som

$$Uw_1Hw_2$$

för två kortare<sup>5</sup> Dyck-stigar  $w_1$  och  $w_2$ .

<sup>5</sup> Det är tillåtet att de är av längd noll.

Vi kan välja  $k$  fritt mellan 0 och  $n$ , och vi kan sedan välja våra två kortare Dyck-stigar helt fritt så länge de har rätt längd, så multiplikations- och additionsprincipen ger oss att vi kan totalt välja på

$$\sum_{k=0}^n d_k d_{n-k}$$

sätt, vilket är vad vi ville bevisa.  $\square$

Den uppmärksamme bland er kanske redan känt igen att den här rekursionen säger något om en faltning – specifikt säger den att

$$d_{n+1} = (d * d)_n,$$

vilket ser ut som något vi borde kunna använda för att räkna ut genererande funktionen av den här följd.

**Proposition 5.** Den genererande funktionen för  $\{d_k\}_{k=0}^\infty$ , antalet Dyck-stigar, är

$$F_d(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

*Bevis.* Vi observerar att Lemma 4 ger oss att för alla  $n \geq 0$

$$d_{n+1} = (d * d)_n,$$

så om vi tar genererande funktioner av bägge sidorna ser vi att vänster led blir

$$\sum_{n=0}^{\infty} d_{n+1} x^n = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} d_n x^n = \frac{F_d(x) - 1}{x}$$

och höger led blir

$$F_{d*d}(x) = F_d(x)^2$$

så att vi har att

$$F_d(x) = xF_d(x)^2 + 1.$$

Det här är ju bara en vanlig andragradsekvation som vi kan lösa för  $F_d$ , och få att

$$F_d(x) = \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x}.$$

Det enda som återstår är att se om den rätta lösningen har ett plus- eller minustecken. Sättet vi ser detta på är att vi vet vad den skall ta för värde i en specifik punkt – vi kan ju nämligen räkna att

$$F_d(0) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k 0^k = d_0 = 1$$

så funktionen måste vara ett i noll.

En snabb räkning ger oss att

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = 1$$

emedan gränsvärdet

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x}$$

inte existerar. Alltså måste den korrekta lösningen vara med minustecknet, såsom önskat.  $\square$

Så, hittills har vi definierat våra Dyck-stigar, listat ut en rekursion för deras antal, och använt denna rekursion för att härleda en genererande funktion. Kan vi använda denna genererande funktion för att härleda en explicit formel för antalet Dyck-stigar?

Svaret på den frågan är ja, men det kräver ett lemma vi inte sett ännu.

*Newtons binomialsats, och en explicit formel för  $d_n$*

**Definition 6.** För varje  $x \in \mathbb{R}$  och varje  $k \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$  ges den fallande fakulteten  $x^{\underline{k}}$  av<sup>6</sup>

$$x^{\underline{k}} = x(x-1)(x-2) \dots (x-k+1)$$

och den stigande fakulteten  $x^{\overline{k}}$  av

$$x^{\overline{k}} = x(x+1)(x+2) \dots (x+k-1).$$

Om  $x$  är ett heltal ges alltså  $x^{\underline{k}}$  av  $\frac{x!}{k!}$  och  $x^{\overline{k}}$  av  $\frac{(x+k-1)!}{(x-1)!}$ .

<sup>6</sup> Så produkten har  $k$  termer. I fallet med  $k = 0$  får vi en tom produkt, vilket vi konventionellt anser är ett, så  $x^{\underline{0}} = x^{\overline{0}} = 1$  för alla  $x$ .

Vi kan särskilt notera att när  $x$  är ett heltal ges antalet permutationer av längd  $k$  ur ett alfabet med  $x$  bokstäver alltså av  $x^k$ , och således har vi också att

$$\binom{x}{k} = \frac{x^k}{k!}$$

för alla heltal  $x$  och  $k$ . Men detta uttrycket är ju helt väldefinierat även om  $x$  inte är ett heltal, vilket motiverar oss att göra följande definition:

**Definition 7.** För alla  $x \in \mathbb{R}$  och  $k \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$  säger vi att

$$\binom{x}{k} = \frac{x^k}{k!}.$$

Anledningen att vi gör allt detta arbetet är att det låter oss generalisera binomialsatsen även till potenser som inte är heltal, såsom Newton upptäckte.

**Teorem 8** (Newtons binomialsats). För alla  $x$  och  $y$  och  $r \in \mathbb{R}$  gäller det att

$$(x + y)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^{r-k} y^k$$

*Bevis.* Taylorutveckla.<sup>7</sup>

□

<sup>7</sup> Ett bevis återfinns lätt med google, men eftersom det inte egentligen har något med kombinatorik att göra utelämnar vi det i denna kursen.

Låt oss nu tillämpa vår nya kunskap på Dyckstigar. Eftersom den genererande funktionen vi fann för deras antal involverade en kvadratroten kommer vi ju vilja tillämpa Newtons binomialsats i fallet med  $r = \frac{1}{2}$ , så låt oss börja med ett lemma om vad som händer i just det fallet.

**Proposition 9.** Antalet Dyck-stigar av längd  $2n$ ,  $d_n$ , ges av

$$d_n = 2(-1)^{n+1} \binom{1/2}{n+1} 4^n.$$

*Bevis.* Vi vet att den genererande funktionen för denna följd ges av

$$F_d(x) = \sum_{k=0}^{\infty} d_k x^k = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

så vi behöver serieutveckla detta uttryck.

Newtons binomialsats säger oss att

$$\sqrt{1+y} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{1/2}{k} y^k$$

så om vi sätter in  $y = -4x$  får vi att

$$\sqrt{1-4x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{1/2}{k} 4^k x^k.$$

När  $k = 0$  så blir  $\binom{1/2}{0} = \frac{(1/2)_0}{0!} = \frac{1}{1}$ , och alltså är hela nollte termen lika med ett. Så alltså gäller det att

$$\begin{aligned}\frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x} &= \frac{\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \binom{1/2}{k} 4^k x^k}{2x} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2(-1)^k \binom{1/2}{k} 4^{k-1} x^{k-1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} 2(-1)^{k+1} \binom{1/2}{k+1} 4^k x^k\end{aligned}$$

vilket genom att jämföra koefficienter ger oss resultatet.  $\square$

Så vi har hittat *en* formel, men den är inte särskilt vacker. Även om vi intellektuellt vet att den borde ge oss heltal är det inte alls uppenbart, med den fraktionella binomialkoefficienten och allt.

Kan vi hitta en vackrare formel? Svaret är ja, och det finns flera sätt för oss att göra det. Om vi hade haft mer uthållighet med krångliga räkningar hade vi kunna bevisa följande lemma, vilket låter oss förenkla uttrycket vi fick i Proposition 9:

**Lemma 10.** *Det gäller att*

$$\binom{1/2}{n} = \frac{(-1)^{n+1}}{4^n(2n-1)} \binom{2n}{n}.$$

*Bevis.* Utelämnas. Om du verkligen vill se en räkning för detta finns det ett bevis för något snarlikt, som borde gå att förenkla till detta, på stackexchange.<sup>8</sup>  $\square$

När vi tagit detta Lemma 10 och stoppat in det i Proposition 9 får vi följande mycket vackrare formel:

**Teorem 11.** *Antalet Dyck-stigar  $d_n$  ges av*

$$d_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}.$$

*I själva verket är dessa tal så viktiga att de har sitt egna namn – de kallas för Catalan-talen.*

Så vi har till slut hittat en fin formel för antalet Dyck-stigar, och alltså för Catalantalerna. Tyvärr var vägen vi tog dit väldigt lerig, i botten på en hopväxt och snårig dal. Finns det ett mindre kladdigt sätt att hitta denna formel?<sup>9</sup>

### *Ett kombinatoriskt bevis för formeln för Catalantalerna*

*Ett kombinatoriskt bevis av Teorem 11.* Låt oss överväga samlingen av alla uppåt-höger-stigar från  $(0,0)$  till  $(n,n)$ . Vi kallar varje stig som

<sup>8</sup> Brian M. Scott  
(<https://math.stackexchange.com/users/12042/brian-m-scott>). Binomial coefficients  $\binom{1/2}{k}$ . Mathematics Stack Exchange, 2020. URL <https://math.stackexchange.com/q/340141>. URL:<https://math.stackexchange.com/q/340141> (version: 2020-03-27)

<sup>9</sup> Vårt arbete med att ta fram denna formel för antalet Dyck-stigar illustrerar både för- och nackdelarna med metoden med genererande funktioner. Det är en pålitlig metod, med tydliga steg för vad vi vill göra – efter att vi hittade rekursionen vi började med behövde vi aldrig egentligen vara kreativa, utan vi kom fram till målet genom att bara följa vårt recept.

Å andra sidan kan räkningarna man behöver göra för att tillämpa metoden vara väldigt fula. Vad man köper i standardisering får man betala för i begriplighet – det är nog svårt att säga att man begriper *varför* den formeln ger Catalantalerna efter att ha sett vårt bevis.

passerar under diagonalen för en *dålig* stig – mängden av sådana är uppenbarligen komplementet till mängden av Dyck-stigar. Så om vi kan räkna de dåliga stigarna får vi också antalet Dyck-stigar, eftersom vi vet att det totala antalet uppåt-höger-stigar från  $(0,0)$  till  $(n,n)$  är precis  $\binom{2n}{n}$ .

Sättet vi räknar antalet dåliga stiggar är att påvisa en bijektion mellan dem och mängden av uppåt-höger-stigar från  $(0,0)$  till  $(n+1, n-1)$ .



Figur 5: En av våra dåliga stiggar, huvuddiagonalen i blått och första diagonalen i rött. Punkten där stigen träffar den första underdiagonalen markeras med en cirkel.

Givet en dålig stig markerar vi första punkten på vilken den träffar första underdiagonalen, alltså diagonalen under huvuddiagonalen. Att det måste finnas en sådan punkt följer av att stigen är dålig – om den aldrig träffade den underdiagonalen vore stigen en Dyckstig.

Sedan speglar vi resten av stigen, efter punkten vi markerade, i första underdiagonalen. Vi ersätter alltså varje steg uppåt med ett steg till höger, och varje steg till höger med ett steg uppåt.



Figur 6: Den uppåt-höger-stig från  $(0,0)$  till  $(n+1, n-1)$  som motsvarar vår dåliga stig i förra figuren. Stigen är grå fram tills punkten där vi började spegla den och fortsätter sedan i blått. Originalstigen fortsätter i grått.

Eftersom vi i punkten vi började spegla just träffat första underdiagonalen så måste vi i den punkten ha haft ett steg mer åt höger än uppåt. Totalt har vi, i originalstigen, lika många steg uppåt som åt höger, så återstoden av den efter den punkten måste ha ett steg mer uppåt än åt höger.

När vi speglar blir varje steg uppåt ett åt höger, och vice versa, så vår speglade stig måste ha ett steg mer åt höger än uppåt också i biten efter speglingen. Alltså måste den resulterande stigen efter speglingen ha två steg fler åt höger än uppåt, och alltså hamna i  $(n+1, n-1)$ .<sup>10</sup>

Så vi har hittat ett sätt att skicka en dålig stig på en stig från  $(0,0)$  till  $(n+1, n-1)$ . För att detta skall vara en bijektion måste processen vara reversibel - givet en stig från  $(0,0)$  till  $(n+1, n-1)$  måste vi kunna återskapa den motsvarande dåliga stigen.

Sättet vi gör det på är samma som innan - vi hittar första punkten i vilken vår stig träffar första underdiagonalen, och speglar efter den. Att en sådan punkt måste finnas är uppenbart, eftersom  $(0,0)$  ligger ovanför den underdiagonalen, och  $(n+1, n-1)$  ligger under den. Så för att ta oss från ena sidan av den till andra måste vi passera den.

Att denna spegling kommer ge oss rätt dåliga stig är enkelt att se - allt vi gjort är att spegla två gånger, vilket så klart inte gör någonting.

Alltså har vi bevisat att antalet dåliga stigar är lika med antalet stigar från  $(0,0)$  till  $(n+1, n-1)$ . Vi vet att det finns  $\binom{(n+1)+(n-1)}{n+1}$  sådana stigar, så vi kan räkna att

$$\begin{aligned} d_n &= |\text{stigar } (0,0) \rightarrow (n,n)| - |\text{dåliga stigar}| \\ &= \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} \\ &= \frac{(2n)!}{n!n!} - \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} \\ &= (2n)! \left( \frac{(n+1)}{(n+1)!n!} - \frac{n}{(n+1)!n!} \right) \\ &= \frac{(2n)!}{(n+1)!n!} = \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{n!n!} = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} \end{aligned}$$

vilket bevisar satsen. □

Så vårt kombinatoriska bevis undvek helt att behöva fundera på rekursioner och genererande funktioner. Det är en mycket mer direkt rutt till vårt mål, men vi missade några sevärdheter längs vägen.<sup>11</sup>

### *Fler saker som räknas av Catalantalen*

Som vi nämnde tidigare är Catalantalen viktiga eftersom de räknar fler saker än bara just Dyck-stigar. I nästa föreläsning kommer vi

<sup>10</sup> I symboler har vi  $u_i$  steg uppåt i stigen innan punkten vi speglar efter, och  $h_i$  steg åt höger. Efter punkten vi speglar efter har vi  $u_e$  steg uppåt och  $h_e$  steg åt höger. Så i Figur 5 så har vi  $u_i = 3$ ,  $h_i = 4$ ,  $u_e = 5$ , och  $h_e = 4$ .

Så för stigen vi börjar med har vi  $h_i = u_i + 1$ , och  $h_i + h_e = n$  samt  $u_i + u_e = n$  för att den skall sluta i  $(n,n)$ . Stigen efter speglingen kommer att ha  $h_i + u_e$  steg åt höger och  $u_i + h_e$  steg uppåt. Om man arbetar sig igenom dessa ekvationer kommer man att se att vi verkligen har  $n+1$  steg åt höger och  $n-1$  steg uppåt i den reflekterade stigen.

<sup>11</sup> Hur man hade härlett vår rekursion eller den genererande funktionen givet bara vad vi lärde oss i det kombinatoriska beviset är långt ifrån uppenbart.



se ett viktigt exempel. Nu, i slutet på denna, tar vi några mindre exempel.

**Exempel 12.** Antalet sätt att skriva  $2n$  matchande parenteser räknas av Catalanantalen. Med matchande parenteser menar vi alltså ett uttryck som  $((()()))((()))$  – och i ett uttryck som  $)((($  matchar de inte. Varje  $($  måste ha en motsvarande  $)$  senare i ordet, och varje  $)$  måste ha ett matchande  $($  senare i ordet.

Hur bevisar vi att detta räknas av Catalanantalen? Jo, vi ser att detta lyder samma rekursion som Dyck-stigarna gjorde. Varje uttryck med matchande parenteser måste börja med  $($ , och denna första startparentes måste matcha en slutparentes. Det som står inom dessa parenteser måste också vara ett matchande uttryck, och likaså det som står efter slutparentesen som matchar första parentes.

Alltså kan vi skriva varje uttryck med matchande parenteser på formen  $(w_1)w_2$ , med  $w_1$  och  $w_2$  två kortare matchande uttryck. Det här är precis samma uppdelning som vi hade för våra Dyckstigar, så det kommer ge samma rekursion, och alltså är det samma följd.<sup>12</sup>

**Exempel 13.** Det problem som ursprungligen fick upp matematikers intresse i väst<sup>13</sup> för Catalanantalen var att dela upp en konvex polygon med  $n + 2$  sidor i trianglar, genom att rita streck mellan hörnen som inte korsar varandra.



Det här problemet studerades först av Euler<sup>14</sup>, och beviset att de räknas av Catalanantalen utvecklades av Segner, Goldbach, och Lamé. Vår rekursion för Catalanantalen brukar kallas för Segnerrekursionen.

Senare studerades problemet med parentetiseringar av Eugène Charles Catalan, efter vilken talen fick sitt namn på femtiotalet.

## Övningar

**Övning 1.** Hur många gitterstigar av längd  $n$  från  $(0,0)$  till  $(a,b)$  finns det?

**Övning 2.** Bevisa att antalet uppdelningar av en konvex polygon med  $n + 2$  sidor i trianglar, såsom vi diskuterade i Exempel 13, räknas av Catalanantalen.<sup>15</sup>

**Övning 3.** Betrakta mängden av följder av heltal av längd  $n$ , som

<sup>12</sup> Vi hade också, vilket kanske vore enklare, helt enkelt kunnat se att det finns en bijektion mellan matchande uttryck med parenteser och Dyck-stigar, genom att tolka  $($  som "steg uppåt" och  $)$  som "steg till höger".

<sup>13</sup> De studerades först av en matematiker i Kina på 1700-talet vid namn Minggatu, som använde dem för att ge identiteter för sinus-funktionen, i stil med

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin(\alpha) - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{n-1}}{4^{n-1}} \sin^{2n+1}(\alpha).$$

Figur 7: Fallet med hexagoner.

<sup>14</sup> Som ju redan har mer än tillräckligt med saker namngivna efter sig, så det är tur att vi inte döpte talen efter honom.

<sup>15</sup> Ledtråd: Tänk kombinatoriskt, och se att dessa också lyder vår rekursion.

- börjar med 1,
- och om det föregående talet är  $k$  är nästa tal vilket tal som helst mellan 1 och  $k + 1$ .

För  $n = 4$  är dessa följder

1234, 1233, 1232, 1231, 1222, 1221, 1212, 1211, 1123, 1122, 1121, 1112, 1111.

Bevisa att antalet av dessa följder ges av Catalanalen.

**Övning 4.** Bevisa att alla följdena på denna lista är lika med Catalanalen:

1. Antalet ord ur alfabetet  $\{-1, 1\}$  med  $n$  stycken av varje bokstav, sådana att alla partialsummor är icke negativa. Det vill säga, om vi tar summan av de första  $k$  bokstäverna i ordet skall det inte bli negativt, för alla  $0 \leq k \leq 2n$ .
2. Följder  $1 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$  av heltal, med  $a_i \leq i$  för alla  $i$ .
3. En valfri följd från Richard Stanleys lista av 66 saker som räknas av Catalanalen<sup>16</sup>, som inte redan dykt upp i föreläsningen eller i en annan övning.

<sup>16</sup> Denna lista återfinns här: <https://math.mit.edu/~rstan/ec/catalan.pdf>

**Övning 5.** Vi skriver talen 1 till  $n$  i ordning runt en cirkel.<sup>17</sup> Vi säger att en mängdpartition  $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$  av  $[n]$  är *ickekorsande* ifall det, när vi ritar streck mellan alla tal som ligger i samma del av partitionen, aldrig händer att två streck som hör till olika delar korsar varandra. Alltså, närhelst  $a, b \in A_i$  och  $c, d \in A_j$  så korsar inte strecket  $ab$  strecket  $cd$ . Se figur 8 för två exempel på ickekorsande partitioner då  $n = 9$ , och figur 9 för ett exempel på en korsande partition.

<sup>17</sup> Visst är ni glada att jag inte valde att formulera detta som "n personer runt ett runt bord?"



(a)  $\{\{1, 8, 9\}, \{2, 5, 6, 7\}, \{3, 4\}\}$ . (b)  $\{\{1, 3, 4\}, \{2\}, \{5, 6, 9\}, \{7, 8\}\}$ .

Figur 8: Två stycken ickekorsande mängdpartitioner.

Bevisa att antalet ickekorsande partitioner räknas av Catalanalen.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ledtråd: Fundera på strecket mellan 9 och 5 i den högra av våra två exempel på ickekorsande partitioner. Kan ni se en rekursion?



Figur 9: Den korsande partitionen  $\{\{1, 8\}, \{2, 7, 9\}, \{3, 4, 6\}, \{5\}\}$ , med de korsande strecken i rött.

### Referenser

Brian M. Scott (<https://math.stackexchange.com/users/12042/brian-m-scott>). Binomial coefficients  $\binom{1/2}{k}$ . Mathematics Stack Exchange, 2020. URL <https://math.stackexchange.com/q/340141>. URL: <https://math.stackexchange.com/q/340141> (version: 2020-03-27).