

(a) MAE difference to KED-sel (%), * Holm p < 0.05
GNN-sel -2.8 -4.3 -7.0 -14.2* +10.5* -7.4 +5.0 +12.3*
GNN-K -5.3 -5.2 -3.5 -7.8 +14.3* -13.0 +8.8 +8.9
GNN-GAT -5.1 -3.2 -4.3 -8.2 +19.5* -8.2 +12.6* +15.5*
GNN-K-PE -4.7 -1.6 -1.9 -8.2 +10.9* -13.3 +12.6 +13.3*
GNN-K-L -3.9 -0.8 -2.1 -5.9 +14.0* -7.2 +11.9 +15.9*
GNN-K-cov -4.7 -4.9 -0.7 -8.6 +9.7* -10.2 +8.8 +11.3*
GNN-KED -4.7 -5.4 -1.0 -11.6 +12.3* -5.1 +11.3 +13.8*
NN-GLS -5.2 -5.7 -7.4 -16.8* +4.5 -4.3 +2.7 +2.8
Zn Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb
Jura
Meuse
15 10 5 0 −5 −10 −15
< 0: neural candidate better
(b) times selected by GNN-sel (of 25 outer folds)
GNN-K 3 2 1 3
GNN-GAT 1 1 2 2 2
GNN-K-PE 2 5 9 2 4
GNN-K-L 3 1 1 3 1
GNN-K-cov 4 9 3 4 7 1 1
GNN-KED 4 1 1 3 1 1 4
NN-GLS 9 13 18 20 14 20 14
Zn Cd Cu Pb Zn Cd Cu Pb
Jura
Meuse