



YOUR STROKE RECOVERY GUIDE

A Booklet for Patients and Caregivers

دليلك

للتعافي من السكتة الدماغية

كتيب للمرضى ومقدمي الرعاية

Stroke Program

مرحبًا بكم	Welcome
------------	---------

Document Code: SU-016-EDU-01	Version: 1.0
Parent Policy: SU-016 - Patient and Caregiver Stroke Education Program	Master Manual: SU-MANUAL-01

This booklet was prepared by your stroke care team to help you and your family understand what happened, what to expect, and how to lower the chance of another stroke. It supports, but does not replace, the individualized education and medical advice provided by your care team.

Keep this booklet with you. Bring it to your follow-up appointments, and share it with anyone who helps care for you at home.

What's inside

- Understanding your stroke
- Warning signs — BE-FAST
- Managing your risk factors
- Your medications
- Follow-up care checklist
- Preventing falls at home
- A guide for caregivers
- Healthy living after stroke
- Contacts & resources

أعد هذا الكتيب من قبل فريق رعاية السكتة الدماغية لمساعدتكم أنتم وعائلتكم على فهم ما حدث، وما يمكن توقعه، وكيفية تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى. لا يحل هذا الكتيب محل التثقيف الفردي أو النصيحة الطبية المقدمة من فريق الرعاية.

احتفظوا بهذا الكتيب معكم. أحضروه إلى مواعيد المتابعة، وشاركوه مع أي شخص يساعد في رعايتكم في المنزل.

محتويات الكتيب

- فهم السكتة الدماغية لديك
- علامات التحذير — BE-FAST
- إدارة عوامل الخطر لديك
- أدوية
- قائمة رعاية المتابعة
- الوقاية من السقوط في المنزل
- دليل لمقدمي الرعاية
- حياة صحية بعد السكتة الدماغية
- جهات الاتصال والموارد

A stroke happens when blood flow to part of the brain is interrupted. This can happen two ways:

- Ischemic stroke: a blood vessel is blocked, most often by a clot.
- Hemorrhagic stroke: a blood vessel bleeds into or around the brain.

Brain cells need a constant blood supply, so every minute matters. This is why getting to the hospital quickly saves brain function.

- Ask your care team: What type of stroke did I have?
- Ask your care team: Which part of my brain was affected?
- Ask your care team: What does this mean for my recovery?

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ. يمكن أن يحدث ذلك بطريقتين:

- السكتة الدماغية الإقفارية: انسداد أحد الأوعية الدموية، غالبًا بسبب جلطة.
 - السكتة الدماغية النزفية: نزيف من أحد الأوعية الدموية داخل الدماغ أو حوله.
- تحتاج خلايا الدماغ إلى إمداد مستمر بالدم، لذا فإن كل دقيقة مهمة. لهذا السبب فإن الوصول إلى المستشفى بسرعة يحافظ على وظائف الدماغ.

- اسألوا فريق الرعاية: ما نوع السكتة الدماغية التي أصبت بها؟
- اسألوا فريق الرعاية: ما الجزء من دماغي الذي تأثر؟
- اسألوا فريق الرعاية: ماذا يعني هذا بالنسبة لتعافي؟

2 · Know the Warning Signs

٢ · تعرّفوا على علامات التحذير

Remember: BE-FAST

B	Balance Sudden loss of balance or coordination
E	Eyes Sudden trouble seeing in one or both eyes
F	Face Face drooping or an uneven smile
A	Arm Arm weakness or numbness, especially on one side
S	Speech Slurred speech or trouble understanding
T	Time Note the time symptoms began — call Saudi Red Crescent (997) now

If you notice ANY of these signs

- Call Saudi Red Crescent (997) right away.
- Do not drive yourself or wait to see if it passes.
- Note the time symptoms started — your care team will need it.

تذكروا: BE-FAST

B	توازن فقدان مفاجئ للتوازن أو التناسق
E	عين مشكلة مفاجئة في الرؤية بعين واحدة أو كليتهما
F	وجه تدلي الوجه أو ابتسامة غير متساوية
A	ذراع ضعف أو خدر في الذراع، خصوصًا في جانب واحد

كلام تلعثم في الكلام أو صعوبة في الفهم	S
وقت سجلوا وقت بدء الأعراض — اطلبوا المساعدة الآن	T

إذا لاحظتم أيًا من هذه العلامات

- اتصلوا بالهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 فورًا.
- لا تقودوا السيارة بأنفسكم ولا تنتظروا لتري إن كانت الأعراض ستزول.
- سجلوا وقت بدء الأعراض — سيحتاج فريق الرعاية إلى هذه المعلومة.

Managing these risk factors lowers your chance of another stroke:

Risk Factor	What You Can Do
High blood pressure	Take medication as prescribed; reduce salt.
Irregular heartbeat (AFib)	Take anticoagulant as prescribed; keep follow-ups.
Diabetes	Monitor blood sugar; follow your meal plan.
High cholesterol	Take statin medication; eat heart-healthy.
Smoking	Ask about cessation support and programs.
Inactivity	Stay active as approved by your care team.

إدارة عوامل الخطر هذه تقلل من فرصة الإصابة بسكتة دماغية أخرى:

عامل الخطر	ما يمكنكم فعله
ضغط الدم المرتفع	تناول الدواء كما هو موصوف؛ تقليل الملح.
عدم انتظام ضربات القلب (رجفان أذيني)	تناول مضاد التخثر كما هو موصوف؛ الالتزام بالمتابعة.
السكري	مراقبة سكر الدم؛ اتباع خطة الوجبات.
الكوليسترول المرتفع	تناول دواء الستاتين؛ اتباع نظام غذائي صحي للقلب.
التدخين	السؤال عن برامج الدعم للإقلاع عن التدخين.
قلة الحركة	البقاء نشيطاً حسب موافقة فريق الرعاية.

4 • Your Medications

٤ • أدويةك

Your nurse and pharmacist will review your personal medication list with you before you leave. This is a general guide only:

Type	Key Reminder
Antiplatelet (e.g., aspirin, clopidogrel)	Don't stop without asking your doctor.
Anticoagulant (blood thinner)	Watch for unusual bruising/bleeding.
Statin	Take at the same time daily.
Blood pressure medicine	Don't skip doses, even if you feel fine.
Diabetes medicine	Know the signs of low blood sugar.

Bring your full medication list (or the medicines themselves) to every appointment.

سيقوم الممرض والصيدلي بمراجعة قائمة أدويةك الشخصية معك قبل مغادرة المستشفى. هذا دليل عام فقط:

نوع الدواء	تذكير مهم
مضاد الصفائح الدموية (مثل الأسبرين، كلوبيدوجريل)	لا توقفوا الدواء دون استشارة الطبيب.
مضاد التخثر (سيولة الدم)	راقبوا أي كدمات أو نزيف غير معتاد.
الستاتين	تناولوه في نفس الوقت يوميًا.
دواء ضغط الدم	لا تفوتوا الجرعات حتى لو شعرتם بتحسن.
دواء السكري	تعرفوا على علامات انخفاض سكر الدم.

أحضروا قائمة أدويةكم الكاملة (أو الأدوية نفسها) إلى كل موعد.

- ☐ Neurology / stroke clinic appointment scheduled
- ☐ Primary care follow-up within 7–14 days
- ☐ Blood tests scheduled, if needed
- ☐ Physical / occupational / speech therapy sessions scheduled
- ☐ Discharge folder with instructions, medication list, and appointment dates

Tip: keep this booklet and your discharge folder together in one place at home.

☐ تحديد موعد عيادة الأعصاب / السكتة الدماغية

☐ متابعة الرعاية الأولية خلال ٧–١٤ يومًا

☐ تحديد مواعيد فحوصات الدم إذا لزم الأمر

☐ تحديد جلسات العلاج الطبيعي / الوظيفي / النطق

☐ مجلد الخروج مع التعليمات وقائمة الأدوية ومواعيد المتابعة

نصيحة: احتفظوا بهذا الكتيب ومجلد الخروج معًا في مكان واحد في المنزل.

- ☐ Remove loose rugs and clutter from walkways
- ☐ Install grab bars in the bathroom
- ☐ Improve lighting, especially at night
- ☐ Wear supportive, non-slip footwear
- ☐ Use your walker or cane exactly as instructed
- ☐ Ask for help before standing if you feel unsteady or dizzy

- ☐ إزالة السجاد غير الثابت والفوضى من الممرات
- ☐ تركيب مقابض في الحمام
- ☐ تحسين الإضاءة، خصوصًا ليلاً
- ☐ ارتداء أحذية داعمة وغير قابلة للانزلاق
- ☐ استخدام المشاية أو العصا تمامًا كما هو موصى به
- ☐ طلب المساعدة قبل الوقوف عند الشعور بعدم الاتزان أو الدوخة

Supporting communication

- Speak slowly, use short sentences, and allow extra time to respond.
- Use gestures, pictures, or writing when helpful.

Supporting daily life

- Encourage independence in tasks that are safe to do alone.
- Follow the home exercise and safety plan from therapy.

Caring for yourself

- Caregiver stress is common — it doesn't mean you're failing.
- Ask about caregiver support groups and respite care.
- Watch your own sleep, health, and mood too.

دعم التواصل

- تحدثوا ببطء، استخدموا جملًا قصيرة، وامنحوا وقتًا إضافيًا للرد.
- استخدموا الإيماءات أو الصور أو الكتابة عند الحاجة.

دعم الحياة اليومية

- شجعوا الاستقلالية في المهام الآمنة للقيام بها بمفردهم.
- اتبعوا خطة التمارين والسلامة المنزلية الصادرة عن العلاج الطبيعي.

الاعتناء بأنفسكم

- ضغط مقدمي الرعاية أمر شائع — لا يعني أنكم تفشلون.
- اسألوا عن مجموعات دعم مقدمي الرعاية والرعاية المؤقتة.
- انتبهوا لنومكم وصحتكم ومزاجكم أيضًا.

Call Saudi Red Crescent (997) immediately if you notice

- Any new BE-FAST symptom, even if it goes away quickly
- A sudden, severe headache unlike any before
- New confusion or trouble waking up
- A seizure
- Signs of serious bleeding if you take a blood thinner

Healthy Living After Stroke

- Eat a heart-healthy diet — more vegetables, whole grains, less salt.
- Stay active as approved by your care team.
- Ask about support to quit smoking.
- Limit alcohol as advised.
- Tell your care team if your mood, sleep, or motivation changes.

اتصلوا بالهلال الأحمر السعودي (997) فوراً إذا لاحظتم

- أي عرض جديد من أعراض BE-FAST، حتى لو زال بسرعة
 - صداعاً مفاجئاً وشديداً لم يسبق أن شعرتكم بمثله
 - ارتباكاً جديداً أو صعوبة في الاستيقاظ
 - نوبة تشنجية
- علامات نزيف شديد إذا كنتم تتناولون مميعات الدم

حياة صحية بعد السكتة الدماغية

- تناولوا غذاءً صحياً للقلب — خضروات أكثر، حبوب كاملة، ملح أقل.
 - حافظوا على النشاط البدني حسب موافقة فريق الرعاية.
 - اسألوا عن الدعم للإقلاع عن التدخين.
 - قلّلوا من الكحول حسب التوجيه الطبي.
- أخبروا فريق الرعاية إذا تغيّر مزاجكم أو نومكم أو دافعيتكم.

CONTACTS & RESOURCES

Stroke Program Coordinator

[Insert local contact number]

Stroke / Neurology Clinic

[Insert local contact number]

Caregiver Support / Social Work

[Insert local contact number]

Emergency Services

Saudi Red Crescent (Ambulance): 997

جهات الاتصال والموارد

منسق برنامج السكتة الدماغية

[أدخل رقم الاتصال المحلي]

عيادة الأعصاب / السكتة الدماغية

[أدخل رقم الاتصال المحلي]

دعم مقدمي الرعاية / الخدمة الاجتماعية

[أدخل رقم الاتصال المحلي]

خدمات الطوارئ

الهلال الأحمر السعودي (الإسعاف): 997

