病人自控式給藥幫浦 PCA PUMP



醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號: (02)28970011/(02)66030011

預約掛號: (02)28971177 網址: www.kfsyscc.org

癌症昏健康篩檢專線: (02)28971133或(02)28970011分機3205~8

什麼是攜帶式給藥幫浦?

PCA Pump (Patient-Controlled Analgesia Pump) 是一種攜帶式的儀器,它可控制輸液流速,而 達到持續給藥的目的,本院所採用的攜帶式給 藥幫浦,由微電腦控制之精密儀器,它可自動 偵測任何異常狀況,並發出警告聲 (見右圖)。

PCA Pump 的功用?

PCA Pump 可連接靜脈注射、皮下注射或椎管內輸注的管路,可用以給予止痛藥物,以有效的減輕因治療或疾病所帶來的痛苦。PCA Pump將於固定時間自動輸注藥物;或當疼痛出現時,您亦可按下自動注射按鈕,讓藥物輸注,所以又稱為自控式止痛。

裝置 PCA Pump 的好處?

PCA Pump 不但攜帶方便、體積輕巧,無論您是在家中或醫院皆可以使用它,因此可減少您的住院日數,節省您的住院費用,並可提昇治療期間的生活品質。

考量返家後您的居家照護需求,在提供您租借 PCA Pump返家前,護理人員將提供您基本的使用 說明及衛教單,請您依據下列警示及指示返院處 理異常狀況,若您居家地點返院不易,請務必考 量就近協助醫療院所之就醫及協助。

PCA Pump 的使用說明



按鍵說明:

1.【開機/關機】:電源開關

2.【啟動/停止】: 啟動或停止運轉

螢幕顯示:

當螢幕顯示【RUN Res Vol ml】:

表示機器滴注中及目前的剩餘藥量。目的是提醒您何時該回院更換新藥袋。

例如: 【RUN Res Vol 5 ml】

表示藥量即將用盡,必須儘快添加新藥了。

外接電池顯示燈:

當裝上外接 9V 電池時, 黃燈會持續亮燈。

警告燈號顯示

問題發生時的 訊息/可能原因

解決方法

A 輸液異常問題 - 停止輸液-關機-返院處理

藥量即將用盡 Res Vol Low

三聲嗶嗶警示 藥量完全用盡

Reservoir Volume Empty

Volume Empt 雙聲調警示

輸液管有氣泡 或沒裝好

Air In Line Detected 雙聲調警示 1.持續長按【啟動/停止】鍵停 止輸注,螢幕出現

Stopping -- --- , 三條線依 序消失 , 畫面 STOPPED 幫浦 即停止。

2.再持續長按【關機】鍵,螢幕 出現...點狀訊號,依序出現三 條虛線即關機.

Turning off

3.請返院處理

B 管路問題 - 檢查阻塞原因並排除阻塞

管路阻塞或止 流夾沒開

High Pressure 雙聲調警示

儲液卡匣至幫 浦之間,有氣泡 或管路阻塞

Upstream Occlusion 雙聲調警示 1.同上**步驟 A-1 停止機器**。

2.檢查止流夾或檢查管線有折 到或壓到,排除阻塞,再長按 【啟動/停止】,螢幕

Starting --- --- , 三條線依序 消失,機器會再顯示一次所有 設定值後,螢幕出現

RUN Res Vol ml ,表示開始 輸注。

3.如果無法找到阻塞原因或無 法排除阻塞情形,請續執行 **A-2 關機步驟**,返院處理。

C 機器電力問題 - 儘快更換電池

電池電力即將 用盡

Low Bat 每 5 分鐘三聲雙 聲調的警示音

電池耗盡

Battery Depleted 雙聲調警示

- 1.同上步驟 **A-1.停止機器**
- 2.同上步驟 A-2.關機
- 3.加上一個 9V 鹼性電池,需用力卡住。
- 4.長按【啟動/停止】鍵,螢幕
 Starting --- --- -- -- , 三條線依序
 消失,機器會再顯示一次所有
 設定值後,螢幕出現 RUN
 ResVol ml ,表示開始輸注。

裝置攜帶式給藥幫浦在家中應注意的事項?

- 1.每次返院補充藥物時,請攜帶2顆3號鹼性 電池(勿使用碳鋅電池),並請護理人員協助更 換。(出院前護理人員會協助更換新電池)
- 2.在家中若發生電力不足問題時,可先行使用 外接電池,請使用一般 9V 鹼性電池一個,勿 使用充電電池。(電池裝置粘黏固定於機器外 殼的側面),連接時需用力卡住上面扣環。
- 3.外接電池正常運作時,螢幕左下方【外接電池 顯示燈】會持續亮黃燈。若黃燈熄滅則表示外 接電池已須回醫院處理。



- 4.若您依左列程序處理後,警訊尚未消除,請 立即通知護理人員。
- 5.此為電子式儀器,需避免強烈的撞擊與墜落,並慎防受潮且勿接觸如電腦斷層、核磁共振等電子儀器,上述任何情形均可能造成儀器損壞及故障。
- 6.使用疼痛控制攜帶式給藥幫浦時:
- 在您出院前,照顧您的護理人員會將藥物資訊記錄於記錄卡上(如右),並教導您或您的家屬如何看使用之劑量。

返家後,當藥物使用量已接近藥物總量時:
 A. 若您為癌症關懷照顧團隊個管師收案及居家之病人,請於止痛藥物預計使用完畢的前一日上班時間,聯絡您的癌症關懷照顧團隊個管師,她將會協助安排處理。

請聯絡癌症	關懷照顧團隊	《個管師:	
金 電影	:		

B. 若您非為癌症關懷照顧團隊個管師收案之 病人**請於止痛藥物預計輸注完畢的前** 一日上班時間,與門診治療室聯絡, 護理人員將會協助處理。

聯絡方式:

上班時間(週一-五8:00-17:00;週六8:00-12:00):

門診治療室 電話:02-2897-0011

① 分機 2588 或 2589

晚上或例假日

若發生輸液異常問題或管路阻塞無法排除時, 煩請您返回本院急診就醫(急診將提供24小 時緊急病人之服務)。

> 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 病人自控式止痛藥物 (PCA) 記錄卡

預定 年 月 日 請回供應室更換 PCA 機器				STICKER							
開始 日期/ 時間	雙人核對 簽名	聯名	與完的顯波 総派 Reservoir Volume/ml	輸注濃度 單位 Units	微度設定 Concentration mg/ml	祝遊設定 Continuous Rate	病人按照時給 予之樂排區 Demand Dose	兩次按應所允 許的時間間隔 Dose Lockout	每小時最大 按照次數 Doses Per Hour	停止 日期/ 時間	簽名
	1							min	次/hr		
	/							min	次/hr		
	/							min	次/hr		
	1							min	次/hr		

自我照護 2016 07 版 護理部 病人與家屬教育小組 印製