認識鼻胃管及居家自我照護



醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號: (02)28970011/(02)66030011 預約掛號: (02)28971177 網址: www.kfsyscc.org 癌症警健康篩檢專線: (02)28971133或(02)28970011分機3205~8

什麼是鼻胃管?

鼻胃管(N-G tube)顧名思義是由鼻腔通到 胃的管路。管子的材質多為聚乙烯或矽質,性 質軟且具些微彈性。隨著管子的號碼大小,其 粗細也不相同,(號碼越大管徑越大)。一般成人 的灌食,通常選用的管子為 12Fr~16Fr,管子上 有黑色的記號,可用來記錄管子放入的深度。

爲什麼要放置鼻胃管?

放置鼻胃管的好處

- ◆ 維持良好的營養狀況,可以增加承受治療的 耐受力、病人的免疫力及增加治療的效果, 順利完成治療的計劃。
- ◆ 緩解吞嚥動作所造成的疼痛不適。
- ◆ 讓破損之口腔及咽喉、食道黏膜暫 時休息,幫助修復。
- ◆ 引流消化液,緩解腹部不適。

如何放置鼻胃管?

放置鼻胃管前,我們會為您準備下列物品:鼻胃管、灌食空針、固定用的紙膠及潤滑管路用的潤滑液。



鼻胃管



紙膠



灌食空針



潤滑液

- 接著,由醫師或護理師將鼻胃管經由鼻腔,深入咽部,再進入食道而抵達胃部或十二指腸。放置過程約數分鐘,步驟如下:
- 調整姿勢:我們會協助您抬高頭部, 採半坐臥姿。放置過程中請您儘量放 輕鬆,並配合醫師及護理師的指示做 吞嚥動作。
- 2. 評估鼻胃管置入的長度:鼻胃管放入 的長度大約為您的鼻端至耳垂,加上 耳垂至劍突(胃部)的距離。
- 3. 我們會先以水溶性潤滑劑潤滑鼻胃管 以減輕您放置過程中的不舒適感。
- 4. 將鼻胃管經鼻孔,沿著鼻腔底部輕輕 向前推進,直至管路放至胃部。
- 5. 利用聽診器聽診胃部以確定鼻胃管已 插在胃內。

6. 當確定鼻胃管在胃內後,我們會擦拭 掉殘留在鼻子及鼻胃管上的潤滑劑, 再用紙膠將管路黏妥,並使用安全別 針適當固定。

如何照顧鼻胃管?

當管子放置完成後,請您每天執行鼻胃管 的照護,執行方法如下:

- 1. 管路位置的確認
- ◆ 外露的管子可以紙膠或安全別針固 定在衣服上,但脫衣服時請小心,不 要把管子扯掉了。
- 2. 維持管路的通暢

每次灌食後、灌藥後、反抽觀察消化情形及胃內容液後,應以灌食空針抽取 30ml~50 ml 的温開水(溫度以室溫即可)經管子注入,以將管壁沖洗乾淨。

- 3. 維持口、鼻腔的清潔
 - ◆ 每日以濕潤之棉枝清理鼻腔,並清除鼻黏 液。
 - ◆ 每日更換用來固定管子的紙膠並更換黏貼 的位置。更換的同時,輕微轉動鼻胃管, 以防止管子常時間固定壓迫同一點,造成 胃及鼻子黏膜受壓損傷。
- ◆ 即使未由口進食,仍應早晚刷牙,並經常 以開水或生理食鹽水漱口,以保持口腔的 清潔及濕潤,降低口腔炎或感染的發生, 並促進舒適感。

鼻胃管灌食之注意事項

- 1. 每次灌食前應先洗手。
- 2. 灌食後需洗淨灌食器,因灌食空針內之橡皮 材質易遇熱受損,請勿使用溫、熱水清洗。
- 3. 灌食過中,病人如有異常情形應停止灌食。 (如不停咳嗽、嘔吐、臉色發紫…等)
- 4. 灌食過程中,應避免空氣進入減少腹脹。
- 5. 灌藥物時,應先將藥物磨成粉,加水使其溶 解後,才可將藥物灌入,且以開水沖洗以防 阻塞。
- 6. 勿將藥物與食物混合灌入,以防食物與藥物 發生交互作用。
- 7. 意識不清或昏迷的病人,灌食前應完成拍背、翻身及抽痰。
- 8. 可以兩餐間補充額外水分。

返家後,若有不停咳嗽、嘔吐、臉色發紫.. 等不適症狀,煩請您儘快與主治醫師連絡或 返回本院急診室就醫,急診室提供 24 小時 緊急病人之服務。

> 自我照護 2016 11 版 護理部 病人與家屬教育小組 印製

交通指南

一、捷運:淡水線捷運

忠義站下車:5-10 分鐘步行即到醫院

關渡站下車:免費接駁車每20分鐘行駛一班次

- ◎ 接駁車站牌在和信醫院正門□及 關渡捷運站門□站牌處
- ◎ 调六下午及醫院休診日接駁車則不行駛
- ◎ 每班次限搭乘 20 位乘客,以病人、家屬優先 搭乘。
- 班次時間表請參閱 "和信治癌中心醫院與您"雙週刊或網路查詢

二、公車

公車如走中央北路則在「和信醫院」站牌下車;公車如走大度路則在「大度立德路口」站牌下車。

- ◎ 大南客運:223、302、小23
- ◎ 指南客運:308(竹圍-台北車站)、淡大-北門、 淡海-北門
- ◎ 淡水客運:632(八里-北投)、三芝-台北