


手術後疼痛控制

超音波定位

腰方肌阻斷止痛術

說明書



和信治癌中心醫院是台灣唯一的癌症專科醫院，也是一所非營利的公益醫療機構，我們的終極目標不是「利潤」，而是「改變的生命」(changed human life)。

 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號：(02) 28970011/(02) 66030011

預約掛號：(02) 28971177 網址：www.kfsyscc.org

癌症暨健康篩檢專線：(02) 28971133或(02) 28970011分機3205~8

這份說明書是有關超音波定位腰方肌阻斷止痛術(ultrasound-guided quadratus lumborum block)的效益和風險說明，請您仔細閱讀，當您到「麻醉科手術前訪視門診」，麻醉人員將為您仔細說明，如果您有任何疑問，請您與醫師討論。

什麼是超音波定位腰方肌阻斷止痛術

為了減少術後噁心嘔吐和促進術後恢復的品質，本院非常重視全方位的術後止痛方法。腰方肌阻斷止痛術，對於腹部及骨盆腔手術後的減痛，非常有效。腰方肌阻斷止痛術，是由麻醉醫師依照開刀傷口的位置，以超音波定位，在腰後方單側或兩側打針，局部麻醉藥會侷限於後腹壁，散佈在後腹壁的腰方肌和腰大肌之間，甚至向後擴散到椎旁空間，產生良好的減痛的效果。

腰方肌阻斷止痛術可以提供手術部位的減痛，提供體壁和臟腑兩種性質疼痛的止痛，其減痛效果可長達48小時。目前在超音波定位下，腰方肌阻斷止痛術的成功率高，同時風險很低。

超音波定位——腰方肌阻斷止痛術



適應症

輔助腹部及骨盆腔手術的麻醉，減少手術後靜態及活動中的疼痛，降低手術後鴉片類止痛藥之需求。

禁忌症

對局部麻醉藥過敏(例如治療牙齒時，牙齦注射局部麻醉藥引起不適)、凝血功能異常、入針處皮膚感染、或有腫瘤佔據入針處的空間。

好處

消除手術疼痛造成的生理壓力，促進呼吸功能，少有影響膀胱排尿和下肢的運動功能，減少術中及術後嗎啡類止痛藥之需求，提供腹部及骨盆腔手術後有效的減痛。

風險

進行腰方肌阻斷止痛術，潛在有腹膜穿破、內臟刺傷，或局部麻醉藥毒性等風險。醫生會使用適量的局部麻醉藥，身體吸收局部麻醉藥後，可能會感到頭暈。部份病人可能會對局部麻醉藥產生過敏反應，但仍有極稀罕的機會出現嚴重情況，包括抽筋，心律不整或死亡。

手術後注意事項

當日請勿簽署法律文件、操作重型機械或駕車。當日出院者需由親友陪同出院，以策安全。若有任何不適症狀，請立即告訴醫護人員或就醫。