


手術後疼痛控制

超音波定位

腹壁區域減痛術

說明書



和信治癌中心醫院是台灣唯一的癌症專科醫院，也是一所非營利的公益醫療機構，我們的終極目標不是「利潤」，而是「改變的生命」(changed human life)。

 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院
KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號：(02) 28970011/(02) 66030011

預約掛號：(02) 28971177 網址：www.kfsyscc.org

癌症暨健康篩檢專線：(02) 28971133或(02) 28970011分機3205~8

這份說明書是有關腹橫肌平面痛覺阻斷術(Transversus abdominis plane block)的效益和風險說明，請您仔細閱讀，當您到「麻醉科手術前訪視門診」，麻醉人員將為您仔細說明，如果您有任何疑問，請您與醫師討論。

什麼是超音波定位腹橫肌平面痛覺阻斷術

為了減少術後噁心嘔吐和促進術後恢復的品質，本院非常重視全方位的術後止痛方法。腹橫肌平面痛覺阻斷術，對於腹部傷口的減痛，非常有效。

腹橫肌平面痛覺阻斷術，是由麻醉醫師依照開刀傷口的位置，以超音波定位，在腹壁單側或兩側打針，讓局部麻醉藥散佈在腹壁的內斜肌和腹橫肌之間，使經過其中的肋間神經產生局部麻醉和減痛的效果。

腹橫肌平面痛覺阻斷術可以提供手術部位的麻醉，其減痛效果可長達24小時。目前在超音波定位下，腹壁區域減痛術的成功率大幅上升，同時風險很低。

適應症


輔助腹部手術的麻醉，減少手術後腹壁部份傷口的疼痛。

禁忌症

對局部麻醉藥過敏(例如治療牙齒時，牙齦注射局部麻醉藥引起不適)、入針處皮膚感染，或有腫瘤佔據入針處的空間。

好處

消除手術疼痛造成的生理壓力，不影響心跳血壓，促進呼吸功能，不影響膀胱排尿和下



腹橫肌平面痛覺阻斷術

肢的運動功能，減少術中及術後嗎啡類止痛藥之需求，減少術後噁心嘔吐的副作用，提供腹部手術後有效的傷口減痛。

風險

過去以傳統方式，進行腹橫肌平面痛覺阻斷術，有零星報告腹膜穿破、小腸出血、肝臟刺傷或產生局部麻醉藥毒性等併發症的報告。部份病人可能會對所注射的藥物有過敏反應，但罕有出現嚴重情況。身體吸收局部麻醉藥後，你可能會感到頭暈。醫生會使用適口的局部麻醉藥，但仍有極稀罕的機會出現罕見情況，包括抽筋，心口口整或死亡。

手術後注意事項

如有使用鎮靜劑者，當日請勿簽署法口文件、操作重型機械或駕口。當日出院者需由親友陪同出院，以策安全。若有任何不適症狀，請立即告訴醫護人員或就醫。