


АМОРА / AMORA

Premier x Anosta

- Ранен сорт за преработвателната промишленост
- Високо сухо вещество в началото на сезона
- ПВисок потенциал за добив



СПЕЦИФИКАЦИИ

Характеристики

Цвят на кожата	Жълт
Цвят сърцевина	Жълт
Качество за пържене	Отлично
Форма на клубените	Овално-продълговата
Клубени на растение	9 - 11
Зрялост	Ранна
Период на покой	Кратък
Семенни плодове	Умерен брой
Тип за готвене	В
Средна дължина клубени	74
Възможност за измиване	Добра
Подводно тегло	384 - 425
Съдържание на суха маса	21 - 23 %

Чувствителност

Натъртване	Чувствителен
Механични повреди	Доста чувствителен
Пукнатини при растеж	Слабо чувствителен
Вторичен растеж	Слабо чувствителен
Сенкор (Метрибузин)	Слабо чувствителен
Суша	Слабо чувствителен
Кухи сърцевини	Слабо чувствителен


Устойчивост

Y-вирус	Слабо възприемчив
Yntn вирус	Слабо възприемчив
Спрейнг	Слабо възприемчив
Мана по клубените	Слабо възприемчив
Мана по листата	Доста възприемчив
Фузариум	Слабо възприемчив
Обикновена краста	Слабо възприемчив
Рак по картофите F1	Устойчив / 10
Рак по картофите F2	- / -
Рак по картофите F6	Неустойчив / 6
Рак по картофите F18	- / -
КЦН Ro1	Устойчив / 9
КЦН Ro2/3	- / -
КЦН Pa2	- / -
КЦН Pa3	- / -
Сребриста краста	Слабо възприемчив
Ранен пригор	Слабо възприемчив
Листно завиване	- / -

АМОРА / AMORA

Premier x Anosta

- Ранен сорт за преработвателната промишленост
- Високо сухо вещество в началото на сезона
- ПВисок потенциал за добив



СЪВЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ КАРТОФИ ЗА КОНСУМАЦИЯ

При следване на съветите за отглеждане вземете в предвид местните условия като тип почва и климат.

Предварителна обработка и засаждане

Съхранявайте семенните картофи с механична охладителна система, за да предотвратите физиологично стареене.

Аклиматизирайте преди засаждане.

Почвена температура от поне 12°C е от съществено значение за успешно начало.

Приложете третиране срещу Ризоктония, Сребриста краста и Черни петна по време на засаждане

Засаждайте на нивото на повърхността

Разстояния при засаждане

Размер 25/28 мм	разстояние на засаждане около 38 см × 75 см, около 800 кг/ха (40,000 растения/ха)
Размер 28/35 мм	разстояние на засаждане около 33 см × 75 см, около 1,000 кг/ха (40,000 растения/ха)
Размер 35/55 мм	разстояние на засаждане около 33 см × 75 см, около 2,300 кг/ха (35,000 растения/ха)
Размер 55/60 мм	разстояние на засаждане около 35 см × 75 см, около 2,850 кг/ха (38,000 растения/ха)

Торене

N Умерени нужди от азот: 125 кг/ха (включително почвените запаси)

P Стандартни местни препоръки.

K Осигурете 100-120 кг/ха калий.

- Прилагайте Mg, Mn, Ca и B като листни торове.
- Внимавайте с органичните торове, тъй като могат да повлияят негативно върху узряването и подводното тегло

Прибиране на реколтата

- Амора е чувствителен към натъртване, причинено от механични повреди
- Директната преработка след прибиране на реколтата е обичайна практика